



Фелодип

ФЕЛОДИПИН

РЕШЕНИЕ
НЕ ДОЛЖНО
БЫТЬ
СЛОЖНЫМ!

ВЫБИРАЙТЕ
ФЕЛОДИП



Суточный контроль АД¹
при низкой частоте
отеков^{2*} за счет
продолжительного
действия³ и высокого
антиальдостеронового
эффекта⁴

teva



Фелодип

ФЕЛОДИПИН

СОКРАЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА ФЕЛОДИП

Регистрационный номер: ПН013365/01 от 26.08.2010. Торговое наименование: Фелодип. МНН: фелодипин. Действующее вещество: фелодипин 2,500 мг/5,000 мг/10,000 мг. Лекарственная форма: таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой. Показания к применению: Артериальная гипертензия. Стабильная стенокардия (в том числе стенокардия Принцметала). Противопоказания: Повышенная чувствительность к фелодипину и к другим производным дигидропиридинового ряда; нестабильная стенокардия; острый инфаркт миокарда и в течение одного месяца после перенесенного инфаркта миокарда; кардиогенный шок; клинически значимый аортальный стеноз; беременность; период грудного вскармливания; сердечная недостаточность в стадии декомпенсации; выраженная артериальная гипотензия; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены); непереносимость лактозы, дефицит лактазы; глюкозо-галактозная мальабсорбция. С осторожностью: Печеночная и/или почечная недостаточность, возраст старше 65 лет. Способ применения и дозы: Препарат лучше всего принимать утром внутрь, перед едой или после легкого завтрака. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, нельзя раскусывать, делить или размельчать. Артериальная гипертензия. Взрослые (в том числе пожилые пациенты): Доза всегда определяется индивидуально. Терапия начинается с дозы 5 мг 1 раз в день. В случае необходимости дозу можно увеличить; обычно поддерживающая доза составляет 5–10 мг 1 раз в день. Для определения индивидуальной дозы лучше всего использовать таблетки с содержанием фелодипина 2,5 мг. У пожилых пациентов или пациентов с нарушением функции печени рекомендуемая начальная доза 2,5 мг 1 раз в день. Стабильная стенокардия. Взрослые: Доза всегда определяется индивидуально. Лечение начинается с дозы 5 мг 1 раз в день, в случае необходимости можно увеличить дозу до 10 мг 1 раз в день. Максимальная суточная доза составляет 20 мг 1 раз в день (Полную информацию см. в инструкции по применению). Побочное действие. Препарат Фелодип может вызвать покраснение лица, головную боль, сердцебиение, головокружение и повышенную утомляемость. Эти реакции носят обратимый характер и чаще всего проявляются в начале лечения или при увеличении дозы препарата. Также, в зависимости от дозы, могут появиться периферические отеки, которые являются следствием прекапиллярной вазодилатации. У пациентов с воспалением десен или периодонтитом может возникнуть легкий отек десен. Этому можно воспрепятствовать соблюдением тщательной гигиены полости рта. Со стороны центральной и периферической нервной системы: головная боль. Со стороны сердечно-сосудистой системы: периферические отеки; «приливы» (Полную информацию см. в инструкции по применению). Особые указания. Препарат Фелодип, также как и другие вазодилататоры, может в редких случаях вызывать значимую артериальную гипотензию, которая у ряда предрасположенных пациентов может приводить к развитию ишемии миокарда (Полную информацию см. в инструкции по применению). Срок годности: 4 года. Условия отпуска: отпускают по рецепту. Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению.

* В исследовании HOT частота отеков на терапии фелодипином через 12 месяцев наблюдалась в пределах 2.6%–3.0%

1. Weber M.A. Goldberg AI, Fasion E.P. et al. Extended-release felodipin in patients with mild to moderate hypertension. Felodipine ER Dose-Response Study Group. Clin Pharmacol Ther 1994;55(3): 346-52
2. Hansson L, Zanchetti A (for the HOT Study Group). The Hypertension Optimal Treatment (HOT) Study: 12-month data on bloodpressure and tolerability. With special reference to age and gender. Blood Pressure 1995; 4:313-319.
3. Инструкция по медицинскому применению препарата Фелодип
4. Dietz JD, Du S, Bolten CW et al A number of marketed dihydropyridine calcium channel blockers have mineralocorticoid receptor antagonist activity. Hypertension 2008; 51 (3): 742–8.

**ОТПУСКАЕТСЯ ПО РЕЦЕПТУ,
ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИИ
ПАЦИЕНТА.**

ООО «Тева» Россия,
115054, Москва, ул. Валовая, д. 35,
тел.: +7 (495) 644-22-34,
факс: +7 (495) 644-22-35,
e-mail: info@teva.ru,
www.teva.ru.
FLDP-RU-00123-DOC-02.2021