

ФОРУМ

интерниста
электронный научно - медицинский журнал

Клиническое наблюдение массивной тромбоэмболии легочной артерии, резвившейся в ранние сроки после хирургического вмешательства на органах малого таза

Селиверстова Д.В., Евсина О.В.

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации

Ключевые слов: тромбоэмболия легочной артерии, тромболитическая терапия

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) остается одним из наиболее опасных и трудно диагностируемых заболеваний. При жизни диагноз ТЭЛА устанавливается менее чем в 70% наблюдений. Летальность среди пациентов без патогенетической терапии, по данным различных авторов, достигает 40% и более, а при массивной ТЭЛА достигает 70%. Однако при своевременно начатой терапии смертность снижается до 2–8% [1]. Примерно у 30% больных, перенесших венозную тромбоэмболию (ВТЭ), в течение 10 лет развиваются рецидивы заболевания [2,3]. Имеются данные о том, что примерно 40% летальных исходов после гинекологических операций обусловлены ТЭЛА [4].

Клинический случай

Больная 47 лет 11.12.2013 г. по экстренным показаниям была переведена из гинекологического отделения в кардиологический стационар с диагнозом: Тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии. Подозрение на илеофemorальный тромбоз.