Клинические рекомендации
Брадиаритмии и нарушения проводимости.

Кодирование по Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем: I44, I44.0, I44.1, I44.2, I44.3, I44.4, I44.5, I44.6, I44.7, I45, I45.0, I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, I45.8, I45.9, I46, I46.0, I46.1, I46.9, I49.5

Возрастная группа: взрослые

Год утверждения: **2023**

Разработчик клинической рекомендации:

- Российское кардиологическое общество (РКО)
- Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии, аритмологии и кардиостимуляции (ВНОА)
- Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России (АССХ)

3	Оглавление	
4		
5	Список сокращений	5
6	Термины и определения	6
7	1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или	
8	состояний)	8
9	1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)	8
10	1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний или	
11	состояний)	9
12	1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)	11
13	1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы заболеваний или	
14	состояний) по Международной статистической классификации болезней и проблем,	
15	связанных со здоровьем	12
16	1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)	13
17	1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний)	
18		14
19	2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний),	
20	медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики.	15
21	2.1 Жалобы и анамнез	16
22	2.2. Физикальное обследование	16
23	2.3. Лабораторные диагностические исследования	17
24	2.4 . Инструментальные диагностические исследования	18
25	2.4.1 . Электрокардиография	18
26	2.4.2 . Длительное мониторирование ЭКГ	19
27	2.4.3 . Методы визуализации	20
28	2.4.4 . Диагностика брадиаритмий и ночного апноэ	21
29	2.5. Иные диагностические исследования.....	22
30	2.5.1 . Электрокардиография с физической нагрузкой	22
31	2.5.2 . Ортостатическая проба.....	23
32	2.5.3 . Массаж каротидного синуса	24
33	2.5.4 Медикаментозные тесты	24
34	2.5.7 Внутрисердечное электрофизиологическое исследование.....	27

35	3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии,	
36	диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания	
37	к применению методов лечения	30
38	3.1. Медикаментозное лечение неотложных состояний.....	30
39	3.1.1. Острое медикаментозное лечение ДСУ.....	31
40	3.1.2. Острое медикаментозное лечение ПЖБ.....	31
41	3.2. Временная стимуляция для лечения неотложных БА состояний.....	32
42	3.2.1. Временная стимуляция при ДСУ	33
43	3.2.2. Временная стимуляция при ПЖБ.....	34
44	3.3. Постоянная электрокардиостимуляция.....	35
45	3.3.2. Постоянная кардиостимуляция при ПЖБ	37
46	3.3.3. Кардиостимуляция при нарушениях проводимости (при атриовентрикулярной	
47	проводимости 1:1 и нормальном PR-интервале).....	40
48	3.4. Показания к кардиостимуляции при отдельных видах патологических состояний.....	45
49	3.4.1. Кардиостимуляция у пациентов после некоторых операций на сердце	45
50	3.4.5 . Кардиостимуляция у пациентов с врожденными пороками сердца.....	51
51	3.4.6. Кардиостимуляция у пациентов с инфарктом миокарда	52
52	3.4.7. Кардиостимуляция у пациентов с синкопальными состояниями	53
53	3.6. Выбор режимов кардиостимуляции	57
54	4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и противопоказания	
55	к применению методов реабилитации	58
56	5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания	
57	и противопоказания к применению методов профилактики.....	59
58	6. Организация оказания медицинской помощи.....	62
59	7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход	
60	заболевания или состояния).....	63
61	Критерии оценки качества медицинской помощи	68
62	Список литературы.....	70
63	Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических	
64	рекомендаций	137

65	Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показаний к	
66	применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных	
67	препаратов, инструкции по применению лекарственного препарата.....	142
68	Препарат (класс).....	143
69	Приложение Б. Алгоритмы действий врача	146
70	Приложение В. Информация для пациента	153
71		
72		

Список сокращений

73	
74	ААТ — антиаритмическая терапия
75	БА — брадиаритмия
76	БЛНПГ — блокада левой ножки пучка Гиса
77	БНПГ — блокада ножки пучка Гиса
78	БПНПГ — блокада правой ножки пучка Гиса
79	ВВФСУ — время восстановления функции синусового узла
80	ВПС — врожденные пороки сердца
81	ГКМП — гипертрофическая кардиомиопатия
82	ДСУ — дисфункция синусового узла
83	ИБС — ишемическая болезнь сердца
84	ИКМ — имплантируемые кардиомониторы
85	ИМ — инфаркт миокарда
86	КС — каротидный синус
87	КТ — компьютерная томография
88	ЛЖ — левый желудочек
89	МЖП — межжелудочковая перегородка
90	МРТ — магнитно-резонансная томография
91	ОМТ — оптимальная медикаментозная терапия
92	ПЖ — правый желудочек
93	ПЖБ — предсердно-желудочковая блокада
94	ПЖС — предсердно-желудочковое соединение
95	ПЖУ — предсердно-желудочковый узел
96	ПСС — проводящая система сердца
97	ПФН — проба с физической нагрузкой
98	ПЭТ — позитронно-эмиссионная томография
99	СН — сердечная недостаточность
100	СНнФВ — сердечная недостаточность с низкой ФВ
101	СНсФВ — сердечная недостаточность с сохранной ФВ ЛЖ
102	СНусФВ — сердечная недостаточность с промежуточной ФВ (40-49%)
103	СПБ — синусно-предсердная блокада
104	СПГ — стимуляция пучка Гиса
105	СПУ — синусно-предсердный узел
106	СРТ — сердечная ресинхронизирующая терапия

107	СССУ	— синдром слабости синусно-предсердного узла
108	ТК	— трикуспидальный клапан
109	ФВ ЛЖ	— фракция выброса левого желудочка
110	ФП	— фибрилляция предсердий
111	ЧЖС	— частота желудочковых сокращений
112	ЧСС	— частота сердечных сокращений
113	ЭКГ	— электрокардиограмма
114	ЭКС	— электрокардиостимулятор
115	ЭФИ	— электрофизиологическое исследование
116	ЭхоЭКГ	— эхокардиография
117	ЭЭ	— эндокардиальные электроды

118
119
120
121

122 Термины и определения

123 **Доказательная медицина** — надлежащее, последовательное и осмысленное
124 использование современных наилучших доказательств (результатов клинических
125 исследований) в процессе принятия решений о состоянии здоровья и лечении пациента
126 [1, 2].

127 **Заболевание** — возникающее в связи с воздействием патогенных факторов
128 нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться
129 к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении
130 защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов
131 организма [3].

132 **Инструментальная диагностика** — диагностика с использованием для
133 обследования пациента различных приборов, аппаратов и инструментов.

134 **Исход** — любой возможный результат, возникающий от воздействия причинного
135 фактора, профилактического или терапевтического вмешательства, все установленные
136 изменения состояния здоровья, возникающие как следствие вмешательства [4].

137 **Конфликт интересов** — ситуация, при которой у медицинского или
138 фармацевтического работника при осуществлении ими профессиональной деятельности

139 возникает личная заинтересованность в получении лично либо через представителя
140 компании материальной выгоды или иного преимущества, которое влияет или может
141 повлиять на надлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей вследствие
142 противоречия между личной заинтересованностью медицинского работника или
143 фармацевтического работника и интересами пациента [3].

144 **Клиническое исследование** — любое исследование, проводимое с участием
145 человека в качестве субъекта для выявления или подтверждения клинических и/или
146 фармакологических эффектов исследуемых продуктов, и/или выявления нежелательных
147 реакций на исследуемые продукты, и/или изучения их всасывания, распределения,
148 метаболизма и выведения с целью оценить их безопасность и/или эффективность.
149 Термины «клиническое испытание» и «клиническое исследование» являются
150 синонимами [5].

151 **Лабораторная диагностика** — совокупность методов, направленных на анализ
152 исследуемого материала с помощью различного специализированного оборудования.

153 **Лекарственные препараты** — лекарственные средства в виде лекарственных
154 форм, применяемые для профилактики, диагностики, лечения заболевания,
155 реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности [6].

156 **Медицинское вмешательство** — выполняемые медицинским работником и иным
157 работником, имеющим право на осуществление медицинской деятельности,
158 по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние
159 человека и имеющие профилактическую, диагностическую, лечебную,
160 реабилитационную или исследовательскую направленность виды медицинских
161 обследований и/или медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание
162 беременности [3].

163 **Медицинский работник** — физическое лицо, которое имеет медицинское или
164 иное образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные)
165 обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, либо
166 физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем,
167 непосредственно осуществляющим медицинскую деятельность [3].

168 **Пациент** — физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или
169 которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него
170 заболевания и от его состояния [3].

171 **Рабочая группа по разработке/актуализации клинических рекомендаций** —
172 коллектив специалистов, работающих совместно и согласованно в целях
173 разработки/актуализации клинических рекомендаций и несущих общую ответственность
174 за результаты данной работы.

175 **Синдром** — устойчивая совокупность ряда симптомов с единым патогенезом [7].

176 **Тезис-рекомендация** — положение, отражающее порядок и правильность
177 выполнения того или иного медицинского вмешательства, имеющего доказанную
178 эффективность и безопасность.

179 **Уровень достоверности доказательств (УДД)** — степень уверенности в том, что
180 найденный эффект от применения медицинского вмешательства является истинным [8].

181 **Уровень убедительности рекомендаций (УУР)** — степень уверенности
182 в достоверности эффекта вмешательства и в том, что следование рекомендациям
183 принесет больше пользы, чем вреда в конкретной ситуации [8].

184 **1. Краткая информация по заболеванию или состоянию (группе заболеваний или** 185 **состояний)**

186 **1.1 Определение заболевания или состояния (группы заболеваний или** 187 **состояний)**

188 **Брадиаритмии (БА)** — группа нарушений ритма и проводимости сердца,
189 характеризующихся замедленной выработкой электрических импульсов, регулярным
190 и нерегулярным или замедленным ритмом желудочков, связанным с блокадой
191 проведения импульсов [9].

192 БА включают в себя два важнейших симптомокомплекса: дисфункцию синусового
193 узла (ДСУ) и предсердно-желудочковые блокады (ПЖБ) различных уровней и внутри-
194 желудочковые блокады (ВЖБ). Синдром слабости синусового узла (СССУ) —
195 симптомокомплекс, относящийся к ДСУ и характеризующийся наличием клинической
196 симптоматики брадикардии.

197 **Дисфункция синусового узла (ДСУ)** — состояние, когда частота сокращений
198 предсердий не соответствует физиологическим потребностям.

199 **Синдром слабости синусового узла (СССУ)** — сочетание клинических
200 и электрофизиологических признаков, отражающих структурные повреждения
201 синуснопредсердного узла (СПУ), его неспособность нормально выполнять функцию
202 водителя ритма сердца и обеспечивать регулярное проведение автоматических
203 импульсов к предсердиям.

204 **Предсердножелудочковая блокада (ПЖБ)** — частичное или полное прерывание
205 проведения импульса от предсердий к желудочкам.

206 **Электрокардиостимулятор (ЭКС***)** — искусственный водитель ритма,
207 медицинский прибор, предназначенный для стимуляции и коррекции частоты
208 и последовательности сокращения камер сердца.

209 **1.2 Этиология и патогенез заболевания или состояния (группы заболеваний** 210 **или состояний)**

211 Причины БА могут быть врожденные и приобретенные. Врожденные БА, как
212 правило, диагностируются и лечатся в детском возрасте. В основе лежит нарушение
213 эмбрионального развития проводящей системы сердца (ПСС). Причины приобретенных
214 БА можно разделить на обратимые, что может быть обусловлено влиянием
215 лекарственных препаратов или нейрокардиальными рефлекторными факторами, а также
216 обратимые БА после хирургических вмешательств на сердце. Необратимые причины
217 могут быть обусловлены инфекционными, воспалительными, дегенеративными или
218 ишемическими изменениями синусно-предсердного узла (СПУ), предсердно-
219 желудочкового соединения (ПЖС) и ПСС.

220 Важнейшей внутренней причиной ДСУ является замещение ткани СПУ
221 фиброзной и/или жировой тканью, причем дегенеративный процесс обычно
222 распространяется на перинодальную зону, миокард предсердий и предсердно-
223 желудочковый узел (ПЖУ).

224 Основной причиной медленно прогрессирующей ПЖБ являются дегенеративно-
225 склеротические изменения внутрижелудочковой проводящей системы (болезнь Ленегра)
226 или фиброз и кальцификация проводящих структур, исходящих
227 из соединительнотканного каркаса сердца (болезнь Лева). Это врожденное первичное
228 электрическое заболевание, появление которого не связано с другой патологией сердца.

229 При пороках аортального и митрального клапанов фиброз и кальцификация
230 клапанных колец могут распространяться на ПСС и соответственно явиться причиной
231 нарушения проводимости.

232 При ИБС поражение ПСС происходит как в результате инфаркта миокарда, так
233 и под влиянием хронической ишемии миокарда.

234 Дегенеративному процессу способствуют возрастной фактор и артериолосклероз,
235 сопутствующий артериальной гипертонии.

236 При врожденных ПЖБ имеются 4 варианта патологии ПСС: отсутствие связи
237 миокарда предсердий с ПЖУ, прерывание связи между ПЖУ и пучком Гиса на уровне
238 пенетрирующего отдела пучка, прерывание целостности проводящей системы на уровне
239 ветвления ножек пучка Гиса и ненормальное формирование с прерыванием пучка Гиса.
240 Прерывания представляют собой фиброзное и жировое, возможно с кальцификатами,
241 замещение специализированной ткани ПСС.

242 Нормальная функция СПУ осуществляется за счет спонтанной деполяризации его
243 пейсмекерных N-клеток (функция автоматизма) и проведения возникающих импульсов
244 транзитными Т-клетками на миокард предсердий через синусно-предсердную зону
245 (синусно-предсердная проводимость). Автономная нервная система модулирует
246 функцию СПУ, так что парасимпатические влияния (ацетилхолин) снижают
247 ее, а симпатические (норадреналин) увеличивают. Нарушения любого из этих
248 компонентов приводят к ДСУ. Важную роль в проявлениях ДСУ играет феномен
249 overdrive suppression — подавление автоматизма водителей ритма более частой внешней
250 импульсацией. Этот механизм определяет активность СПУ и поведение нижележащих
251 водителей ритма в момент прерывания предсердных тахикардий при синдроме
252 тахикардии-брадикардии. На проведение импульсов по ПСС также оказывает
253 существенное влияние автономная нервная система: парасимпатическая система
254 угнетает проведение по ПЖУ, не влияя на внутрисердечную и внутрилелудочковую
255 проводимость, а симпатическая система улучшает проведение по ПЖУ и за счет
256 укорочения рефрактерного периода улучшает проведение по системе Гиса — Пуркинье.
257 При поражении ПСС парасимпатические влияния проявляются в более выраженной
258 форме, а симпатические оказываются не в состоянии улучшить проведение. Кроме этого,
259 важную роль играет сама частота следования импульсов: пропускная способность ПЖУ
260 снижается при его поражении. При вовлечении в патологический процесс
261 внутрилелудочковой ПСС минимальные изменения частоты импульсации способны
262 приводить к блокаде проведения: при критическом урежении ритма за счет спонтанной
263 диастолической деполяризации в волокнах Пуркинье и при критическом учащении
264 ритма за счет удлинения их рефрактерного периода.

265

Основные причины БА:

Внутренние причины

Дегенеративные:	возрастной идиопатический дегенеративный фиброз — болезнь Лева — Ленегра (прогрессирующее поражение ПСС)
Ишемическая болезнь сердца:	хроническая ишемия миокарда, инфаркт миокарда атеросклеротическое, тромботическое или иное поражение артерии СПУ
Инфильтративные процессы:	амилоидоз, саркоидоз, гемохроматоз, лимфогрануломатоз и другие лимфомы, множественная миелома, последствия лучевой терапии
Инфекционные заболевания:	дифтерия, болезнь Чагаса, болезнь Лайма, токсоплазмоз, сифилис
Коллагенозы:	ревматизм, системная красная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит
Нейромышечные заболевания:	миотоническая мышечная дистрофия, синдром Kearns-Saure, миопатия Эрба иперонеальная мышечная атрофия
Воспалительные заболевания:	миокардит, перикардит
Хирургическая травма:	коррекция врожденных пороков сердца, протезирование аортального и митрального клапанов, осложнение радиочастотной катетерной абляции наджелудочковых тахикардий, абляция АВ-соединения

Внешние причины

Лекарственные препараты:	бета-адреноблокаторы, блокаторы «медленных кальциевых» каналов, сердечные гликозиды, антиаритмические препараты I и III классов, др.
Нейро-кардиальные рефлекторные влияния:	гиперчувствительность каротидного синуса, вазовагальные обмороки, рефлекторные реакции на кашель, рвоту, мочеиспускание, дефекацию
Электролитные нарушения:	гипокалиемия, гиперкалиемия.
Эндокринные нарушения:	гипотиреоз, редко гипертиреоз
Гипотермия, повышение внутричерепного давления, гипоксия:	синдром ночного апноэ

266 1.3 Эпидемиология заболевания или состояния (группы заболеваний или 267 состояний)

268 Распространенность ДСУ не может быть оценена адекватно из-за невозможности
269 учета бессимптомных случаев и трудности диагностики патологической брадикардии
270 в популяционных исследованиях.

271 Частота выявления ДСУ растет с возрастом, но в группе старше 50 лет она
272 составляет всего 5/3000 (0,17%). На долю ДСУ приходится около половины всех
273 имплантаций ЭКС***, но число имплантаций неадекватно оценивает частоту
274 симптоматических случаев ДСУ.

275 У здоровых подростков транзиторная ПЖБ I степени встречается в 12% случаев,
276 у молодых взрослых — в 4–6%. Постоянная форма ПЖБ I степени у взрослых старше
277 20 лет встречается не чаще 1%, после 50 лет возрастает до 5% и более, а у лиц старше
278 65 лет может достигать 30%. Частота возникновения приобретенной, далеко зашедшей
279 ПЖБ II степени и полной ПЖБ оценивается в 200 случаев на миллион в год, врожденной
280 полной блокады — 1/20000 новорожденных.

281 ПЖБ, ассоциированная с хирургическим вмешательством, является одним
282 из частых осложнений операции (до 3%) [10].

283 В настоящее время более 85% пациентов с врожденными пороками сердца
284 доживают до взрослого возраста. Чаще всего имеют место нарушения ПЖ проведения
285 (до 65%), реже ДСУ (до 29%).

286 **1.4 Особенности кодирования заболевания или состояния (группы**
287 **заболеваний или состояний) по Международной статистической классификации**
288 **болезней и проблем, связанных со здоровьем**

289 I44 — Предсердно-желудочковая (атриовентрикулярная) блокада и блокада левой ножки
290 пучка Гиса

291 I44.0 — Предсердно-желудочковая блокада первой степени

292 I44.1 — Предсердно-желудочковая блокада второй степени

293 I44.2 — Предсердно-желудочковая блокада полная

294 I44.3 — Другая и неуточненная предсердно-желудочковая блокада

295 I44.4 — Блокада передней ветви левой ножки пучка

296 I44.5 — Блокада задней ветви левой ножки пучка

297 I44.6 — Другие и неуточненные блокады пучка

298 I44.7 — Блокада левой ножки пучка неуточненная

299 I45 — Другие нарушения проводимости

300 I45.0 — Блокада правой ножки пучка

301 I45.1 — Другая и неуточненная блокада правой ножки пучка

302 I45.2 — Двухпучковая блокада

303 I45.3 — Трехпучковая блокада

304 I45.4 — Неспецифическая внутрижелудочковая блокада

- 305 I45.5 — Другая уточненная блокада сердца
306 I45.8 — Другие уточненные нарушения проводимости
307 I45.9 — Нарушение проводимости неуточненное
308 I46 — Остановка сердца
309 I46.0 — Остановка сердца с успешным восстановлением сердечной деятельности
310 I46.1 — Внезапная сердечная смерть, так описанная
311 I46.9 — Остановка сердца неуточненная
312 I49.5 — Синдром слабости синусового узла

313 **1.5 Классификация заболевания или состояния (группы заболеваний или**
314 **состояний)**

315 **Дисфункция синусового узла (ДСУ)**

316 ДСУ объединяет спектр аритмий:

317 - синусовая брадикардия,

318 - отказ синусового узла,

319 - синусно-предсердная блокада (СПБ), которую разделяют на:

320 - СПБ I степени (удлинение времени СП проведения),

321 - СПБ II степени тип I — прогрессивное увеличение времени СП проведения
322 с последующей блокадой импульса в СП зоне,

323 - СПБ II степени тип II — периодическое блокирование импульсов в СП зоне
324 без предшествующего увеличения времени СП проведения,

325 - далеко зашедшая СПБ II степени — блокирование каждого второго или
326 нескольких синусовых импульсов подряд,

327 - СПБ III степени — полная блокада СП проведения с отсутствием
328 возбуждений предсердий из СПУ,

329 - синдром тахи-брадикардии — чередование пароксизмов наджелудочковой
330 тахикардии (фибрилляция предсердий (ФП) и трепетание предсердий (ТП) с эпизодами
331 синусового или замещающего ритма с низкой частотой желудочковых сокращений
332 (ЧЖС) и/или асистолией желудочков,

333 - хронотропная несостоятельность (недостаточность).

334 **Предсердно-желудочковые или атриовентрикулярные блокады**

335 1. По этиологии различают приобретенные и врожденные ПЖБ.

336 2. По степени выраженности нарушений различают:

337 • ПЖБ I степени — замедление проведения импульса от предсердий к желудочкам
338 с проведением каждого импульса.

339 • ПЖБ II степени — периодические прерывания проведения предсердных импульсов
340 на желудочки.

341 Она имеет три разновидности:

342 - Мобитц тип I — блокирование импульса с предшествующим прогрессивным
343 замедлением проведения от предсердий к желудочкам (периодика Венкебаха),

344 - Мобитц тип II — блокирование импульса без предшествующего удлинения
345 времени предсердно-желудочкового проведения,

346 - Далеко зашедшая ПЖБ II степени — блокирование каждого второго или
347 нескольких подряд предсердных импульсов.

348 • ПЖБ III степени — полная блокада проведения предсердных импульсов на желудочки
349 с развитием полной предсердно-желудочковой диссоциации.

350 3. По локализации нарушений проведения в АВС выделяют:

351 - блокада на уровне предсердий (внутрипредсердная),

352 - на уровне предсердно-желудочкового узла (ПЖУ),

353 - ниже ПЖУ:

354 - на уровне пучка Гиса — интрагисисальные,

355 - на уровне ветвления ножек пучка Гиса — инфрагисисальные.

356 4. Изолированные блокады разветвлений пучка Гиса обозначают как фасцикулярные
357 (пучковые) блокады:

358 - блокада правой ножки пучка Гиса (БПНПГ),

359 - передневерхняя фасцикулярная блокада (ПВФБ),

360 - задненижняя фасцикулярная блокада (ЗНФБ),

361 - комбинации из двух указанных блокад обозначают как двухпучковые
362 (бифасцикулярные) блокады: БПНПГ в сочетании с ПВФБ, БПНПГ в сочетании с ЗНФБ
363 и блокада левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ),

364 - трехпучковой (трифасцикулярной) блокадой понимают альтернирующую
365 внутрижелудочковую блокаду (истинная трехпучковая блокада), когда чередуются две
366 разновидности двухпучковых блокад (например, БПНПГ и БЛНПГ), или сочетание
367 двухпучковой блокады с ПЖБ I–II степени.

368 5. По характеру течения ПЖБ разделяют на преходящие (интермиттирующие)
369 и постоянные (персистирующие).

370 **1.6 Клиническая картина заболевания или состояния (группы заболеваний**
371 **или состояний)**

372 Клинические проявления БА разнообразны и часто неспецифичны. Может быть
373 бессимптомное течение. В клинической картине брадиаритмии выделяют две основные
374 группы симптомов: церебральные и кардиальные. Постоянные и длительно
375 существующие брадиаритмии могут проявляться усталостью, повышенной
376 утомляемостью, вялостью, апатией, снижением умственных способностей. Наиболее
377 ярко проявляются последствия гипоперфузии головного мозга: при острых нарушениях
378 могут возникать внезапные головокружения, спутанность сознания, в более тяжелых
379 случаях — пресинкопальные и синкопальные состояния вплоть до развернутой картины
380 приступов Морганьи — Эдамса — Стокса.

381 БА могут приводить также к усугублению течения стенокардии, артериальной
382 гипертензии и хронической сердечной недостаточности. Нередко наблюдается снижение
383 толерантности к физическим нагрузкам с обычными в этих случаях проявлениями в виде
384 быстрой усталости и одышки [11,12].

385 **2. Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний),** 386 **медицинские показания и противопоказания к применению методов диагностики**

387 **Критерии установления диагноза.**

388 Диагноз БА и нарушений проводимости устанавливается в соответствии с
389 классификациями, представленными в разделе 1.5. на основании документированного
390 подтверждения любым из инструментальных методов исследования:
391 электрокардиография и/или длительное мониторирование ЭКГ в сочетании с клинической
392 симптоматикой.

393 Диагностика БА включает следующие этапы:

- 394 • выяснение жалоб и сбор анамнеза;
- 395 • выполнение ЭКГ и/или длительного мониторирования ЭКГ;
- 396 • объективное обследование;
- 397 • другие дополнительные методы исследования — на втором этапе обследования (по
398 показаниям);
- 399 • исключение обратимых причин при необходимости;

400 Необходимо классифицировать анатомические уровни нарушений, вызвавшие БА
401 или нарушения проводимости: СПУ, ПЖУ и нарушения проводимости в ножках п. Гиса

402 **Принципы формулировки диагноза.**

403 Необходимо указать уровень нарушений: СПУ, ПЖУ или ножки п.Гиса.

404 При нарушениях СПУ: указывается основное состояние – ДСУ, разновидность
405 дисфункции: синусовая брадикардия, отказ синусового узла, СПБ, с указанием степени,
406 синдром тахи-брадикардии или хронотропная несостоятельность.

407 *Примеры формулировки диагноза:*

- 408 • ДСУ. Синусовая брадикардия.
- 409 • ДСУ. СПБ II степени тип II.
- 410 • ДСУ. Синдром тахи-брадикардии.

411 При нарушениях ПЖУ – если известно, то указывается этиологический фактор
412 ПЖБ и степень блокады.

413 **2.1 Жалобы и анамнез**

414 Клинические проявления и жалобы зависят от того, является ли брадикардия
415 постоянной или имеет преходящий характер. При этом даже при выраженной
416 брадикардии клинических проявлений может не быть. Бессимптомный характер, как
417 правило, носят БА, которые появляются в период сна. Особое внимание заслуживают
418 пациенты с синкопальными и пресинкопальными состояниями.

419 Симптоматическая брадикардия может быть определена как документированная
420 брадикардия, которая непосредственно соответствует клиническим проявлениям
421 обмороков или предобморочных состояний, преходящих головокружений или слабости,
422 симптомам сердечной недостаточности или спутанности сознания.

423 **2.2. Физикальное обследование**

424 При длительно существующей брадикардии может наблюдаться бледность кожных
425 покровов.

426 Брадикардия может определяться при пальпации пульса на периферических
427 артериях. Однако наиболее информативным является аускультация сердца, когда
428 выслушиваются редкие сердечные тоны.

429 • Рекомендуется проведение физикального обследования пациента для диагностики
430 основного заболевания, вызвавшего БА, с особым вниманием к выявлению преходящих,
431 обратимых причин БА, в том числе определяемых проводимым лечением [15–19].

432 **ЕОК — нет (УУР А, УДД 3)**

433 • Рекомендуется при выявлении ятрогенной, связанной с лекарственными
434 препаратами, природы БА определить, является ли применение причинных препаратов
435 обязательным у данного пациента [13–19].

436 **ЕОК — нет (УУР А, УДД 3)**

437 •Рекомендуется в процессе обследования проводить выявление и диагностику
438 сопутствующих нарушений ритма сердца и аритмогенных электрокардиографических
439 синдромов [13–19].

440 **ЕОК — нет (УУР А, УДД 3)**

441 **Комментарии:** *При сборе анамнеза необходимо уточнить частоту, время,*
442 *продолжительность, сроки возникновения, факторы, провоцирующие и смягчающие*
443 *симптомы, на основании которых можно заподозрить брадикардию или нарушения*
444 *проводимости. Также важно отметить связь симптомов с лекарственными*
445 *препаратами, едой, медицинским вмешательством, эмоциональным расстройством,*
446 *физической нагрузкой, изменениями положения тела или другими факторами (например,*
447 *мочепускание, дефекация, кашель, длительное положение стоя, бритье, влияние*
448 *стесняющей одежды и поворот головы), что может помочь провести*
449 *дифференциальный диагноз.*

450 *Брадикардия и нарушения ритма могут быть первым проявлением системных*
451 *заболеваний или болезней сердца, поэтому полный сбор анамнеза должен включать*
452 *всестороннюю оценку риска сердечно-сосудистых заболеваний, семейный анамнез*
453 *заболеваний других органов и систем.*

454 Алгоритм действий врача — таблица 1.

455 **2.3. Лабораторные диагностические исследования**

456 Специфической лабораторной диагностики БА не существует. Изменения
457 в лабораторных показателях неспецифичны и являются проявлениями других
458 сопутствующих заболеваний.

459 В отдельных случаях некоторые состояния могут быть связаны с брадикардией,
460 а лабораторные исследования, направленные на диагностику конкретного заболевания,
461 могут быть полезны (например, тестирование функции щитовидной железы у пациентов
462 с брадикардией при подозрении на гипотиреоз). Тем не менее не было исследований
463 с систематическим изучением дополнительной ценности лабораторных обследований
464 при БА.

465 •Рекомендуется проведение общего (клинического) и биохимического анализа
466 крови в рамках первичного обследования и в процессе динамического наблюдения у всех
467 пациентов с желудочковыми тахиаритмиями для исключения сопутствующих
468 заболеваний

469 **ЕОК нет (УУР С, УДД 5)**Рекомендовано пациентам с брадикардией проведение
470 лабораторных анализов (например, исследование уровня тиреотропного гормона в крови,
471 исследование натрия и калия в крови, исследование уровня водородных ионов крови) для
472 подтверждения основного диагноза [20–24].

473 **ЕОК — I C (УУР С, УДД 4)**

474 **2.4 . Инструментальные диагностические исследования**

475 **2.4.1 . Электрокардиография**

476 В большинстве случаев достаточную информацию дают неинвазивные методы
477 исследования. При постоянной форме БА наружная электрокардиография оказывается
478 вполне информативной. При интермиттирующем течении БА для выявления и клинико-
479 электрокардиографической корреляции требуются методы длительного
480 мониторинга электрокардиограммы (ЭКГ). В случаях, когда переходящие БА
481 предполагаются, но не документированы, требуется использование провоцирующих
482 проб.

483 • Пациентам с подозрением на брадикардию или нарушение проводимости
484 проведение электрокардиографии в 12 отведениях рекомендуется для документации
485 характера ритма, частоты сокращений, проводимости, а также для верификации
486 структурных и системных заболеваний сердца [15–18].

487 **ЕОК — нет (УУР А, УДД 3)**

488 **Комментарии:** *Электрокардиографическое исследование в покое с использованием*
489 *12 стандартных отведений показано всем пациентам с имеющимися или*
490 *предполагаемыми БА. Даже если оно не решает задач по выявлению и диагностике*
491 *аритмий ввиду их отсутствия в момент регистрации ЭКГ, оно несет важную*
492 *информацию относительно частоты ритма сердца, состояния предсердно-*
493 *желудочковой и внутрижелудочковой проводимости, процессов реполяризации*
494 *миокарда желудочков. Оно позволяет выявить нарушения и признаки, с высокой*
495 *вероятностью указывающие на риск развития определенных видов аритмий со схожей*
496 *БА симптоматикой (обмороки). К их числу относятся проявления аномального*
497 *предсердно-желудочкового проведения (короткий интервал PQ, преждевременное*
498 *возбуждение желудочков), электрокардиографические проявления синдрома Бругада,*
499 *удлинение или укорочение интервала QT, волна эpsilon при аритмогенной*
500 *правожелудочковой кардиомиопатии. Регистрация ЭКГ покоя обязательна перед*

501 выполнением таких исследований, как амбулаторное мониторирование ЭКГ, проба
502 с физической нагрузкой, электрофизиологическое исследование (ЭФИ) сердца.

503 **2.4.2 . Длительное мониторирование ЭКГ**

504 Существует несколько видов амбулаторного мониторирования ЭКГ. Первый из них
505 предполагает классическую форму суточного (или более) мониторирования ЭКГ
506 по Холтеру, которая позволяет проводить наблюдение за ритмом сердца на протяжении
507 24–48 часов, хотя имеются варианты регистрирующих устройств с длительностью
508 записи до 7 суток.

509 Второй разновидностью является интермиттирующая запись ЭКГ с помощью
510 портативных регистраторов, объединяемых под общим названием «амбулаторные
511 регистраторы событий».

512 Наиболее распространены для диагностики БА «непрерывные регистраторы
513 с петлевой памятью». Они позволяют фиксировать симптоматичные события
514 на протяжении от 30 суток до 3 лет.

515 • Для выявления брадикардии и нарушений проводимости, клинико-
516 электрокардиографической корреляции с симптомами рекомендуется проведение
517 длительного мониторирования сердечного ритма [25–28].

518 **ЕОК — нет I C (УУР С, УДД 4)**

519 • Рекомендуется выполнение длительного мониторинга сердечного ритма
520 пациентам с документированной или подозреваемой брадикардией или нарушением
521 проводимости для установления корреляции между частотой сердечных сокращений или
522 нарушениями проводимости с симптомами с использованием кардиомонитора,
523 выбранного на основе частоты, характера симптомов, а также предпочтения пациента
524 [25–28].

525 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

526 • Рекомендуется использовать различные виды длительного мониторирования ЭКГ
527 в зависимости от частоты развития клинических симптомов, связанных с брадикардиями
528 или нарушениями проводимости [29–34].

529 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 2)**

530 • Рекомендуется при хронической БА без гемодинамической нестабильности и при
531 интермиттирующих редко возникающих БА проведение обследования пациента
532 в амбулаторных условиях или в условиях госпитальной телеметрической регистрации
533 ЭКГ [29–38].

534 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 2)**

535 **Комментарии:** *Непрерывное наблюдение за ритмом сердца может потребовать*
536 *дифференцировки нормальных явлений и патологических состояний. Физиологическая*
537 *синусовая брадикардия может наблюдаться в дневное время суток в состоянии покоя*
538 *и в ночное время в качестве преобладающего ритма сердца. Предельное нормальное*
539 *снижение частоты ритма днем в покое определяется величиной 40 имп/мин, ночью —*
540 *35 имп/мин и не зависит от пола и возраста. Допускается также развитие синусовых*
541 *пауз, длительность которых не превышает 2 секунд. Часто у спортсменов высокой*
542 *квалификации, а также у лиц тяжелого физического труда, у юношей регистрируют*
543 *брадикардию с частотой ниже указанных цифр, возможно, в сочетании с другими*
544 *проявлениями дисфункции синусового узла. Эти состояния могут быть отнесены*
545 *к нормальным только в тех случаях, когда они бессимптомны и имеется адекватный*
546 *прирост частоты синусового ритма в ответ на физическую нагрузку. У здоровых лиц*
547 *транзиторное развитие ПЖБ I степени не является редкостью. При ее постоянной*
548 *регистрации узкие комплексы QRS и исчезновение блокады при физической нагрузке или*
549 *при пробе с Атропином** указывают на функциональный характер нарушения.*
550 *В преходящей форме ночью во сне ПЖБ II степени тип I может регистрироваться*
551 *у молодых здоровых лиц, особенно у хорошо тренированных спортсменов. Прогноз при*
552 *этом абсолютно благоприятен.*

553 **Методы длительного мониторинга ЭКГ в зависимости от частоты**
554 **развития эпизодов БА [13]:**

Частота эпизодов	Метод и длительность мониторинга
Ежедневно	Суточное мониторирование 24 часа, госпитальное мониторирование или телеметрическая регистрация ЭКГ
Еженедельно и чаще	Суточное мониторирование 24 часа, госпитальное мониторирование или телеметрическая регистрация ЭКГ до 7 суток или наружный петлевой регистратор
Ежемесячно	Наружный петлевой регистратор 14–30 суток
Реже 1 раза в месяц	Имплантируемый петлевой регистратор

555 **2.4.3 . Методы визуализации**

556 Так как БА или нарушения проводимости могут выявляться при самых разных
557 сердечно-сосудистых и системных заболеваниях, а прогноз документированных БА
558 в этих случаях зависит от основного заболевания сердца, оценка структурных
559 и функциональных характеристик сердца необходима. Выполнение
560 эхокардиографического исследования у симптомных пациентов позволяет
561 диагностировать структурные заболевания (например, аортальный стеноз,
562 гипертрофическую кардиомиопатию или сердечную недостаточность). Могут

563 использоваться и другие методы визуализации для диагностики других заболеваний
564 сердца, связанных с брадикардией или нарушениями проводимости, которые
565 не выявляются с использованием эхокардиографии [39].

566 • Пациентам с брадикардией или нарушениями проводимости БЛНПГ и ПЖБ II
567 степени Мобитц II, ПЖБ высокой степени или ПЖБ III степени трансторакальная
568 эхокардиография рекомендована, если подозревается структурное заболевание сердца
569 [40–54].

570 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

571 • При оценке пациентов с бессимптомной синусовой брадикардией или ПЖБ
572 I степени и отсутствием клинических признаков структурного заболевания сердца
573 рутинная томография сердца не рекомендована [55–60].

574 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 5)**

575 • Сердечная визуализация рекомендована пациентам с вероятной или
576 документированной симптомной брадикардией для оценки наличия структурной
577 патологии сердца, систолической функции ЛЖ и диагностики потенциальных причин
578 нарушения проведения.

579 **ЕОК - I C (УУР А, УДД 2)**

580 • Для исключения поражения миокарда в диагностике специфических состояний,
581 связанных с нарушением проводимости, требующих имплантации ЭКС, следует
582 рассмотреть выполнение мультимодальной визуализации (МРТ, КТ или ПЭТ), особенно у
583 пациентов <60 лет [461-465].

584 **ЕОК - IIa C (УУР А, УДД 3)**

585

586 **2.4.4 . Диагностика брадиаритмий и ночного апноэ**

587 Ночные БА распространены как у здоровых лиц, так и при различных
588 заболеваниях. Синусовая брадикардия является наиболее часто встречающейся
589 БА во время сна. Тем не менее синусовый арест, блокады СПУ, все степени ПЖБ, ритм
590 ПЖУ и периоды асистолии также встречаются. Это особенно распространено у молодых
591 и у подготовленных спортсменов. В большинстве случаев это физиологические,
592 опосредованные, бессимптомные события, которые не требуют вмешательства. Частота
593 ночных БА, по-видимому, уменьшается у людей среднего и старшего возраста. У таких
594 людей в период бодрствования аритмии встречаются редко, и эти ночные аритмии
595 обычно протекают бессимптомно.

596 Лечение апноэ сна не только уменьшает частоту и выраженность эпизодов
597 апноэ/гипопноэ, но также устраняет необходимость в имплантации кардиостимулятора
598 у большинства пациентов.

599 • Пациентам с ночной брадикардией или нарушением проводимости
600 и документированным обструктивным апноэ сна рекомендовано лечение апноэ во сне
601 (например, путем поддержания постоянного положительного давления в дыхательных
602 путях и снижения веса) [61–78].

603 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

604 • Пациентам, у которые рассматриваются на предмет постоянной
605 кардиостимуляции по поводу брадикардии или нарушения проводимости, рекомендован
606 скрининг на синдром апноэ во сне [77–78, 466 - 468].

607 **ЕОК — I C (УУР В, УДД 3)**

608 **2.5. Иные диагностические исследования**

609 **2.5.1 . Электрокардиография с физической нагрузкой**

610 Для диагностики хронотропной несостоятельности определяют так называемый
611 хронотропный индекс, который вычисляют по результатам электрокардиографии с
612 физической нагрузкой (ПФН) по протоколу максимальной переносимости,
613 лимитированной симптомами физической нагрузки. Он представляет собой отношение
614 разности между пиковой ЧСС на максимуме нагрузки и ЧСС покоя (хронотропный
615 ответ) к разности между предсказанной по возрасту максимальной ЧСС, вычисляемой по
616 формуле $220 - \text{возраст}$ имп/мин, и ЧСС покоя (хронотропный резерв) [5]. Полагают, что
617 в норме величина хронотропного индекса $\geq 80\%$. Изучение хронотропной функции у
618 пациентов с дисфункцией синусового узла оказывается крайне ценным в связи с
619 выбором частотно-адаптивной функции ЭКС***, планируемого для имплантации.

620 • Рекомендуется проведение электрокардиографии с физической нагрузкой для
621 оценки хронотропной функции пациентам с ДСУ [86, 272–274, 469].

622 **ЕОК — IIa B (УУР С, УДД 5)**

623 • Рекомендуется проведение электрокардиографии с физической нагрузкой для
624 оценки хронотропной функции пациентам с врожденной ПЖБ III степени при решении
625 вопроса о занятиях физкультурой и спортом [272–274].

626 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 5)**

627 • Рекомендуется проведение электрокардиографии с физической нагрузкой для
628 выявления ДСУ или ПЖБ пациентам с клинической симптоматикой БА, провоцируемой

629 физической активностью [76,75, 86, 405–408, 470-472].

630 **ЕОК — Пь С (УУР С, УДД 4)**

631 **Комментарии:** *За счет повышения частоты импульсации СУ или за счет*
632 *развития ишемии миокарда ПФН способна выявить ДСУ (частотно-зависимая САБ,*
633 *выраженная брадикардия или остановки СУ при нагрузке) и нарушения предсердно-*
634 *желудочковой проводимости (ПЖБ II и III степени при нагрузке). Это может явиться*
635 *важным объяснением причины синкопальных состояний, возникающих при физической*
636 *активности.*

637 **2.5.2 . Ортостатическая проба**

638 Для дифференциальной диагностики необъяснимых обмороков их генез и связь
639 с другими причинами, кроме БА, может верифицироваться методами ортостатических
640 тестов с использованием поворотного стола.

641 •Рекомендуется проведение пассивной длительной ортостатической пробы (проба
642 на наклонном столе головой вверх) пациентам с синкопальными состояниями, генез
643 которых неясен после исключения кардиальной патологии (ЭКГ, ЭхоКГ,
644 мониторинг ЭКГ, внутрисердечное ЭФИ) для выявления вазовагальных причин
645 [410-423,470].

646 **ЕОК — Па В (УУР А, УДД 2)**

647 **Комментарии:** *Для проведения длительной ортостатической пробы используют*
648 *специализированный поворотный стол, который позволяет переводить пациента*
649 *из горизонтального в вертикальное положение под любым углом наклона (обычно угол*
650 *составляет 60–70°). «Пассивность» пробы указывает, с одной стороны,*
651 *на отсутствие активных мышечных движений ног при повороте в ортостатическое*
652 *положение и пребывании в нем, поскольку пациент упирается ногами в специальную*
653 *площадку. С другой стороны, «пассивность» означает факт отсутствия*
654 *медикаментозных провокаций (введения изопроterenола или нитроглицерина).*

655 *Длительность ортостатического положения в различных протоколах колеблется*
656 *от 10 мин. до 1 ч. Проба продолжается до развития приступа потери сознания*
657 *(значимый для постановки диагноза результат исследования) или до 45 мин.*
658 *при отрицательном результате. В момент синкопе фиксируют показатели ЭКГ,*
659 *АД, электроэнцефалограммы и другие. По завершении пробы делается заключение,*
660 *в котором указывается факт отсутствия или наличия потери сознания, время*
661 *возникновения и тип индуцированного приступа.*

662 **2.5.3 . Массаж каротидного синуса**

663 Для дифференциальной диагностики с состояниями, связанными
664 с парасимпатическими влияниями на сердце, используют пробы механического
665 воздействия на ветви блуждающего нерва.

666 • Пациентам с брадикардией или синкопальными состояниями неясного генеза при
667 отсутствии кардиальных причин рекомендуется проведение пробы с массажем
668 каротидного синуса для диагностики синдрома каротидного синуса [424-426,473].

669 **ЕОК — I B (УУР С, УДД 4)**

670 **Комментарии:** *Проба основана на рефлекторном усилении парасимпатических*
671 *влияний на сердце при механическом воздействии на синокаротидную область.*
672 *Проявлениями служат снижение частоты синусового ритма и замедление ПЖ*
673 *проводимости. При этом диагностическое значение имеет синусовая пауза*
674 *продолжительностью более 3 секунд (кардиоингибиторный вариант ответа).*

675 *Перед проведением массажа необходимо убедиться в отсутствии шума над*
676 *сонными артериями. Рекомендуют даже проводить предварительное доплеровское*
677 *исследование сонных артерий. Проба выполняется в положении пациента лежа.*
678 *Регистрируются ЭКГ и АД. Поочередно, справа и слева, проводится массаж*
679 *синокаротидных зон продолжительностью обычно не более 10 секунд.*

680 *Если у пациента с подозрением на синдром каротидного синуса в положении лежа*
681 *получен отрицательный результат, проба повторяется в положении стоя. Снижение*
682 *систолического АД более чем на 50 мм рт. ст. при наличии симптомов*
683 *(головокружение, обморок) расценивается как значимый результат (вазодепрессорный*
684 *вариант ответа). Бывают смешанные формы вариантов ответа.*

685 **2.5.4 Медикаментозные тесты**

686 • Рекомендуется проведение теста с внутривенным введением Атропина** для
687 выявления функциональной синусовой брадикардии и ПЖБ I степени у бессимптомных
688 пациентов [137,430–432].

689 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

690 **Комментарии:**

691 *Рекомендуется проведение теста с внутривенным введением Атропина** в дозе*
692 *0,02–0,04 мг/кг (максимально до 2 мг) для выявления функциональной синусовой*
693 *брадикардии и ПЖБ I степени у бессимптомных пациентов. Увеличение частоты*
694 *синусового ритма более чем на 25% от исходной или более 90 имп/мин свидетельствует*
695 *о вагусной природе дисфункции синусового узла. Исчезновение нарушений*

696 ПЖ проводимости указывает на их вагусную природу и локализацию нарушения
697 на уровне ПЖУ.

698 **2.5.5 Генетическое тестирование**

699 Большинство нарушений проводящей системы сердца связаны с возрастными или
700 структурными аномалиями проводящей системы сердца. При этом идентифицированы
701 гены, ответственные за наследственные заболевания сердца ассоциированные с
702 нарушениями проводимости [474- 476].

703 Генетические мутации ассоциированы с рядом аномалий, которые могут
704 проявляться изолировано нарушением проводимости или в комбинации с
705 кардиомиопатиями, врожденной патологией сердца или внесердечными заболеваниями.
706 Большинство генетически опосредованных нарушений проводимости имеют аутосомно-
707 доминантный тип наследования [474,475]

708

709 • Рекомендовано генетическое тестирование у пациентов с ранней манифестацией
710 (<50 лет) брадиаритмий и нарушений проводимости [474,477].

711 **ЕОК - Па С (УУР А УДД 3)**

712 • Рекомендовано генетическое консультирование семьи после выявления у ее
713 членов патологического генетического варианта, который объясняет клинический
714 фенотип нарушения проводящей системы сердца у первичного пациента [474].

715 **ЕОК - Па С (УУР А УДД 3)**

716 **2.5.6 Имплантируемые кардиомониторы*****

717 У пациентов могут иметь место нечастые эпизоды брадикардии, которые не могут
718 быть обнаружены стандартными методами наружного мониторинга ЭКГ. Если
719 диагностируемые события возникают очень редко, а также при обмороках
720 по недиагностированной причине возможно использование имплантируемых
721 кардиомониторов (ИКМ) *** — регистрирующих устройств, которые представляют
722 разновидность петлевых регистраторов. Они способны выполнять длительный
723 мониторинг (до 3 лет) и не зависят от активного участия пациента. ИКМ***
724 увеличивают продолжительность амбулаторного мониторинга и дают возможность
725 получить необходимую корреляцию между брадикардией, симптомами и обмороками.

726 ИКМ*** предназначены для автоматического определения нарушений ритма и
727 записи приступов аритмий у пациента. При этом устройство может распознать как
728 брадиаритмии (асистолию более 3–4,5 секунд, синусовую брадикардию), так
729 и тахикардии (желудочковую тахикардию, предсердные тахикардии и фибрилляцию

730 предсердий). Алгоритм распознавания в основном основан на измерении циклов
731 RR-интервалов ЭКГ, записанной устройством. При возникновении интервала RR свыше
732 заданного времени устройства фиксируют данный участок ЭКГ в памяти. При
733 возникновении ФП устройства определяют нерегулярные, хаотичные интервалы RR
734 и классифицирует их как ФП, после чего происходит запись ЭКГ до начала детекции
735 и последующее сохранение его в памяти.

736 Ряд устройств может быть активирован также и пациентом для записи сердечного
737 ритма во время симптоматического приступа. ИКМ*** позволяют установить
738 взаимосвязь симптомов с сердечным ритмом у пациентов с редкими приступами
739 аритмий, регистрировать нарушения ритма в течение длительного времени; а также
740 выявлять асимптомные, клинически значимые нарушения ритма. Основным
741 преимуществом метода является возможность визуализации и анализа записи ЭКГ
742 ретроспективно после возникновения события.

743 Поэтому в настоящее время имплантируемые устройства используются как для
744 выявления брадиаритмий, так и для диагностики и ведения пациентов с тахиаритмиями
745 и фибрилляцией предсердий.

746 • Пациентам с редкими симптомами (>30 дней между симптомами),
747 предположительно вызванными брадикардией, рекомендована имплантация петлевого
748 регистратора*** для долговременной регистрации электрической активности
749 проводящей системы сердца, если изначально неинвазивная оценка другими методами
750 неинформативна [87–102,478-480].

751 **ЕОК — I A (УУР В, УДД 2)**

752 • Имплантация петлевого регистратора*** для долговременной регистрации
753 электрической активности проводящей системы сердца рекомендовано вместо полного
754 традиционного обследования пациентам с обмороками неясного генеза и сохранной
755 функцией левого желудочка, когда клинические или ЭКГ-данные позволяют
756 предположить аритмогенную природу обмороков [87–102].

757 **ЕОК — I A (УУР В, УДД 2)**

758 **Комментарии:** *Диагностическая значимость данных ИКМ*** не вызывает*
759 *сомнения и изучалась в следующих клинических ситуациях: у пациентов с подозрением*
760 *на эпилепсию с неэффективным лечением данной патологии; у пациентов*
761 *с предварительным диагнозом нейрогенный обморок без установленного механизма*
762 *спонтанного обморока; у пациентов с блокадой ножки пучка Гиса, у которых вероятен*
763 *диагноз пароксизмальная атриовентрикулярная блокада, несмотря на отрицательные*

764 результаты полного электрофизиологического обследования; у пациентов
765 с органическими заболеваниями сердца и/или нестойкой желудочковой тахикардией,
766 у которых вероятно наличие желудочковой тахикардии, несмотря на отрицательные
767 результаты полного электрофизиологического обследования.

768 *Диагностически не значимыми данные ИКМ*** являются в случаях, когда связь*
769 *синкопе с нарушениями ритма (брадикардия или тахикардия) очевидна;*
770 *пресинкопальные состояния с признаками АВ-блокады II и III степени и паузами более 3*
771 *секунд (исключая ситуации во время сна и ситуации, связанные с медикаментозной*
772 *терапией, урежающей ритм), а также тахикардии с ЧСС более 160 имп/мин*
773 *продолжительностью более 32 комплексов; во время синкопальных состояний*
774 *не выявляется аритмогенная причина по данным ИКМ***. Данные ИКМ*** не имеют*
775 *диагностической значимости в случаях, когда аритмия носит асимптомный характер*
776 *(кроме перечисленных выше нарушений ритма); синусовая брадикардия без связи*
777 *с симптомами.*

778 **2.5.7 Внутрисердечное электрофизиологическое исследование**

779 Внутрисердечное электрофизиологическое исследование (ЭФИ) является
780 инвазивной катетерной процедурой, которая может использоваться для проверки
781 проводящей системы сердца и оценки потенциальной индуцируемости различных
782 тахикардий. ЭФИ хорошо переносится, и риск серьезных осложнений, таких как
783 тампонада сердца и угрожающие жизни аритмии, минимальны. Целью ЭФИ в контексте
784 оценки брадикардии является выявление наличия аномальной функции синусового узла
785 или атриовентрикулярной проводимости, а также анатомический уровень нарушения
786 проводимости. Возможно введение фармакологических препаратов во время ЭФИ как
787 части протокола исследования для модуляции вегетативного тонуса или «стресса»
788 синусового узла, атриовентрикулярной проводимости и внутрижелудочковой
789 проводимости. ЭФИ у пациентов, у которых предположительно имеется брадикардия,
790 может выявить возможные механизмы для появления симптомов. ЭФИ обычно не
791 выполняется как первая линия для диагностической оценки у пациентов с подозрением
792 на брадикардию. Большинство пациентов, которым выполняется ЭФИ, уже прошли ряд
793 неинвазивных кардиологических исследований, таких как ЭКГ, тестирование на
794 поворотном столе, эхокардиограмма и/или амбулаторный электрокардиографический
795 мониторинг, который был неубедительным.

796 Также выполняются ЭФИ у пациентов с необъяснимыми обмороком или
797 предобморочными состояниями для верификации случаев, связанных с брадикардией.

798 • Пациентам с симптомами, предположительно связанными с брадикардией,
799 внутрисердечное электрофизиологическое исследование рекомендовано для
800 диагностики и определения механизма брадикардии, если исходно неинвазивные
801 методы неинформативны [52,103–123,481,482].

802 **ЕОК — Пв В (УУР В, УДД 3)**

803 • У пациентов с обмороками и двухпучковой блокадой, следует рассмотреть
804 выполнение ЭФИ если после выполнения неинвазивных методов диагностики
805 причина обморока остается неясной или если требуется немедленное принятие
806 решения об имплантации ЭКС у тяжелых пациентов, в тех случаях, когда
807 эмпирическая имплантация ЭКС не желательны (особенно у пожилых и
808 ослабленных пациентов) [482-488].

809 **ЕОК - Па В (УУР А УДД 3)**

810

811 **Комментарии:** Клиническое выявление возможной ДСУ зачастую затруднено,
812 поскольку вызывающие симптомы аномалии могут быть преходящими
813 и доброкачественными, а у не имеющих симптомов пациентов возможно значительное
814 изменение variability синусового ритма. Были предложены различные инвазивные
815 тесты для оценки функции СПУ. Время восстановления функции СПУ (ВВФСУ)
816 используется для оценки влияния сверхчастого подавления на автоматизм СПУ. Часто
817 вносится поправка на длительность синусового цикла (ДСЦ), что определяется как
818 скорректированное время восстановления функции СПУ ($KBVFCU = VVFCU - DCU$).
819 Синусно-предсердное проведение может быть измерено непосредственно или
820 с помощью нанесения предсердного экстрасимула на фоне синусового ритма (3–5) или
821 при стимуляции предсердий.

822 Возможна регистрация электрограмм СПУ с помощью катетера, и эти прямые
823 измерения времени проведения хорошо коррелируют с непрямые измерениями,
824 описанными выше. Время восстановления функции СПУ и время синусно-предсердного
825 проведения часто отличаются от нормы у пациентов со структурным поражением
826 синусового узла, но обычно соответствуют норме у пациентов с синусовыми БА,
827 вызванными преходящими факторами, такими как влияние автономной нервной
828 системы.

829 Полная оценка функции СПУ часто требует непрерывной или периодической
830 амбулаторной регистрации ЭКГ, проведения нагрузочных тестов для оценки
831 хронотропной состоятельности, теста на поворотном столе (тилт-тест) или

832 манипуляций с автономной нервной системой наряду с данными ЭФИ. Пациенты
833 с дисфункцией СПУ также могут быть подвержены другим аритмиям, которые могут
834 быть выявлены при ЭФИ.

835 Электрограмма пучка Гиса позволяет разграничить три анатомических уровня
836 ПЖБ.

837 1. Проксимальный (над пучком Гиса), отражающий задержку или блокаду
838 проведения в ПЖУ — удлинение АН-интервала.

839 2. Медиальный (интрагиссальный), отражающий задержку или блокаду
840 проведения внутри пучка Гиса — удлинение длительности спайка пучка Гиса.

841 3. Дистальный (инфрагиссальный), отражающий блокаду или задержку
842 на участке регистрации, дистальном по отношению к спайку пучка Гиса — удлинение
843 HV-интервала [129–131].

844 Согласно электрокардиографической классификации, проводящая система
845 желудочков состоит из трех пучков: передней и задней ветвей левой ножки и правой
846 ножки пучка Гиса. Интервал HV у пациентов с двухпучковой блокадой характеризует
847 условия и время проведения импульса через сохранившуюся ножку. Большинство данных
848 о значимости интервала HV в отношении прогноза последующего развития АВ-блокады
849 были получены у пациентов с двухпучковой блокадой. Пациенты с двухпучковой
850 блокадой и удлиненным интервалом HV (>55 мс) имеют повышенный риск развития
851 трехпучковой блокады. Хотя удлинение интервала HV встречается довольно часто,
852 полная блокада развивается редко (обычно 2–3% в год и особенно если интервал HV
853 превышает 100 мс). При этом вероятность ее прогрессирования в отсутствие влияния
854 острых воздействий (препараты, электролитные нарушения, ишемия) невысока.

855 Итак, интервал HV имеет высокую чувствительность (82%), но низкую
856 специфичность (63%) для прогноза развития полной трехпучковой блокады. Для
857 повышения специфичности электрофизиологического тестирования пациентов
858 с двухпучковой блокадой применяется частая стимуляция предсердий. Аномальный
859 ответ состоит в возникновении блокады проведения дистальнее пучка Гиса в момент
860 учащающей стимуляции предсердий при АВ узлом проведения 1:1. Функциональный
861 блок, возникающий дистальнее по отношению к пучку Гиса и связанный с внезапным
862 укорочением интервала сцепления (как при чередовании коротких и длинных циклов при
863 периодике Венкебаха или при начале стимуляции), не рассматривается как
864 положительный результат. Возникновение дистальной блокады пучка Гиса, вызванной

865 стимулирующей предсердий, имеет относительно низкую чувствительность,
866 но ее предсказательная ценность в отношении развития полной АВ-блокады высока.

867 *Внутрисердечное электрофизиологическое исследование пациентов с нарушениями*
868 *внутрижелудочкового проведения и необъяснимыми симптомами должно также*
869 *включать исследование ПЖУ и оценку функции СПУ, а также программированную*
870 *предсердную и желудочковую стимуляцию с целью индукции тахиаритмий для прогноза*
871 *развития как БА, так и жизнеугрожающих тахиаритмий.*

872 **3. Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии,**
873 **диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания**
874 **к применению методов лечения**

875 Лечение целесообразно разделить на коррекцию острых состояний, которые
876 могут быть обратимыми, и плановое лечение БА.

877 При острых состояниях это медикаментозная терапия и временная
878 кардиостимуляция сердца. При хронических брадикардиях и нарушениях
879 проводимости — постоянная кардиостимуляция сердца с помощью имплантируемых
880 электрокардиостимуляторов (ЭКС***).

881 В некоторых случаях синусовые БА обусловлены потенциально обратимыми
882 причинами, такими как острый инфаркт миокарда, предсердные тахиаритмии,
883 электролитные нарушения, гипотиреоз, лекарства, инфекции и метаболические
884 нарушения.

885 • Пациентам с симптомами ДСУ рекомендована оценка состояния и лечение
886 обратимых причин [124–131].

887 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

888 **Комментарии:** *Если пациенты стабильны и имеют минимальную симптоматику*
889 *ДСУ, требуется терапия, а также оценка ДСУ и потенциально обратимых причин,*
890 *то это может выполняться в амбулаторных условиях. В некоторых случаях при оценке*
891 *обратимых причин лечение может не потребоваться (например, прекращение приема*
892 *бета-блокатора у пациента без стенокардии с синусовой брадикардией после*
893 *перенесенного инфаркта миокарда). Примечательно, что у некоторых пациентов*
894 *с синдромом тахи-бради может быть улучшение синусно-предсердного проведения*
895 *после лечения, направленного на поддержание синусового ритма.*

896 **3.1. Медикаментозное лечение неотложных состояний**

897 Для острого лечения брадикардии может использоваться медикаментозная терапия,
898 которая временно может увеличить ЧСС и нивелировать острую ситуацию.

899 3.1.1. Острое медикаментозное лечение ДСУ

900 • Пациентам с ДСУ с наличием симптоматики или гемодинамически нестабильным
901 состоянием введение Атропина** рекомендовано для увеличения частоты синусового
902 ритма [132–146].

903 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

904 • Пациентам с ДСУ с наличием симптоматики или гемодинамическими
905 нарушениями при низкой вероятности ишемической болезни сердца #Допамин**
906 рекомендован как препарат для увеличения частоты сердечных сокращений и улучшения
907 симптоматики [127–134].

908 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 2)**

909 **Комментарии:** *Атропин** является парасимпатолитическим препаратом,*
910 *блокирующим мускариновые рецепторы ацетилхолина. В синусовом узле его действие*
911 *улучшает синусно-предсердную проводимость и увеличивает автоматизм синусового*
912 *узла в дозах примерно от 0,5 до 2 мг с периодом полураспада около 2 часов.*

913 3.1.2. Острое медикаментозное лечение ПЖБ

914 • Пациентам с ПЖБ II и III степени с наличием симптоматики или гемодинамически
915 значимым состоянием введение Атропина** рекомендовано для улучшения
916 атриовентрикулярной проводимости и увеличения ЧСС [137,430–432].

917 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

918 • Пациентам с ПЖБ II и III с наличием симптоматики или гемодинамически
919 значимым состоянием при низкой вероятности ишемической болезни сердца
920 #Допамин** рекомендован как препарат для улучшения атриовентрикулярной
921 проводимости, увеличения частоты сердечных сокращений и улучшения симптоматики
922 [127–134].

923 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 2)**

924 **Комментарии:** *Острое лечение брадикардии, связанной с ПЖБ, начинается*
925 *своевременно с выявления и устранения потенциальных причинных факторов, а также*
926 *медикаментозной терапии. Атропин** имеет длинную историю применения в этих*
927 *ситуациях из-за простоты введения и относительно низкого риска неблагоприятных*
928 *реакций. Он наиболее эффективен при ПЖБ на уровне ПЖУ и при брадикардиях,*
929 *обусловленных избыточным тонусом блуждающего нерва. Из-за его короткой*

930 *продолжительности действия он обычно используется как «мост» к более длительной*
931 *терапии, такой как введение бета-адренергического препарата или временная*
932 *стимуляция.*

933 Схемы введения препаратов — таблица 2.

934 **3.2. Временная стимуляция для лечения неотложных БА состояний**

935 Временная стимуляция используется для острого лечения брадикардий,
936 вызывающих гемодинамическую нестабильность, таких как длительные
937 и симптоматические паузы, опасные для жизни желудочковые аритмии, опосредованные
938 брадикардией, или тяжелых симптоматических брадикардий, обусловленных обратимой
939 причиной.

940 Временная стимуляция используется как промежуточный этап перед имплантацией
941 постоянного ЭКС*** или до разрешения острой ситуации. Временная стимуляция может
942 быть осуществлена чрескожно, через чреспищеводный доступ или путем введения
943 трансвенозного электрода для кардиостимуляции или катетера для стимуляции.
944 Экстренная временная стимуляция для лечения брадикардии, ассоциированной
945 с гемодинамической нестабильностью, обычно включает стимуляцию правого
946 желудочка из-за легкости трансвенозного доступа при брадикардиях, обусловленных
947 ДСУ или ПЖБ. В редких случаях используется временная стимуляция правого
948 предсердия (отдельно или в сочетании с желудочковой стимуляцией), когда критически
949 важно поддержание атриовентрикулярной синхронизации.

950 • Временная стимуляция рекомендована при гемодинамически значимой
951 брадиаритмии, рефрактерной к внутривенному введению ритм-учащающих
952 препаратов [153,489].

953 **ЕОК - I C (УУР А УДД 2)**

954 • Чрескожная стимуляция рекомендована при гемодинамически значимой
955 брадиаритмии, когда временная трансвенозная стимуляция сердца невозможна или
956 недоступна [164,490,491].

957 **ЕОК - IIa C (УУР А УДД 3)**

958 • Временная трансвенозная стимуляция рекомендована при обратимых причинах и
959 экстренных показаниях к стимуляции, а также при ишемии миокарда, миокардите,
960 электролитных нарушениях, интоксикации или после кардиохирургических
961 операций [147,151,166].

962 **ЕОК - IIa C (УУР А УДД 3)**

963 • Временная трансвенозная стимуляция рекомендована в качестве временной меры
964 перед имплантацией постоянного ЭКС, когда эта процедура недоступна или
965 невозможна из-за сопутствующей инфекции [147,151,166]

966 **ЕОК - Па С (УУР А УДД 3)**

967 • Для длительной временной трансвенозной стимуляции рекомендованы электроды с
968 активной фиксацией, подключенные к внешнему временному ЭКС
969 [183,492,493,494].

970 **ЕОК - Па С (УУР А УДД 3)**

971 **3.2.1. Временная стимуляция при ДСУ**

972 • Пациентам с персистирующей гемодинамически нестабильной ДСУ,
973 рефрактерной к медикаментозной терапии, установка временного однокамерного или
974 двухкамерного не частотноадаптивного ЭКС*** рекомендовано для увеличения частоты
975 сердечных сокращений и улучшения симптоматики, пока не будет установлен
976 постоянный ЭКС или устранена брадикардия [143–161].

977 **ЕОК — IC (УУР В, УДД 2)**

978 • Пациентам с ДСУ и выраженными симптомами или нестабильной гемодинамикой
979 установка временного однокамерного или двухкамерного не частотноадаптивного
980 ЭКС*** рекомендовано для увеличения частоты сердечных сокращений и улучшения
981 симптоматики до установки постоянного ЭКС*** или до разрешения брадикардии [143–
982 161].

983 **ЕОК — нет (УУР А, УДД 2)**

984 • Пациентам с ДСУ и минимальными и/или нечастыми симптомами без
985 гемодинамических расстройств установка временного однокамерного или
986 двухкамерного не частотноадаптивного ЭКС*** не рекомендовано [162–165].

987 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

988 **Комментарии:** *Использование временной трансвенозной стимуляции при*
989 *брадикардиях встречается редко, поскольку риск возникновения острого*
990 *неблагоприятного сердечно-сосудистого события, связанного с ДСУ или ПЖБ, низкий, а*
991 *временная стимуляция связана с осложнениями. Сообщается о частоте*
992 *нежелательных явлений, связанных с временным трансвенозным доступом от 14 до*
993 *40%. Осложнения включают венозный тромбоз (18–85% при установке через бедренный*
994 *доступ, когда бедренная вена используется в качестве доступа), легочная эмболия (50–*
995 *60% при бедренном доступе), опасные для жизни аритмии (обычно связанные с*

996 нестабильностью электрода или положением в правом желудочке), потеря захвата
997 (10–37%), перфорация и смерть.

998 *Риск осложнения может быть снижен при использовании специальных катетеров*
999 *с баллоном или использовании рентгеноскопии. Риск инфекционных осложнений при*
1000 *установке постоянного ЭКС*** увеличивается у пациентов, у которых есть временный*
1001 *кардиостимулятор до постоянной имплантации. Однако в ряде случаев временная*
1002 *стимуляция считается клинически необходимой.*

1003 **3.2.2. Временная стимуляция при ПЖБ**

1004 • Пациентам с симптоматичной ПЖБ II и III степени и гемодинамическими
1005 расстройствами и при рефрактерности к медикаментозной терапии рекомендована
1006 установка временного однокамерного или двухкамерного не частотноадаптивного
1007 ЭКС*** для увеличения частоты сердечных сокращений и улучшения симптоматики
1008 [166–183].

1009 **ЕОК — IC (УУР C, УДД 4)**

1010 • Пациентам с симптоматичной ПЖБ II и III степени и гемодинамическими
1011 расстройствами и при рефрактерности к медикаментозной терапии установка
1012 временного однокамерного или двухкамерного не частотноадаптивного ЭКС***
1013 рекомендована до установки постоянного ЭКС*** [183–192].

1014 **ЕОК — нет (УУР C, УДД 5)**

1015 **Комментарии:** *Причина ПЖБ должна учитываться при рассмотрении сроков и*
1016 *необходимости временной ЭКС. Чрескожная стимуляция, разработанная более 60 лет*
1017 *назад, играет определенную роль при остром лечении ПЖБ.*

1018 Алгоритм действий врача — таблица 3.

1019 **3.2.3. Временная стимуляция у пациентов с риском развития брадикардии во время** 1020 **внесердечных операций**

1021

1022 • У пациентов с высоким риском развития интраоперационной или
1023 перипроцедурной брадикардии из-за особенностей пациента или типа процедуры,
1024 рекомендована профилактическая чрескожная эндокардиальной кардиостимуляция [456-
1025 460]

1026 **ЕОК - нет (УУР А УДД 3)**

1027 • У пациентов с БЛНПГ, которым требуется катетеризация легочной артерии для
1028 интраоперационного мониторинга, рутинная профилактическая временная
1029 трансвенозная кардиостимуляция не рекомендована [456-460]

1030 **ЕОК - нет (УУР А УДД 3)**

1031 **3.3. Постоянная электрокардиостимуляция**

1032 Постоянная кардиостимуляция осуществляется путем имплантации постоянного
1033 водителя ритма — электрокардиостимулятора (ЭКС***) — одно-, двух- или
1034 трехкамерного. Доступы для имплантации могут быть эндокардиальные или
1035 эпикардиальные. В первом случае электроды кардиостимулирующей системы
1036 имплантируются в сердце трансвенозно, во втором имплантация осуществляется
1037 эпикардиально во время операции на открытом сердце или отдельным способом путем
1038 миниторакотомии.

1039 • Рекомендовано принимать решение об имплантации ЭКС*** или СРТ*** на
1040 основании имеющихся доказательств эффективности того или иного варианта
1041 лечения с учетом индивидуального соотношения риска и пользы, предпочтений
1042 пациента и целей лечения [495-500].

1043 **ЕОК — IC (УУР С, УДД 4)**

1044

1045 **3.3.1. Постоянная кардиостимуляция при ДСУ**

1046 Показано, что постоянная кардиостимуляция облегчает симптомы гипоперфузии
1047 головного мозга, связанные с брадикардией, когда исключены другие возможные
1048 излечимые или обратимые причины. Симптомная ДСУ является наиболее
1049 распространенным показанием для постоянной стимуляции, сопровождаемой
1050 атриовентрикулярной блокадой. Наилучший ответ на кардиостимуляцию
1051 демонстрируется, когда выявлена корреляция между симптомами и брадикардией.
1052 Преимущество стимуляции при ДСУ — значимое улучшение качества жизни.

1053 • Пациентам с симптомной брадикардией, обусловленной ДСУ, рекомендована
1054 имплантация постоянного ЭКС*** для увеличения ЧСС и улучшения симптоматики
1055 [193–197].

1056 **ЕОК — IB (УУР С, УДД 4)**

1057 • Пациентам с симптомной синусовой брадикардией, которые получают
1058 медикаментозную терапию, и продолжение лечения является клинически необходимым,
1059 постоянная стимуляция рекомендуется для увеличения частоты сердечных сокращений
1060 и улучшения симптоматики [193–197].

1061 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 5)**

1062 • Пациентам с синдромом тахи-брадикардии и симптомами, связанными
1063 с брадикардией, постоянная стимуляция рекомендована для увеличения частоты
1064 сердечных сокращений и уменьшения симптомов, связанных с гипоперфузией [434-443].

1065 **ЕОК — IV (УУР В, УДД 2)**

1066 • Пациентам с симптомной хронотропной недостаточностью постоянная
1067 стимуляция с программированием режимов частотной адаптации рекомендована для
1068 увеличения частоты сердечных сокращений и улучшения симптоматики [434-443].

1069 **ЕОК — ПА (УУР В, УДД 2)**

1070 • Пациентам с симптомной ДСУ и нормальной атриовентрикулярной
1071 проводимостью рекомендуется двухкамерная кардиостимуляция или однокамерная
1072 предсердная кардиостимуляция [434-443].

1073 **ЕОК — IV (УУР В, УДД 2)**

1074 • Пациентам с симптомной ДСУ и имплантированным двухкамерным ЭКС***
1075 и нормальной атриовентрикулярной проводимостью рекомендован двухкамерный режим
1076 с минимизацией желудочковой стимуляции [434-443,501-507].

1077 **ЕОК — IA (УУР В, УДД 2)**

1078 • Имплантация ЭКС*** рекомендована симптомным пациентам с
1079 брадитахиформой ДСУ для коррекции брадиаритмии и возможности назначения
1080 медикаментозной терапии, если абляция тахиаритмии не предпочтительна [436,437,508-
1081 511,513].

1082 **ЕОК — IV (УУР А, УДД 2)**

1083 • Пациентам симптомной хронотропной недостаточностью следует рассмотреть
1084 двухкамерную стимуляцию с частотно-адаптивным режимом [514-515]

1085 **ЕОК — Па В (УУР А, УДД 3)**

1086 • Рекомендована абляция ФП как стратегия лечения, чтобы избежать имплантации
1087 ЭКС***, у пациентов с ФП-ассоциированной брадикардией и симптомными
1088 преавтоматическими паузами, после конверсии ФП, с учетом клинической ситуации
1089 [510-518]

1090 **ЕОК - Па С (УУР А, УДД 3)**

1091 • У пациентов с бради-тахиформой ДСУ рекомендуется рассмотреть
1092 программирование антитахистимуляции [519-520].

1093 **ЕОК -Пь С (УУР А, УДД 3)**

1094 • У пациентов с обмороками рекомендуется рассмотреть ЭКС*** для уменьшения
1095 рецидивирующих обмороков если документирована бессимптомная пауза >6 сек на фоне
1096 синус-ареста [96, 521].

1097 **ЕОК -II С (УУР А, УДД 3)**

1098 • ЭКС*** рекомендуется рассмотреть у пациентов с ДСУ, когда симптомы с
1099 высокой долей вероятности связаны с брадиаритмией, а имеющиеся данные диагностики
1100 неубедительны.

1101 **ЕОК -II С (УУР А, УДД 3)**

1102 • ЭКС не рекомендована пациентам с брадикардией на фоне ДСУ, если она
1103 бессимптомна или обоснована наличием обратимых причин, которые
1104 могут быть скорректированы и предотвращены [353].

1105 **ЕОК -III С (УУР А, УДД 3)**

1106

1107 **Комментарии:** При ДСУ режимы предсердной кардиостимуляции дают
1108 преимущество перед желудочковой стимуляцией. Отмечено положительное влияние
1109 предсердных режимов стимуляции на профилактику ФП, сердечной недостаточности
1110 или инсульта, а также данные режимы способствуют улучшению качества жизни
1111 пациентов.

1112 **3.3.2. Постоянная кардиостимуляция при ПЖБ**

1113 • Пациентам с приобретенной ПЖБ II степени Мобитц II, ПЖБ высокой степени
1114 или ПЖБ III степени, не относящейся к обратимым или физиологическим причинам,
1115 постоянная стимуляция рекомендуется независимо от наличия симптомов [444-450].

1116 **ЕОК — IC (УУР В, УДД 3)**

1117 • Пациентам с нервно-мышечными заболеваниями, связанными с нарушениями
1118 проводимости, включая мышечную дистрофию (например, тип миотонической
1119 дистрофии), у которых есть признаки ПЖБ II и III степени или HV-интервал 70 мс или
1120 более, независимо от симптомов постоянная стимуляция рекомендуется [200–210].

1121 **ЕОК — IV (УУР В, УДД 3)**

1122 • Пациентам с постоянной ФП и симптомной брадикардией рекомендуется
1123 постоянная стимуляция [198–210].

1124 **ЕОК — IC (УУР С, УДД 4)**

1125 • Пациентам, у которых развивается симптоматическая ПЖБ в результате терапии
1126 и альтернативного лечения нет, а продолжение лечения клинически необходимо,

1127 постоянная стимуляция рекомендуется для увеличения частоты сердечных сокращений
1128 и улучшения симптоматики [200–210].

1129 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

1130 **Примечание:** *Все брадикардии, имеющие потенциально обратимые причины,*
1131 *в рекомендациях ЕОК относят к III классу — нет необходимости в постоянной ЭС.*

1132 • Пациентам с кардиомиопатиями (такими как саркоидоз или амилоидоз), ПЖБ
1133 II степени Мобитц II, ПЖБ высокой степени или ПЖБ III степени постоянная
1134 стимуляция рекомендуется [198–210].

1135 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

1136 • Пациентам с мышечными дистрофиями с интервалом PR, превышающим 240 мс,
1137 и БЛНПГ постоянная стимуляция рекомендована [200–210].

1138 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

1139 • Пациентам с ПЖБ I и II степени Мобитц I с четко выраженными симптомами,
1140 характерными для ПЖБ, постоянная стимуляция рекомендована [200–210].

1141 **ЕОК — ПА (УУР В, УДД 3)**

1142 • Пациентам с нервно-мышечными заболеваниями (такими как миотоническая
1143 дистрофия тип I), с интервалом PR более 240 мс, продолжительностью QRS больше
1144 200 мс или трифасцикулярным блоком постоянная стимуляция рекомендована [205–210].

1145 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

1146 **Комментарии:** *Наличие симптомов является важным фактором для определения*
1147 *необходимости постоянной стимуляции. Если пациент симптомный, независимо*
1148 *от уровня ПЖБ и вероятности будущей прогрессии ПЖБ, показана постоянная*
1149 *стимуляция. Однако, в отличие от ДСУ, инфранодальная ПЖБ, независимо от наличия*
1150 *или отсутствия симптомов, предполагает постоянную кардиостимуляцию, потому*
1151 *что симптомы могут начаться внезапно в результате полной ПЖБ и проявиться в виде*
1152 *обморока.*

1153 • Пациентам с ДСУ и ПЖБ, которым требуется постоянная стимуляция,
1154 рекомендуется двухкамерная стимуляция [198–225].

1155 **ЕОК — ПА (УУР А, УДД 2)**

1156 • Пациентам с синусовым ритмом и однокамерной желудочковой стимуляцией,
1157 у которых развивается синдром кардиостимулятора, переход на двухкамерную
1158 стимуляцию рекомендован [198–225].

1159 **ЕОК — IA (УУР А, УДД 2)**

1160 • Пациентам с ПЖБ, у которых есть показания к постоянной стимуляции с ФВ ЛЖ
1161 между 30 и 50% и ожидается желудочковая стимуляция более 40% времени,
1162 рекомендованы методы стимуляции, поддерживающие физиологическую активацию
1163 желудочков (например, бивентрикулярная стимуляция или стимуляция пучка Гиса),
1164 которые имеют преимущества перед обычной стимуляцией правого желудочка [444–
1165 454].

1166 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

1167 • Пациентам с постоянной или персистирующей ФП, у которых не запланирована
1168 стратегия контроля ритма, имплантация предсердного электрода не рекомендована [210–
1169 225].

1170 **ЕОК — IC (УУР В, УДД 2)**

1171 • Пациентам с постоянной ФП и потребностью в ЭКС*** рекомендована
1172 желудочковая стимуляция с функцией частотной адаптации [522-524].

1173 **ЕОК – IC (УУР В, УДД 2)**

1174 • Следует рассмотреть ЭКС*** у пациентов с симптомной ПЖБ II степени Мобитц
1175 I, или при обнаружении интра- или инфрагисальной ПЖБ по данным ЭФИ
1176 [200,525,526,444].

1177 **ЕОК - Па С (УУР В, УДД 2)**

1178 • Имплантация постоянного ЭКС*** рекомендована пациентам с сохраняющимися
1179 симптомами, характерными для пейсмекерного синдрома
1180 и связанными с ПЖБ первой степени (PR >0,3 сек). [527-529].

1181 **ЕОК -Па С (УУР В, УДД 2)**

1182 • ЭКС не показана пациентам с ПЖБ на фоне обратимых причин, которые могут
1183 быть скорректированы или устранены.

1184 **ЕОК -III С (УУР В, УДД 2)**

1185 **Комментарии:** *Очевидны преимущества двухкамерной стимуляции при ПЖБ*
1186 *по сравнению с желудочковой стимуляцией, но при двухкамерной стимуляции не было*
1187 *показано влияние на смертность от всех причин, а также на сердечно-сосудистую*
1188 *смертность. Не было показано по этическим соображениям — невозможности*
1189 *планирования проспективных исследований по данному вопросу.*

1190 *Однако, независимо от видов стимуляции, пациенты с ПЖБ требуют*
1191 *желудочковой стимуляции. Специализированные способы стимуляции, такие как*
1192 *бивентрикулярная стимуляция или стимуляция пучка Гиса, могут смягчить*
1193 *отрицательные воздействия правожелудочковой стимуляции у этих пациентов. При*

1194 *определении типа кардиостимулятора (однокамерный, двухкамерный,*
1195 *бивентрикулярный) у многих пациентов должны быть рассмотрены все факторы,*
1196 *в том числе прогнозируемый процент желудочковой стимуляции и ФВ ЛЖ.*
1197 *Благоприятной для пациентов, у которых ФВ ЛЖ $\leq 35\%$ с ожидаемой потребностью*
1198 *в значительной желудочковой стимуляции ($>40\%$), считается бивентрикулярная*
1199 *стимуляция.*

1200 **3.3.3. Кардиостимуляция при нарушениях проводимости (при атриовентрикулярной** 1201 **проводимости 1:1 и нормальном PR-интервале)**

1202 • Пациентам с обмороками и блокадами ножек пучка Гиса (БНПГ) с HV-
1203 интервалом 70 мс или более или доказанной при ЭФИ внутриузловой блокаде
1204 рекомендована постоянная стимуляция [226–230].

1205 **ЕОК — IV (УУР В, УДД 3)**

1206 • Пациентам с альтернирующей блокадой ножек пучка Гиса с симптоматикой или
1207 без нее рекомендуется постоянная стимуляция [226–236].

1208 **ЕОК — IC (УУР А, УДД 3)**

1209 • Бессимптомным пациентам с изолированным нарушением проводимости,
1210 атриовентрикулярной проводимостью 1:1 и отсутствием других показаний к стимуляции
1211 постоянная стимуляция не рекомендована [226–236].

1212 **ЕОК — IIIВ (УУР А, УДД 3)**

1213 • Рекомендуется рассмотреть возможность постоянной стимуляции пациентов с
1214 необъяснимыми обмороками и двухпучковой блокадой без данных ЭФИ (пожилые,
1215 ослабленные пациенты, высокого риска или с рецидивирующими обмороками) [530].

1216 **ЕОК — IV С (УУР С, УДД 5)**

1217

1218 **Комментарии:** Пациенты с нарушениями проводимости с атриовентрикулярной
1219 проводимостью 1:1 и нормальным интервалом PR требуют дополнительной
1220 диагностики основного заболевания сердца, оценки наличия симптоматики и анализа
1221 исходной ЭКГ (БПГ, неспецифической внутрижелудочковой задержки, изолированной
1222 фасцикулярной блокады или комбинации нарушений).

1223 Тактика лечения зависит от присутствия или отсутствия симптомов при
1224 наличии основного расстройства, связанного с прогрессированием заболевания
1225 (например мышечной дистрофии). Чередующаяся блокада ветвей (комплексы QRS
1226 с чередующимися морфологиями ЛНПГ и ПНПГ) свидетельствует о значимом

1227 *заболевании проводящей системы и высокой вероятности развития внезапного начала*
1228 *полной блокады сердца с редким или отсутствием желудочкового ответа.*

1229 3.3.4. Кардиоресинхронизирующая терапия

1230 Концепция СРТ основана на том, что у пациентов с СН и систолической
1231 дисфункцией ЛЖ нередко наблюдаются выраженные нарушения внутрижелудочковой
1232 проводимости с преобладанием продолжительности QRS >120 мс в 25-50% случаев и
1233 БЛНППГ в 15-27% случаев. Более того, у таких пациентов ПЖ-диссинхрония часто
1234 сочетается с удлинением интервала PR на поверхностной ЭКГ [531-533].
1235 Описанные электрические аномалии могут вызывать атриовентрикулярную,
1236 межжелудочковую и внутривежелудочковую механическую диссинхронию
1237 [534-535].

1238 В недавнем крупном метаанализе 5 РКИ (COMPANION, CARE-HF, MADIT-CRT,
1239 RAFT, и REVERSE), включившем 6523 участника (1755 пациентов с морфологией QRS,
1240 отличной от БЛНППГ) СРТ не была ассоциирована с уменьшением смертности и/или
1241 госпитализаций по поводу СН у пациентов без БЛНППГ (ОР, 0,99, 95% ДИ 0,82-1,2) [536].
1242 Поскольку почти во всех исследованиях и post-hoc анализах благоприятного влияния
1243 морфологии QRS на эффективность СРТ пациенты были объединены в категорию “без
1244 БЛНППГ”, невозможно предоставить отдельные рекомендации по СРТ у пациентов
1245 с диффузными нарушениями внутрижелудочковой проводимости и БЛНППГ [537-542].
1246 Пациенты с БЛНППГ не получают положительного эффекта от СРТ [543], если у них нет
1247 так называемой маскированной БЛНППГ на ЭКГ [542], характеризующейся широким,
1248 двухпиковым, иногда зазубренным зубцом R в I и aVL отведениях в сочетании с
1249 отклонением электрической оси влево. У этих пациентов решающим является
1250 индивидуальное позиционирование ЛЖ электрода.

1251 В последнее время появилось представление о возможной роли удлиненного
1252 интервала PR у пациентов с СН без БЛНППГ. Несколько одноцентровых исследований и
1253 два post-hoc анализа крупных РКИ (COMPANION и MADIT-CRT) продемонстрировали
1254 потенциальную пользу от имплантации СРТ у этой группы пациентов [543- 544].

1255 ЭКГ критерии нарушений внутрижелудочковой проводимости, морфологии QRS
1256 по типу БЛНППГ и без БЛНППГ ранее не были определены и представлены в исследованиях
1257 СРТ [543-544]. Также не сообщалось о способе измерения длительности QRS
1258 (автоматический или ручной, и аппарат для записи ЭКГ). Однако, выбор критериев ЭКГ
1259 вероятно влияет на твердые конечные точки [545-549]. Аналогичным образом было

1260 показано, что способ записи ЭКГ и производитель аппарата ЭКГ могут влиять на
1261 автоматически измеренную длительность QRS

1262

1263 **Рекомендации по СРТ у пациентов с синусовым ритмом с морфологией QRS по**
1264 **типу БЛНПГ**

1265

1266 • СРТ рекомендуется симптомным пациентам с СН на синусовом ритме с ФВ
1267 ЛЖ $\leq$ 35%, длительностью QRS $\geq$ 150 мс, и морфологией QRS с БЛНПГ несмотря на
1268 оптимальную медикаментозную терапию, для улучшения симптомов, снижения
1269 морбидности и смертности [550-567].

1270 **ЕОК - I A (УУР А, УДД 1)**

1271 • СРТ рекомендована у симптомных пациентов с СН на синусовом ритме с ФВ
1272 ЛЖ $\leq$ 35%, длительностью QRS 130-149 мс и морфологией QRS по типу БЛНПГ
1273 несмотря на оптимальную медикаментозную терапию, для улучшения симптомов,
1274 снижения морбидности и смертности [550-567]

1275 **ЕОК - Па В (УУР А, УДД 3)**

1276

1277 **Рекомендации по СРТ у пациентов с синосовым ритмом с морфологией QRS**
1278 **отличной от БЛНПГ**

1279

1280 • СРТ рекомендована симптомным пациентам с СН на синусовом ритме с ФВ
1281 ЛЖ $\leq$ 35%, длительностью QRS $\geq$ 150 мс и морфологией QRS, отличной от БЛНПГ
1282 несмотря на оптимальную медикаментозную терапию, для улучшения симптомов,
1283 снижения морбидности и смертности [550-567]

1284 **ЕОК - Па В (УУР А, УДД 3)**

1285 • Рекомендуется рассмотреть возможность СРТ у симптомных пациентов с СН на
1286 синусовом ритме с ФВ ЛЖ $\leq$ 35%, длительностью QRS 130-149 мс, морфологией QRS,
1287 отличной от БЛНПГ несмотря на оптимальную медикаментозную терапию, для
1288 улучшения симптомов и снижения морбидности [568-574]

1289 **ЕОК - Пь В (УУР С, УДД 3)**

1290 • СРТ не рекомендована пациентам с СН и длительностью QRS $<$ 130 мс без
1291 показаний к стимуляции ПЖ [563, 575].

1292 **ЕОК - III А (УУР А, УДД 2)**

1293

1294 **Рекомендации по СРТ у пациентов с персистирующей и постоянной ФП.**

1295

1296 **Пациенты с постоянной ФП и ХСН, которые являются кандидатами**
1297 **для СРТ:**

1298 • СРТ рекомендована пациентам с постоянной ФП, ХСН III и IV ФК и ФВ ЛЖ $\leq 35\%$
1299 на фоне оптимальной медикаментозной терапии и длительностью QRS ≥ 130 мс,
1300 обеспечивая эффективную бивентрикулярную стимуляцию для уменьшения
1301 симптоматики, снижения морбидности и риска смерти [576- 579].

1302 **ЕОК - Па С (УУР А, УДД 2)**

1303 • Аблацию АВС рекомендована при неполном достижении бивентрикулярной
1304 стимуляции на фоне ФП (<90-95%).

1305 **ЕОК - Па В (УУР А, УДД 2)**

1306

1307 **Пациенты с симптомной ФП и неконтролируемой ЧЖС, которые являются**
1308 **кандидатами для аблации АВС (независимо от длительности комплекса QRS):**

1309 • Пациентам с СНнФВ рекомендуется СРТ [580-583].

1310 **ЕОК - I В (УУР А, УДД 2)**

1311 • Пациентам с СНусФВ рекомендована СРТ вместо стимуляции ПЖ.

1312 **ЕОК - Па С (УУР А, УДД 3)**

1313 • Пациентам с СНсФВ рекомендована стимуляция ПЖ [217,582,585].

1314 **ЕОК - Па В (УУР А, УДД 3)**

1315 • Пациентам с СНусФВ рекомендовано рассмотреть возможность имплантации СРТ
1316 [584],

1317 **ЕОК - Пь С (УУР С, УДД 5)**

1318

1319 **Рекомендации по переходу от стимуляции ПЖ к СРТ**

1320 • Рекомендована замена имеющегося ЭКС*** или имплантированного
1321 кардиовертера-дефибриллятора на СРТ у пациентов с высоким процентом стимуляции
1322 ПЖ, ФВ ЛЖ $\leq 35\%$ и прогрессирующим течением СН несмотря на оптимальную
1323 медикаментозную терапию [586-600].

1324 **ЕОК - Па В (УУР А, УДД 3)**

1325 *Доля ПЖ-стимуляции в 20%, рассматриваемая как значение, способное вызвать ЭКС-*
1326 *индуцированную СН, подтверждено данными наблюдательных исследований. Однако нет*
1327 *данных в пользу того, что какой-либо процент стимуляции ПЖ может считаться*
1328 *определяющим пределом, ниже которого стимуляция ПЖ безопасна, а выше которого —*
1329 *вредна. Для пациентов с сохранной ФВ ЛЖ существуют противоречивые данные о пользе*
1330 *СРТ в отношении госпитализаций по поводу СН. Преимуществ СРТ в отношении*
1331 *смертности также не было выявлено [585,601-603]. Однако бивентрикулярная*

1332 стимуляция предотвращала неблагоприятное remodelирование, вызванное стимуляцией
1333 ПЖ, особенно в течение длительного периода наблюдения [585,601-604] В любом случае
1334 неблагоприятное remodelирование, вызванное стимуляцией ПЖ, может быть
1335 предотвращено бивентрикулярной стимуляцией, особенно в отдаленном периоде.
1336 Одноцентровое исследование показало, что стимуляция ПЖ >20% была ассоциирована с
1337 патологическим remodelированием ЛЖ у пациентов с АВБ и сохранной ФВ ЛЖ [605].

1338

1339 • СРТ, а не ПЖ стимуляция рекомендуется пациентам с СНФВ (<40%), независимо
1340 от ФК NYHA, при наличии показаний к желудочковой стимуляции и ПЖБ высокой
1341 градации для снижения морбидности, включая и пациентов с ФП.

1342 **ЕОК - I A (УУР А, УДД 1)**

1343

1344 3.3.5. Стимуляция проводящей системы.

1345 Альтернативные зоны стимуляции ПЖ (противопоставляемые верхушечной
1346 стимуляции ПЖ), включают выходной тракт ПЖ, средние и базальные отделы
1347 межжелудочковой перегородки (МЖП), СПГ, парагиссиальную стимуляцию и стимуляцию
1348 области ЛНПГ, которая включает в себя стимуляцию МЖП ЛЖ и стимуляцию ЛНПГ.

1349 • Пациентам с ЭКС*** и СПГ программирование устройства рекомендовано
1350 выполнять в соответствии со специальными требованиями СПГ [606-607].

1351 **ЕОК - IC (УУР А, УДД 3)**

1352 • Рекомендована СПГ для кандидатов на СРТ, у которых ранее были
1353 безуспешные попытки имплантации ЛЖ электрода в вену коронарного синуса, наряду с
1354 другими вариантами лечения, такими как хирургическая имплантация эпикардиального
1355 электрода [608-612].

1356 **ЕОК -Ia B (УУР А, УДД 3)**

1357 • Рекомендована имплантация страховочного (back-up) правожелудочкового
1358 электрода пациентам с СПГ в следующих ситуациях (зависимость от ЭКС, ПЖБ высокой
1359 степени, инфранодальная ПЖБ высокий порог стимуляции, планируемая ПЖБ) или для
1360 улучшения детекции (например, риск недостаточной желудочковой чувствительности
1361 или чрезмерной чувствительности предсердных событий и потенциала пучка Гиса)
1362 [609,613,614]

1363 **ЕОК -Ia C (УУР А, УДД 3)**

1364 • Рекомендовано рассмотреть возможность СПГ с имплантацией
1365 страховочного желудочкового электрода у пациентов, которым показана стратегия

1366 “кардиостимуляция и абляция” для лечения тахисистолической наджелудочковой
1367 аритмии, особенно при узком собственном комплексе QRS. [615- 618].

1368 **ЕОК -Пь С (УУР С, УДД 5)**

1369 • Рекомендовано рассмотреть возможность СПГ как альтернативу стимуляции
1370 ПЖ у пациентов с ПЖБ и ФВ ЛЖ >40% у которых ожидается более 20% желудочковой
1371 стимуляции [619-620]

1372 **ЕОК -Пь С (УУР С, УДД 5)**

1373

1374 **3.4. Показания к кардиостимуляции при отдельных видах патологических**
1375 **состояний**

1376 **3.4.1. Кардиостимуляция у пациентов после некоторых операций на сердце**

1377 Риски брадиаритмий после операций на сердце в значительной степени связаны
1378 с типом кардиохирургического вмешательства. Можно выделить специфические
1379 операции и состояния сердца: шунтирование коронарных артерий, открытые операции
1380 на клапанах сердца, включая вмешательства на аортальном, трехстворчатом
1381 и митральном клапанах, транскатетерную имплантацию аортального клапана; операции
1382 при врожденных пороках; трансплантацию сердца и послеоперационные осложнения
1383 после лечения ФП.

1384 Восстановление атриовентрикулярной проводимости после операции происходит
1385 примерно от 12 до 13% у пациентов в течение 6 месяцев и зависит от операции,
1386 предоперационных нарушений проводимости, наличия эндокардита и течения
1387 послеоперационного периода, а именно наблюдаются ли преходящие
1388 послеоперационные нарушения атриовентрикулярной проводимости.

1389 • Пациентам с послеоперационной симптомной ДСУ или ПЖБ или
1390 гемодинамической нестабильностью, которая не разрешается после
1391 кардиохирургической операции, постоянная стимуляция рекомендована [237-253, 260–
1392 268, 269–278].

1393 **ЕОК — IC (УУР В, УДД 2)**

1394 • Рекомендован период клинического наблюдения не менее 5 дней у пациентов с
1395 далеко зашедшей или полной ПЖБ после кардиохирургических операций для
1396 исключения возможных транзиторных нарушений ритма сердца. [621, 623].

1397 **ЕОК —I С (УУР В, УДД 2)**

1398

1399 **Хирургическое лечение клапанного эндокардита и интраоперационная полная**
1400 **ПЖБ**

1401 •Рекомендована имплантация постоянного эпикардального ЭКС*** у пациентов с
1402 полной ПЖБ после кардиохирургических операций по поводу клапанного эндокардита
1403 при наличии одного из следующих факторов: существующие ранее нарушения
1404 проводимости, инфекция золотистого стафилококка, внутрисердечный абсцесс,
1405 поражение ТК или перенесенная операция на клапанах сердца [622].

1406 **ЕОК — Па С (УУР А, УДД 3)**

1407 •Пациентам, перенесшим кардиохирургическую операцию на открытом сердце,
1408 установка временной эпикардальной стимуляции рекомендована [237–271, 275–278].

1409 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 2)**

1410 •Пациентам, перенесшим кардиохирургическую операцию на открытом сердце,
1411 которым требуются бивентрикулярная или желудочковая стимуляция,
1412 интраоперационная имплантация постоянных эпикардальных электродов на левый
1413 желудочек рекомендована [250–259, 265–268, 270–274].

1414 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 5)**

1415

1416 *Частота возникновения нарушений проводимости после изолированного*
1417 *коронарного шунтирования варьируется от 2 до 58%, и это осложнение связано с*
1418 *такими факторами, как хроническое дегенеративное заболевание сердца, прямое*
1419 *хирургическое повреждение проводящей системы, ишемия миокарда или недостаточная*
1420 *защита миокарда. Достижения в современной хирургической практике способствуют*
1421 *снижению частоты возникновения нарушений проводимости, но не могут полностью*
1422 *устранить их.*

1423 *Успешная хирургическая коррекция ФП связана с улучшением выживаемости*
1424 *пациентов по сравнению с пациентами с рецидивирующей ФП, при этом 65% пациентов*
1425 *при протезировании митрального клапана одновременно подвергаются и операции по*
1426 *коррекции ФП. В одноцентровом исследовании было показано, что 11% пациентов,*
1427 *которым выполнена операция «Лабиринт» (CoxMaze IV) в дополнение к коррекции*
1428 *митрального клапана, требуется послеоперационная имплантация ЭКС [278–279].*

1429 *Наиболее распространенными причинами нарушения проводимости после*
1430 *хирургической замены аортального клапана являются отек, травма при манипуляциях с*
1431 *удалением кальция или повреждение из-за глубоко наложенных швов. Необходимость*
1432 *кардиостимуляции после замены аортального клапана является распространенной и*

1433 варьируется от 3 до 8,5%: наибольший риск вероятен у пациентов с дооперационным
1434 нарушением проводимости. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что у
1435 большинства пациентов не восстанавливается атриовентрикулярная проводимость.
1436 Одно исследование показало, что пациенты, у которых была потребность в
1437 имплантации кардиостимулятора в течение 30 дней после замены клапана аорты,
1438 имели более высокий риск смерти.

1439 Возникновение ПЖБ отмечается у 23,5% пациентов, перенесших замену
1440 митрального клапана или пластические операции. В исследовании 55 сердец
1441 от пациентов без операции на сердце оценивалась связь между предсердно-
1442 желудочковым узлом, атриовентрикулярной узловой артерией и митральным кольцом.
1443 В 23% случаев отмечалось, что атриовентрикулярная узловая артерия проходила
1444 близко к митральному клапану, таким образом было предположено, что повреждение
1445 артерии может играть роль в развитии ПЖБ после операции на митральном клапане.
1446 Необходимость в ЭКС*** после митральной коррекции колеблется от 1 до 9%. Это
1447 зависит от типа операции и может быть ниже после реконструктивных операций, при
1448 которых неполная аннулопластика может быть ассоциирована с более низким риском
1449 повреждения атриовентрикулярной узловой артерии.

1450 **3.4.2. Рекомендации по проведению кардиостимуляции у пациентов после** 1451 **хирургических вмешательств на трикуспидальном клапане:**

1452 • Рекомендовано имплантировать эпикардиальные стимулирующие электроды
1453 и избегать имплантации эндокардиальных электродов через ТК. Во время оперативного
1454 вмешательства на ТК следует отдавать предпочтение удалению ранее
1455 имплантированного правожелудочкового электрода, а не подшиванию его между
1456 фиброзным кольцом клапана и биопротезом клапана или между фиброзным кольцом и
1457 опорным кольцом. В случае изолированной аннулопластики ТК, оценивая
1458 индивидуально риск и пользу, ранее имплантированный правожелудочковый электрод
1459 можно оставить на месте и не закреплять его между фиброзным и опорным кольцом.

1460 **ЕОК —Па С (УУР А, УДД 3)**

1461 **Пациенты, требующие ЭКС после протезирования ТК биопротезом/пластики** 1462 **кольца ТК**

1463 • При наличии показаний для желудочковой стимуляции рекомендовано отдавать
1464 предпочтение трансвенозной имплантации электрода в коронарный синус или
1465 малоинвазивной имплантации эпикардиального желудочкового электрода, вместо

1466 выполнения трансвенозной трансклапанной имплантации правожелудочкового
1467 электрода [624].

1468 **ЕОК —Па С (УУР А, УДД 3)**

1469 **Пациенты, требующие ЭКС после протезирования ТК механическим протезом**

1470 • Имплантация правожелудочкового электрода через механический протез ТК не
1471 рекомендована

1472 **ЕОК —Ш С (УУР А, УДД 2)**

1473 **Комментарии:** *атриовентрикулярный узел тесно связан с трехстворчатым*
1474 *клапаном и расположен между его передней и септальными створками; это делает*
1475 *предсердно-желудочковый узел особенно восприимчивым к повреждению при любых*
1476 *вмешательствах на трикуспидальном клапане. Хирургами разработаны многочисленные*
1477 *методы реконструкции, чтобы избежать травмы узла, в том числе несколько*
1478 *вариантов неполных трикуспидальных опорных колец, которые имеют промежутки*
1479 *между передней и перегородочной створками. Эти методы позволяют избежать*
1480 *наложения шва в области атриовентрикулярного узла и, следовательно, его*
1481 *повреждения.*

1482 *Сообщалось, что потребность в кардиостимуляторе после реконструкции*
1483 *составляет всего лишь 2,3%. Поскольку изолированная трикуспидальная хирургия редко*
1484 *проводится у взрослого населения, точную частоту нарушений проводимости,*
1485 *связанной с изолированным трикуспидальным вмешательством, трудно установить.*
1486 *В нескольких исследованиях сообщалось о гораздо более высокой частоте нарушений*
1487 *АВ-проведения — до 22%. Лечение нарушений проводимости в группе пациентов*
1488 *с механическим трикуспидальным клапаном дополнительно осложняется*
1489 *невозможностью использования трансвенозных электродов для кардиостимуляции,*
1490 *в случае наличия биопротеза клапана — нарушением его закрытия после имплантации*
1491 *электрода в правый желудочек. Даже собственные клапаны почти в четверти случаев*
1492 *имеют значимую трикуспидальную регургитацию после установки электрода.*
1493 *У пациентов, которым имплантирован ЭКС*** после реконструкции ТК, частота*
1494 *появления разной степени регургитации составляет до 42%.*

1495 **3.4.3. Рекомендации по проведению кардиостимуляции у пациентов после**
1496 **транскатетерной имплантации аортального клапана:**

1497 Частота имплантации постоянного ЭКС*** после ТКИАК колеблется от 3,4% до
1498 25,9% в РКИ и крупных регистрах [625-637]. В то время, как ассоциация
1499 между ЭКС после ТКИАК и исходом является спорной [638-643], считается, что

- 1500 стимуляция ПЖ может приводить к ухудшению функции ЛЖ [216, 644, 645].
- 1501 Таким образом, необходимо минимизировать ненужную постоянную стимуляцию ПЖ.
- 1502
- 1503 **Предикторы постоянной стимуляции после ТКИАК [455]**
- 1504 ЭКГ
- 1505 - БПНПГ
- 1506 - Удлинение интервала PR БПВРЛНПГ
- 1507 - Пациент
- 1508 - Пожилой возраст (риск увеличивается с каждым годом)
- 1509 - Мужской пол
- 1510 - Большой индекс массы тела (риск увеличивается с каждой единицей веса)
- 1511
- 1512 Анатомические особенности
- 1513 - Выраженная кальцификация кольца митрального клапана
- 1514 - Кальцификация выходного тракта левого желудочка
- 1515 - Длина мембранозной части межжелудочковой перегородки
- 1516 - “Фарфоровая аорта”
- 1517 - Высокий средний градиент на аортальном клапане
- 1518
- 1519 Процедурные особенности
- 1520 - Саморасширяющийся клапан
- 1521 - Более глубокая имплантация клапана
- 1522 - Большее соотношение между диаметром протеза и диаметром фиброзного кольца или
- 1523 выходного тракта ЛЖ
- 1524 - Баллонная пост-дилатация
- 1525 - ТКИАК в нативный клапан против имплантации “клапана в клапан”
- 1526
- 1527 • Постоянная стимуляция рекомендуется пациентам с далеко зашедшей или полной
- 1528 ПЖБ, персистирующей >24-48 ч после ТКИАК [279–296, 647].
- 1529 **ЕОК —I В УУР А, УДД 2)**
- 1530 • Постоянная стимуляция рекомендуется пациентам с впервые возникшей
- 1531 альтернирующей БНПГ после ТКИАК [279–296, 646]
- 1532 **ЕОК —I С (УУР В, УДД 3)**

1533 • Рекомендована ранняя постоянная стимуляция у пациентов с ранее
1534 существующей ПБЛНПГ, у которых прогрессируют или возникают новые
1535 нарушения проводимости после ТКИАК.

1536 **ЕОК —Па В (УУР А, УДД 3)**

1537 • Рекомендовано амбулаторное мониторирование ЭКГ или ЭФИ для пациентов с
1538 впервые возникшей ПБЛНПГ с QRS >150 мс или PR >240 мс без дальнейшего
1539 прогрессирования через >48 ч после ТКИАК [648-650].

1540 **ЕОК —Па С (УУР А, УДД 3)**

1541 • Рекомендовано рассмотреть возможность амбулаторного мониторирования ЭКГ
1542 или ЭФИ для пациентов с ранее существующими нарушениями проводимости с
1543 дальнейшим увеличением длительности QRS или PR >20 мс после ТКИАК.

1544 **ЕОК —Пь С (УУР С, УДД 5)**

1545 • Пациентам с ПБЛНПГ, не имеющих показаний для ПЭКС, не рекомендуется
1546 профилактическая имплантация постоянного ЭКС*** перед процедурой ТКИАК.

1547 **ЕОК —Ш С (УУР А, УДД 2)**

1548 **Комментарии:** После транскатетерной имплантации аортального клапана
1549 БЛНПГ встречается у 19–55% пациентов (и ПЖБ высокой степени примерно у 10%
1550 пациентов. В половине случаев нарушения проводимости разрешаются. Кроме того,
1551 только у половины пациентов в последующем могут возникнуть нарушения
1552 проводимости, что потребует постоянной ЭКС***. Вероятность новых нарушений
1553 проводимости зависит от клинических особенностей пациента и перипроцедурных
1554 факторов. После имплантации аортального клапана новые нарушения проводимости
1555 связаны с повышенным риском имплантации ЭКС*** и повышенным риском поздней
1556 смертности от всех причин и сердечной смертности, независимо от того, был ли
1557 имплантирован новый ЭКС***.

1558 **3.4.4. Рекомендации по проведению кардиостимуляции после трансплантации**
1559 **сердца.**

1560 • При ДСУ после кардиохирургических операций и трансплантации сердца
1561 рекомендовано устанавливать срок наблюдения до 6 нед перед имплантацией
1562 постоянного ЭКС [651].

1563 **ЕОК —Па С (УУР А, УДД 3)**

1564 • Рекомендовано имплантация ЭКС*** при хронотропной недостаточности после
1565 трансплантации сердца, сохраняющейся более 6 нед. после трансплантации
1566 сердца для улучшения качества жизни [652].

1567 **ЕОК — Па С (УУР А, УДД 3)**

1568 **3.4.5 . Кардиостимуляция у пациентов с врожденными пороками сердца**

1569

1570 Постоянная стимуляция у пациентов со сложными и умеренно сложными пороками
1571 сердца должна выполняться в специализированных центрах с многопрофильной командой
1572 специалистов по лечению ВПС и ЭКС. Как правило, принятие решения об имплантации
1573 постоянного И-ЭКС у пациентов с ВПС основывается на экспертном консенсусе
1574 и индивидуальной оценке из-за отсутствия доказательной базы в РКИ. При наличии
1575 внутрисердечного шунта между системным и малым кругами кровообращения
1576 эндокардиальная имплантация электродов относительно противопоказана из-за риска
1577 артериальной эмболии [314].

1578 • Взрослым пациентам с ВПС и симптомной ДСУ или хронотропной
1579 недостаточностью постоянная стимуляция рекомендована [297–314].

1580 **ЕОК — ПВ (УУР А, УДД 3)**

1581 • Взрослым пациентам с ВПС и симптомной ПЖБ рекомендована постоянная
1582 стимуляция [297–314].

1583 **ЕОК — IC (УУР А, УДД 3)**

1584 • Взрослым пациентам с ВПС и врожденной ПЖБ любой степени и симптомной
1585 брадикардией, широким QRS, средней ЧСС в дневное время ниже 50 имп/мин,
1586 желудочковой эктопией или дисфункцией желудочков, Паузы, превышающие в три раза
1587 длину цикла выскальзывающего желудочкового ритма, Длинный QT интервал
1588 постоянная стимуляция рекомендована [297–314].

1589 **ЕОК — IC (УУР А, УДД 3)**

1590 • Взрослым пациентам с ВПС и послеоперационной ПЖБ II степени Мобитц II,
1591 ПЖБ высокой степени или ПЖБ III степени, которая не разрешается спонтанно,
1592 рекомендована постоянная стимуляция [297–314].

1593 **ЕОК — нет (УУР А, УДД 3)**

1594 • Бессимптомным взрослым пациентам с ВПС и врожденной полной ПЖБ даже
1595 при отсутствии факторов риска постоянная стимуляция рекомендована [305–314].

1596 **ЕОК — Пб (УУР В, УДД 3)**

1597 • Взрослым пациентам с ВПС с ранее существовавшей ДСУ и/или ПЖБ во время
1598 операции на сердце интраоперационная имплантация эпикардиальных электродов для
1599 постоянной стимуляции рекомендована [305–314].

1600 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

1601 • Взрослым пациентам с ВПС и системными внутрисердечными шунтами
1602 установка эндокардиальных электродов не рекомендована [297–314].

1603 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

1604 • У пациентов со стойкой послеоперационной бифасцикулярной блокадой в
1605 сочетании с транзиторной полной ПЖБ рекомендовано рассмотреть возможность
1606 постоянного ЭКС*** [653].

1607 **ЕОК — Пь С (УУР С, УДД 5)**

1608 • У пациентов со сложными ВПС и бессимптомной брадикардией (ЧСС в
1609 состоянии покоя <40 уд./мин или паузы >3 с) рекомендовано рассмотреть возможность
1610 постоянного ЭКС*** в индивидуальном порядке.

1611 **ЕОК — Пь С (УУР С, УДД 5)**

1612 **Комментарии:** *Взрослые пациенты с ВПС представляют собой разнообразную*
1613 *группу пациентов с различной анатомией проводящей системы, венозным возвратом*
1614 *к сердцу и прогрессирующим нарушениям проводимости. Многие ВПС имеют свои*
1615 *специфические особенности, связанные с гипертрофией, дилатацией или*
1616 *ремоделированием предсердий. Перед установкой эндокардиальных электродов следует*
1617 *учитывать все факторы. Специализированную помощь таким пациентам следует*
1618 *оказывать в специализированных центрах с опытом ведения пациентов такого типа.*

1619 **3.4.6. Кардиостимуляция у пациентов с инфарктом миокарда**

1620 • Пациентам с острым ИМ рекомендована временная стимуляция при
1621 рефрактерной к медицинской терапии симптоматичной или гемодинамически значимой
1622 брадикардии, связанной с ДСУ или ПЖБ [315–336].

1623 **ЕОК — IC (УУР В, УДД 2)**

1624 • Пациентам с острым ИМ и ПЖБ II степени Мобитц II, ПЖБ высокой степени,
1625 с блокадами ветвей пучка Гиса или АВБ III степени постоянная стимуляция
1626 рекомендована [315–336].

1627 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 2)**

1628 • Пациентам с острым ИМ с симптомной или гемодинамически значимой
1629 синусовой брадикардией или ПЖБ рекомендовано введение Атропина** [325].

1630 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

1631 • Пациентам с острым ИМ и преходящей ПЖБ, которая спонтанно разрешается,
1632 постоянная стимуляция не рекомендована [315–336].

1633 **ЕОК — нет (УУР А, УДД 3)**

1634 • Пациентам с острым ИМ и БНПГ или изолированной фасцикулярной блокадой
1635 при отсутствии ПЖБ II и III степени постоянная стимуляция не рекомендована [315–
1636 336].

1637 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 2)**

1638 • Рекомендована имплантации постоянного ЭКС*** в соответствии с
1639 рекомендациями для населения в целом, когда ПЖБ не разрешается в течение периода
1640 ожидания продолжительностью не менее 5 дней после ИМ.

1641 **ЕОК — I C (УУР А, УДД 3)**

1642 • У некоторых пациентов с ПЖБ и острой СН, возникших на фоне ИМ передней
1643 стенки, рекомендовано рассмотреть возможность ранней имплантации СРТ (СРТ-Р/СРТ-
1644 Д) [654].

1645 **ЕОК — II C (УУР С, УДД 5)**

1646 • ЭКС*** не рекомендуется, если ПЖБ разрешается после реваскуляризации или
1647 спонтанно [319,323, 326, 655].

1648 **ЕОК — III C (УУР С, УДД 5)**

1649 **Комментарии:** *Хотя преходящая ДСУ может возникнуть в контексте острого*
1650 *ИМ, необратимое повреждение ПЖУ составляет большинство показаний для*
1651 *стимуляции. Например, ДСУ и ПЖБ при поражении нижней стенки при ИМ может*
1652 *влиять на кратковременное повышение тонуса блуждающего нерва или снижение*
1653 *кровообращения ПЖУ — или, реже, СПУ. Необходимость временной стимуляции сама*
1654 *по себе не является показанием для постоянной кардиостимуляции. Долгосрочный*
1655 *прогноз для пациентов после ИМ и ПЖБ в первую очередь зависит от степени*
1656 *повреждения миокарда и характера нарушений внутрижелудочковой проводимости,*
1657 *а не от самой атриовентрикулярной блокады. Независимо от того, является ли*
1658 *инфаркт передним или нижним, развитие нарушений внутрижелудочковой*
1659 *проводимости скорее отражает обширное повреждение миокарда.*

1660 **3.4.7. Кардиостимуляция у пациентов с синкопальными состояниями**

1661 • Пациентам в возрасте >40 лет со спонтанными симптомными
1662 верифицированными асистолиями >3 секунд или бессимптомными паузами >6 секунд
1663 вследствие синус-ареста, ПЖБ или их сочетания рекомендована имплантация ЭКС***
1664 с целью снижения частоты рецидивов синкопе [337–352].

1665 **ЕОК — I A (УУР В, УДД 2)**

1666 • Пациентам в возрасте >40 лет с рецидивирующими непредсказуемыми синкопе
1667 при кардиоингибиторном синдроме каротидного синуса рекомендована имплантация
1668 ЭКС*** с целью снижения частоты рецидивов синкопе [337–352].

1669 **ЕОК — I A (УУР А, УДД 2)**

1670 • Пациентам в возрасте >40 лет с рецидивирующими непредсказуемыми синкопе
1671 при выявлении асистолии во время тилт-теста рекомендована имплантация ЭКС***
1672 с целью снижения частоты рецидивов синкопе [348–352].

1673 **ЕОК — I A (УУР В, УДД 2)**

1674 • Пациентам с клиническими признаками аденозинчувствительного синкопе
1675 рекомендована имплантация двухкамерного ЭКС*** с целью снижения частоты
1676 рецидивов синкопе [348–352].

1677 **ЕОК — IIb (УУР В, УДД 2)**

1678 • Пациентам при отсутствии верифицированного кардиоингибиторного
1679 рефлекторного ответа имплантация ЭКС*** не рекомендована [337–353].

1680 **ЕОК — IIIb (УУР А, УДД 2)**

1681 • ЭКС*** не рекомендована пациентам с необъяснимыми обмороками без
1682 подтвержденных ДСУ и нарушения проводимости [656,657]

1683 **ЕОК — IIIc (УУР А, УДД 3)**

1684 **Комментарии:** Решение об имплантации ЭКС*** должно приниматься с учетом
1685 клинического контекста доброкачественности состояния и частого возникновения
1686 у молодых пациентов. Таким образом, имплантация ЭКС*** показана ограниченному
1687 числу пациентов, отобранных согласно жестким критериям, с выраженными
1688 рефлекторными синкопе. Для имплантации ЭКС*** следует рассматривать пациентов
1689 старшего возраста с анамнезом начала рецидивирующих синкопе в среднем и старшем
1690 возрасте и с частыми травмами, вероятно, вследствие отсутствия предвестников.
1691 У небольшого числа пациентов рецидивы синкопе возможны, несмотря
1692 на электрокардиостимуляцию.

1693 Ответ при проведении тилт-теста является самым сильным предиктором
1694 эффективности электрокардиостимуляции. У пациентов с отрицательным ответом
1695 на тилт-тест ожидается низкий риск рецидивов синкопе, сопоставимый с таковым
1696 у пациентов с имплантированными ЭКС*** в связи с идиопатической ПЖБ. Дальнейшие
1697 исследования с низкой вероятностью могут повлиять на изменение данной оценки
1698 эффекта. Напротив, у пациентов с положительным ответом на тилт-тест

1699 *отмечается более высокий риск развития рецидивов синкопе с большим доверительным*
1700 *интервалом, что затрудняет оценку пользы электрокардиостимуляции. (Табл.4)*

1701 3.4.8. Кардиоостимуляция у пациентов с ГКМП

1702 У пациентов с симптомами, вызванными обструкцией выходного тракта ЛЖ, варианты
1703 лечения включают медикаментозную терапию, хирургическое вмешательство, спиртовую
1704 аблацию МЖП и последовательную АВ-стимуляцию с короткой АВ-задержкой. В трех
1705 небольших плацебо-контролируемых РКИ и нескольких наблюдательных исследованиях с
1706 длительным сроком наблюдения сообщалось о снижении градиента в выходном тракте
1707 ЛЖ, улучшении симптомов и качества жизни при последовательной атриовентрикулярной
1708 ЭКС [658-663]. Миоэктомия показала лучшие гемодинамические результаты по
1709 сравнению с последовательной двухкамерной стимуляцией [664], но это вмешательство
1710 является более инвазивным и рискованным. Анализ подгрупп в одном исследовании
1711 показал, что пациенты более старшего возраста (>65 лет) с большей вероятностью получают
1712 пользу от последовательной двухкамерной ЭКС [660]. Недавний метаанализ, включавший
1713 34 исследования и 1135 пациентов, показал, что ЭКС приводила к уменьшению градиента
1714 в выходном тракте ЛЖ на 35% и незначительной тенденции уменьшения ФК ХСН
1715 (НУНА) [665]. Следует принимать совместное решение при выборе метода лечения для
1716 пациентов с бструктивной ГКМП

1717 • Рекомендовано рассмотреть возможность последовательной АВ-стимуляции с
1718 короткой АВ-задержкой у пациентов с синусовым ритмом, у которых есть другие
1719 показания для стимуляции или ИКД, если симптомы сохраняются на фоне
1720 лекарственной терапии или максимальный градиент в выводном отделе левого
1721 желудочка в покое или при провокационных пробах ≥ 50 мм рт.ст. [658-662,665,666].

1722 **ЕОК —Пь В (УУР С, УДД 3)**

1723 • Рекомендовано рассмотреть возможность последовательной АВ-стимуляции с
1724 короткой АВ-задержкой у отдельных пациентов с синусовым ритмом, у которых
1725 симптомы сохраняются на фоне лекарственной терапии, или максимальный градиент
1726 в выводном отделе левого желудочка в покое или при провокационных пробах ≥ 50 мм
1727 рт.ст., и у которых существует высокий риск развития ПЖБ во время септальной
1728 спиртовой аблации [667, 668].

1729 **ЕОК —Пь С (УУР С, УДД 5)**

1730

1731 3.4.9. Кардиоостимуляция при редких заболеваниях

1732 • У пациентов с нейромышечными заболеваниями, такими как миотоническая дистрофия
1733 1 типа в сочетании с любой второй или третьей степени ПЖБ или интервалом HV ≥ 70 мс
1734 рекомендована постоянная ЭКС*** вне зависимости от наличия или отсутствия
1735 симптомов [207-208, 451, 669].

1736 **ЕОК —I C (УУР А, УДД 3)**

1737 • У пациентов с нейромышечными заболеваниями, такими как миотоническая дистрофия
1738 1 типа в сочетании с увеличением интервала PR ≥ 240 мс или увеличением
1739 продолжительности QRS ≥ 120 мс может рекомендовано рассмотреть возможность
1740 имплантации постоянного ЭКС*** [208, 204, 205].

1741 **ЕОК —Ib C (УУР C, УДД 5)**

1742 • У пациентов с саркоидозом сердца, стойкой или транзиторной ПЖБ, рекомендовано
1743 рассмотреть возможность имплантации ЭКС*** [220, 629, 673].

1744 **ЕОК —IIa C (УУР А, УДД 3)**

1745 • У пациентов с саркоидозом сердца, ФВ ЛЖ $< 50\%$ и показаниями к постоянной ЭКС***
1746 рекомендована имплантация устройства СРТ [671,672].

1747 **ЕОК —IIa C (УУР А, УДД 3)**

1748

1749 3.5. Имплантация ЭКС и периоперационное ведение пациента.

1750 • Для уменьшения риска инфекционных осложнений рекомендуется проведение
1751 предоперационной антибиотикопрофилактики не ранее, чем за 1 ч до разреза кожи.

1752 **ЕОК —I A (УУР А, УДД 1)**

1753 • Для дезинфекции кожи рекомендовано использовать спиртовой раствор
1754 хлоргексидина, а не спиртовой раствор повидон-йода [674, 675].

1755 **ЕОК —IIa B (УУР А, УДД 3)**

1756 • При венозном доступе рекомендовано рассматривать головную или подмышечную
1757 вену [676,677].

1758 **ЕОК —IIa B (УУР А, УДД 3)**

1759 • Для подтверждения целевой позиции желудочкового электрода следует
1760 использовать рентгеновские изображения в нескольких проекциях.

1761 **ЕОК —IIa C (УУР А, УДД 3)**

1762 • При имплантации электродов в коронарный синус рекомендовано отдавать
1763 предпочтение квадриполярным электродам [678-680].

1764 **ЕОК —IIa C (УУР А, УДД 3)**

1765 •Перед ушиванием раны рекомендовано промывать ложе устройства
1766 физиологическим раствором [681,682].

1767 **ЕОК —Па С (УУР А, УДД 3)**

1768 •У пациентов, перенесших повторное оперативное вмешательство имплантации
1769 устройства, рекомендовано рассмотреть возможность использования
1770 антибактериального конверта [683, 684].

1771 **ЕОК —Пб В (УУР С, УДД 3)**

1772 •Рекомендовано рассмотреть возможность стимуляции средней части МЖП у
1773 пациентов с высоким риском перфорации (например, пожилые люди, перфорация в
1774 прошлом, низкий индекс массы тела, женщины) [685-686].

1775 **ЕОК —Пб С (УУР С, УДД 5)**

1776 •У пациентов с низким индексом массы тела, при синдроме «накручивания
1777 устройства» или по эстетическим причинам рекомендовано рассмотреть возможность
1778 формирования ложа устройства под мышцей.

1779 **ЕОК —Пб С (УУР С, УДД 5)**

1780 •Пациентам, получающим антикоагулянтную терапию, не рекомендуется “мост -
1781 терапия” гепарином [687-688].

1782 **ЕОК —Ш А (УУР А, УДД 1)**

1783 •Имплантация постоянного ЭКС*** не рекомендуется пациентам с лихорадкой.
1784 Следует отложить имплантацию до тех пор, пока у пациента не будет лихорадки в
1785 течение не менее 24 ч.

1786 **ЕОК —Ш В (УУР А, УДД 2)**

1787 **3.6. Выбор режимов кардиостимуляции**

1788 Важная задача при выборе системы для кардиостимуляции — предупреждение
1789 прогрессирования нарушений автоматизма и проводимости. Необходимо выбрать
1790 систему, которая предотвратит развитие сердечной недостаточности, связанной
1791 со стимуляцией сердца. В связи с этим целесообразен подбор ЭКС*** с большими
1792 возможностями программирования, чем это необходимо на момент имплантации. Так,
1793 у пациента с ДСУ и пароксизмальной ФП в дальнейшем может развиваться ПЖБ
1794 (результат прогрессирования заболевания, приема препаратов или катетерной абляции),
1795 а наличие двухкамерного ЭКС*** у такого пациента диктует необходимость функции
1796 переключения режима стимуляции.

1797 В международной практике используется 5-буквенный номенклатурный код,
1798 который представляет собой совместную разработку рабочих групп

1799 Североамериканского общества по стимуляции и электрофизиологии (NASPE)
1800 и Британской группы по стимуляции и электрофизиологии (BPEG), известный как
1801 общий код NBG-NASPE/BPEG. Как правило, используют первые 3 буквы, а буква R
1802 (IV позиция) используется для программируемых ЭКС*** с изменяющейся частотой
1803 ритмовождения — VVIR, DDDR (адаптация по частоте). 5-я буква в коде NBG связана
1804 с анитахикардитическими функциями. В октябре 2001 года рабочие группы
1805 Североамериканского общества по стимуляции и электрофизиологии (NASPE)
1806 и Британской группы по стимуляции и электрофизиологии (BPEG) приняли
1807 обновленный 5-буквенный номенклатурный код для антибрадикардитических устройств
1808 (таблица 5).

1809 Для корректной работы стимулирующей системы необходимы практические
1810 навыки врача по программированию, а также техническое оснащение стационара. После
1811 имплантации ЭКС*** врачу предстоит подбор и программирование некоторых
1812 параметров ЭКС***.

1813 В современных однокамерных ЭКС*** программируемые параметры включают
1814 выбор режима стимуляции, нижнего уровня частоты стимуляции, амплитуды
1815 и длительности импульса, амплитуды чувствительности и рефрактерного периода.

1816 В двухкамерных ЭКС***, кроме этого, программируется максимальный уровень
1817 частоты синхронизации, ПЖ-задержка, режим переключения в ответ на предсердные
1818 тахикардии. Частотно-адаптивные ЭКС*** содержат программу для регуляции
1819 соотношения чувствительности к физической нагрузке и частоты стимуляции,
1820 ограничения по максимальной детектируемой частоте стимуляции. С появлением более
1821 сложных систем электрокардиостимуляции оптимальное программирование становится
1822 еще более сложным и специфичным, что требует особых знаний врача (таблица 6) [353–
1823 357].

1824 **4. Медицинская реабилитация, медицинские показания и противопоказания** 1825 **к применению методов реабилитации**

1826 Если у пациента имеется основное заболевание, то мероприятия по реабилитации
1827 должны осуществляться согласно основному заболеванию.

1828 Специальной реабилитации пациенты после имплантации ЭКС*** и заживления
1829 раны не требуют. В отдельных случаях предполагается ограничение значительных
1830 физических нагрузок в течение 1 месяца после имплантации ЭКС***, щадящий режим
1831 физической активности, ограничение подвижности большой амплитуды конечности

1832 на стороне имплантации. В дальнейшем проводится расширение уровня физической
1833 активности.

1834 **5. Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские показания**
1835 **и противопоказания к применению методов профилактики**

1836 После имплантации ЭКС*** рекомендуется тщательное динамическое наблюдение
1837 за пациентом. Перед выпиской пациента необходимо тестирование параметров,
1838 программированных во время имплантации. Эти параметры должны быть изменены
1839 в случае необходимости при последующих визитах пациента, с учетом результатов
1840 считанных исходных статистических данных, тестирования параметров электродов
1841 и имплантированного устройства и жалоб пациента. Программирование амплитуды,
1842 длительности импульса и проведение диагностических функций, влияющих
1843 на состояние батареи ЭКС***, не должно подвергать риску безопасность пациента.

1844 Пациентам с ЭКС*** рекомендуется регулярно посещать медицинскую
1845 организацию для клинического осмотра и инструментального исследования функции
1846 ЭКС***. Автоматические функции, например автоматическая оценка порога
1847 стимуляции, широко используются в моделях электрокардиостимуляторов и облегчают
1848 наблюдение за отдаленно живущими пациентами. Однако автоматические функции
1849 не универсальны и не могут заменить индивидуальное программирование
1850 и тестирование, особенно сопровождающееся сбором анамнеза и осмотром пациента.

1851 Наблюдение в условиях клиники включает в себя оценку клинического статуса
1852 пациента, состояния батареи, порогов стимуляции, чувствительности, целостности
1853 электродов, а также оптимизацию Р-синхронизированной и сенсорной частоты
1854 сердечного ритма. Расписание осмотров в условиях клиники составляется на усмотрение
1855 врачей, наблюдающих этих пациентов.

1856 Возможно использование в качестве метода наблюдения за пациентом удаленного
1857 мониторинга работы ЭКС***, а частота передачи данных определяется частотой
1858 обследований в зависимости от вида ЭКС*** и клинического состояния пациента [356].

	<i>Визит</i>	<i>Визит + удаленное мониторинг</i>
<i>Все имплантируемые устройства</i>	<i>72 часа в клинике и 2-12 нед после имплантации</i>	
<i>СРТ или СИГ</i>	<i>Каждые 6 мес</i>	<i>Удаленно каждые 6 мес и очно каждые 12 мес</i>
<i>Одно и двухкамерные ЭКС</i>	<i>Каждые 12 мес, затем каждые 3-6 мес при появлении признаков разряда батареи</i>	<i>Удаленно каждые 6 мес и в клинике каждые 18-24 мес</i>

1859 **Рекомендации по динамическому наблюдению за пациентами**
1860 **с имплантированными ЭКС***:**

1861 •Рекомендовано проводить оптимизацию работы ЭКС*** у каждого пациента
1862 индивидуально [353–356].

1863 **ЕОК — IC (УУР С, УДД 5)**

1864 •Взрослым пациентам с ЭКС*** после имплантации рекомендовано проводить
1865 тестирование работы ЭКС*** дважды в течение полугода, затем ежегодно, пациентам
1866 с двухкамерными ЭКС*** после имплантации — дважды в течение 6 месяцев, затем
1867 не менее одного раза в год [353–356].

1868 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 5)**

1869 •Пациентам, которым имплантирован ЭКС*** с возможностью беспроводного
1870 удаленного мониторинга, рекомендована телеметрия как составляющая часть
1871 стандартной стратегии длительного наблюдения [353–356].

1872 **ЕОК — IA (УУР С, УДД 5)**

1873 •При наблюдении за пациентами с ДСУ и имплантированным ЭКС***
1874 рекомендовано регулярное наблюдение для раннего выявления ФП, в том числе
1875 бессимптомной, в связи с необходимостью своевременного назначения
1876 антикоагулянтной терапии [353–356].

1877 **ЕОК — IA (УУР С, УДД 5)**

1878 •Пациентам с персистирующей ДСУ, которым при установленном диагнозе
1879 не рекомендована имплантация ЭКС***, рекомендовано избегать назначения или
1880 назначать с осторожностью лекарственные препараты, угнетающие функцию СПУ
1881 (гипотензивные препараты, бета-адреноблокаторы, психоаналептики средства и др.)
1882 [353–356].

1883 **ЕОК — IC (УУР С, УДД 5)**

1884 •Пациентам с персистирующей ПЖБ I и II степени, которым при установленном
1885 диагнозе не рекомендована имплантация ЭКС***, рекомендовано избегать назначения
1886 или назначать с осторожностью лекарственные препараты, угнетающие функцию ПЖ-
1887 проведения (гипотензивные препараты, сердечные гликозиды, бета-адреноблокаторы,
1888 блокаторы «медленных» кальциевых каналов, психоаналептики и др.) [355–356].

1889 **ЕОК — IC (УУР С, УДД 5)**

1890 **Комментарии:** Частота и способ наблюдения зависят от множества факторов,
1891 в том числе от различных сердечно-сосудистых заболеваний и медицинских проблем,
1892 возраста ЭКС***, географической отдаленности пациента от медицинского центра.

1893 Некоторые центры предпочитают использование удаленного мониторинга для
1894 общего наблюдения с эпизодическим исследованием клинических данных. Другие
1895 центры выполняют большинство манипуляций для наблюдения за пациентами очно
1896 в условиях клиники.

1897 **Удаленный мониторинг за пациентами с имплантируемыми устройствами**

1898 Удаленный мониторинг позволяет осуществлять непрерывное наблюдение
1899 за имплантированной системой и отдельными показателями пациента, в несколько раз
1900 сокращая количество запланированных и дополнительных визитов к врачу. Удаленный
1901 мониторинг (УМ) также позволяет незамедлительно выявлять или предупреждать
1902 возникающие осложнения, что в ряде случаев помогает спасти жизнь пациента.
1903 Немаловажна экономическая выгода для здравоохранения и самого пациента путем
1904 уменьшения затрат на лечение осложнений. Информация от пациента до врача может
1905 быть доставлена всего лишь за несколько минут. Для клиник и их пациентов создана
1906 замкнутая информационная сеть «пациент — сервисный центр — врач», которая
1907 обеспечивает новый высокотехнологичный уровень наблюдения и лечения пациента.

1908 • УМ рекомендуется для сокращения очных визитов в клинику пациентов с
1909 ЭКС***, которые испытывают трудности посещения клиники (например, из-за
1910 ограниченной подвижности или других обстоятельств, или в соответствии с
1911 предпочтениями пациента) [689-681].

1912 **ЕОК — I A (УУР А, УДД 1)**

1913 • УМ рекомендуется в случаях, когда устройство было отозвано из-за
1914 неисправностей или требует более тщательного наблюдения, для обеспечения раннего
1915 обнаружения событий, требующих принятия мер, особенно у пациентов высокого
1916 риска (например, в случае зависимости от ЭКС***).

1917 **ЕОК — I C (УУР А, УДД 3)**

1918 • Использование УМ у пациентов с одно- и двухкамерными кардиостимуляторами
1919 позволяет программировать эти устройства с интервалом до 24 месяцев [689-690].

1920 **ЕОК — IIa A (УУР В, УДД 2)**

1921 Следует рассмотреть использование УМ кардиостимулирующих устройств для
1922 обеспечения более раннего обнаружения клинических (напр., аритмии) или
1923 технических проблем (напр., перелом электрода или истощение батареи) [690, 810]

1924 **ЕОК — IIa B (УУР А, УДД 3)**

1925 **6. Организация оказания медицинской помощи**

1926 Вид помощи и порядок ее оказания зависят от вида БА и сопутствующей
1927 патологии. Структурная или функциональная патология сердца, ее прогрессирование
1928 могут являться основным показанием для госпитализации.

1929 Медицинская помощь пациентам с БА ограничивается случаями:

1930 - пациентов с БА, требующими обследования или лечения сопутствующей или основной
1931 патологии;

1932 - обследование пациентов с БА, связанными с приемом медикаментозных препаратов;

1933 - пациентов с острыми БА, требующими неотложной помощи;

1934 - наблюдение за пациентами после имплантации постоянного ЭКС***.

1935 Экстренные профилактические мероприятия или медикаментозная терапия должны
1936 быть начаты бригадой скорой медицинской помощи пациентам с БА, остановкой
1937 кровообращения/обмороками.

1938 Госпитализация пациента должна быть осуществлена в лечебное учреждение,
1939 которое имеет возможность оказания реаниматологической помощи и непрерывного
1940 мониторингового наблюдения. Оптимальна госпитализация в стационар, располагающий
1941 возможностями и опытом установки временной и постоянной кардиостимуляции.

1942 Имплантация электрокардиостимулятора при наличии показаний или, при
1943 отсутствии технической возможности, направление в учреждение, где проводится
1944 имплантация ЭКС***.

1945 Полное выполнение стандарта клинического обследования, инструментального
1946 обследования, обоснованное назначение, выполнение и анализ дополнительных методов
1947 обследования, в том числе и инвазивных, и установка развернутого клинического
1948 диагноза, соответствующего МКБ-10, с указанием определенного или подтвержденного
1949 основного заболевания. Диагноз должен быть установлен своевременно как
1950 этиологический, так и клинико-электрокардиографический.

1951 Необходимо проведение комплекса неотложных и плановых мероприятий для
1952 купирования острого или нормализации хронического состояния, связанного с БА,
1953 коррекция оптимальной терапии основного заболевания, а также определение показаний
1954 и выполнение временной или постоянной кардиостимуляции.

1955 После имплантации необходимо проведение оптимизации программы
1956 имплантированного электронного устройства для персонализации его
1957 функционирования, снижения энергозатрат, профилактики осложнений, проведение

1958 регулярного программирования устройства и использование возможности удаленного
1959 телемониторинга устройства (если возможно).

1960 **Показания для плановой госпитализации**

- 1961 1. Появление симптоматики, потенциально ассоциированной с брадикардией (обморок,
1962 предобморочное состояние, слабость, головокружение и др.).
- 1963 2. Ухудшение состояния и нарастание симптоматики, связанной с БА.
- 1964 3. Плановая имплантация постоянного ЭКС***.
- 1965 4. Плановая замена имплантированного ЭКС***.
- 1966 5. Дисфункция имплантированного ЭКС***, требующая хирургического вмешательства.
- 1967 6. Инфекционные осложнения, связанные с системой стимуляции.
- 1968 7. Подбор антиаритмической терапии, когда это невозможно в амбулаторных условиях
1969 или сопряжено с высоким риском осложнений.

1970 **Показания для экстренной госпитализации**

- 1971 1. Островозникшая БА, требующая неотложной помощи.
- 1972 2. Состояния, требующие временной стимуляции сердца.
- 1973 3. Нарушения гемодинамики, связанные с БА или дисфункциями ЭКС***.
- 1974 4. Острая дисфункция ЭКС***, требующая хирургической коррекции.
- 1975 5. Состояние после остановки кровообращения и восстановления нормальной сердечной
1976 деятельности.

1977 **Показания для выписки пациента из стационара**

- 1978 1. Пациенты с имплантированными ЭКС***, которым дальнейшее стационарное лечение
1979 не требуется.
- 1980 2. Стабилизация состояния пациентов при обратимых или медикаментозных БА.
- 1981 3. Успешная коррекция медикаментозной терапии.

1982 **7. Дополнительная информация (в том числе факторы, влияющие на исход**
1983 **заболевания или состояния)**

1984

1985 **7.1. Экстракция электродов**

1986 В ряде случаев дисфункции системы кардиостимуляции — по причине
1987 имплантированных электродов или инфекционных осложнениях — рассматривается
1988 вопрос удаления электродов из сердца. Это может быть выполнено трансвенозно,
1989 с использованием специального инструментария, или на открытом сердце путем
1990 открытой торакотомии.

1991 Причины экстракции электродов — инфекционные, обусловленные системной
1992 инфекцией: клапанный эндокардит, электрод-ассоциированный эндокардит, сепсис или
1993 инфицирование ложа, венозный тромбоз или стеноз, хроническая боль и дисфункции
1994 электродов (дислокации, переломы, нарушения изоляции).

1995 Во всех случаях показания к экстракции и метод ее выполнения обсуждаются
1996 индивидуально, а проблема удаления эндокардиальных электродов (ЭЭ) выделяется как
1997 отдельное направление в аритмологии.

1998 **Рекомендации к экстракции электродов при инфекционных осложнениях:**

1999 • При верифицированной системной инфекции — клапанный эндокардит,
2000 электрод-ассоциированный эндокардит, сепсис — рекомендовано полное удаление
2001 системы стимуляции и всех ранее имплантированных ЭЭ [357–371].

2002 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

2003 • При верифицированной инфекции, связанной с местом имплантированной
2004 системы ЭКС*** — абсцесс ложа, пролежень, кожная эрозия, свищ, — даже при
2005 отсутствии клинических доказательств вовлечения в процесс внутрисосудистой порции
2006 ЭЭ рекомендовано полное удаление системы стимуляции [357–371].

2007 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

2008 • При подтвержденной инфекции внутригрудной части эпикардиальной системы
2009 стимуляции рекомендовано полное удаление эпикардиальных электродов и/или пластин
2010 [357–371].

2011 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

2012 • При клинической манифестации (бактериемия) латентной грамположительной
2013 инфекции рекомендовано полное удаление системы стимуляции и всех ранее
2014 имплантированных ЭЭ [360–371].

2015 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

2016 • При сохраняющейся бактериемии, вызванной грамотрицательными
2017 микроорганизмами, рекомендовано полное удаление системы стимуляции и всех ранее
2018 имплантированных ЭЭ [360–361].

2019 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

2020 • При поверхностном инфицировании послеоперационной раны в области
2021 имплантации рекомендовано удаление системы стимуляции и ее компонентов [360–371].

2022 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

2023 • При длительной антибактериальной терапии хронической бактериемии в случаях,
2024 когда доказан другой источник инфекции, удаление системы стимуляции
2025 и ее компонентов не рекомендовано [357–371].

2026 **ЕОК — нет (УУР А, УДД 3)**

2027 **Рекомендации к экстракции электродов при неинфекционных осложнениях:**

2028 • Пациентам с выраженной хронической болью в области имплантированного
2029 устройства, когда ее проявления невозможно устранить медикаментозным или
2030 хирургическим путем и отсутствует какая-либо альтернатива разрешения проблемы,
2031 рекомендовано удаление системы стимуляции или ее компонентов [372–404].

2032 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

2033 • Пациентам с клинически значимыми проявлениями тромбоэмболического
2034 синдрома, связанного с образованием тромбов на электроде или фрагменте электрода,
2035 рекомендовано удаление ЭЭ [372–404].

2036 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

2037 • Пациентам с двусторонними тромбозами подключичных вен или тромбозом ВПВ,
2038 препятствующими имплантации необходимого для пациента ЭЭ, рекомендовано
2039 удаление ЭЭ [372–404].

2040 **ЕОК — нет (УУР А, УДД 3)**

2041 • При необходимости стентирования вены, уже использованной для доставки ЭЭ
2042 к сердцу (содержащей ЭЭ), рекомендовано удаление ЭЭ [372–404].

2043 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

2044 • При окклюзии или стенозе ВПВ, имеющих значимые клинические проявления,
2045 рекомендовано удаление ЭЭ [372–404].

2046 **ЕОК — нет (УУР А, УДД 3)**

2047 • При наличии четырех и более ЭЭ на одной из сторон — или через ВПВ проведено
2048 пять и более ЭЭ — рекомендовано удаление ЭЭ [390–404].

2049 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

2050 • Пациентам с тромбозом подключичной вены на стороне ранее
2051 имплантированного устройства в случаях, когда есть необходимость в имплантации
2052 дополнительного ЭЭ, но имеются противопоказания к использованию противоположной
2053 подключичной вены — артериовенозная фистула, сосудистый протез, постоянный
2054 венозный порт, перенесенная мастэктомия и др., — рекомендовано удаление ЭЭ [372–
2055 404].

2056 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

2057 • Удаление ЭЭ рекомендовано пациентам с жизнеугрожающими аритмиями,
2058 причиной которых являются сами электроды [372–404].

2059 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

2060 • Удаление ЭЭ рекомендовано в случаях, когда ЭЭ из-за их дизайна или нарушения
2061 целостности представляют собой непосредственную угрозу (напр., перелом и протрузия
2062 стилета в J-образных электродах) [369–404].

2063 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

2064 • Удаление ЭЭ рекомендовано в случаях, когда они препятствуют проведению
2065 противоопухолевого лечения (радиационная терапия, реконструктивная хирургия) [372–
2066 404].

2067 **ЕОК — нет С-ЕО (УУР С, УДД 4)**

2068 • Удаление ЭЭ рекомендовано в случаях, когда диагностика состояния пациента
2069 требует безальтернативного использования МРТ [372–404].

2070 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

2071 • Удаление ЭЭ не рекомендовано пациентам с прогнозируемой длительностью
2072 жизни менее 1 года [364–404].

2073 **ЕОК — нет (УУР С, УДД 4)**

2074 • Удаление ЭЭ не рекомендовано в ситуациях, когда установлено аномальное
2075 позиционирование ЭЭ (имплантирован через подключичную артерию, аорту, плевру,
2076 средостение, стенку предсердия или желудочка). В случаях клинической необходимости
2077 используются дополнительные методики с обязательной хирургической страховкой
2078 [372–404].

2079 **ЕОК — нет (УУР В, УДД 3)**

2080 **7.2. Выполнение магнитно-резонансной томографии у пациентов с**
2081 **имплантированными устройствами**

2082 Пациентам с имплантированными ЭКС нередко требуется выполнение МРТ. Это
2083 потенциально может вызвать нежелательные побочные эффекты, такие как неправильная
2084 работа устройства из-за перезагрузки устройства или проблемы с чувствительностью,
2085 взаимодействие с магнитным герконом (может вызывать необратимое переключение
2086 геркона, датчика, отвечающего за включение магнитного теста без возможности
2087 перепрограммирования), индукцию токов, приводящих к захвату миокарда, нагреву
2088 кончика электрода с изменением порогов чувствительности или стимуляции, или
2089 перфорации электрода.

2090 В настоящее время большинство производителей ЭКС предлагают МРТ-совместимые
2091 устройства. Производитель обычно указывает период ожидания в течение 6 нед. после
2092 имплантации, но выполнить МРТ можно и раньше, если это клинически оправдано.
2093 Существует достаточно доказательств того, что МРТ можно безопасно выполнять
2094 пациентам с МРТ- несовместимыми ЭКС при соблюдении ряда мер предосторожности
2095 [692-694]. В 2017г Общество серечного ритма опубликовало консенсусное заключение
2096 экспертов по МРТ у пациентов с ИЭУ, которое было разработано и одобрено рядом
2097 ассоциаций, включая Европейскую ассоциацию сердечного ритма и несколько
2098 радиологических ассоциаций [693]. Оценка необходимости выполнения МРТ должна
2099 проводиться в каждом конкретном случае, сопоставляя преимущества МРТ с
2100 потенциальными рисками и доступностью альтернативных методов визуализации,
2101 используя совместное принятие решения. Обычно МРТ следует выполнять строго в
2102 соответствии с утвержденным стандартизированным в конкретном учреждении
2103 протоколом, соблюдая соответствующие условия (включая программирование ИЭУ
2104 [395, 692,694-696].

2105

2106 • У пациентов с МРТ-совместимыми системами ЭКС***, МРТ рекомендовано
2107 безопасно выполнять в соответствии с инструкциями производителя [395. 693,
2108 696].

2109 **ЕОК — I A (УУР А, УДД 1)**

2110 • У пациентов с МРТ-несовместимыми устройствами выполнение МРТ
2111 рекомендовано при отсутствии альтернативных методов визуализации, а также
2112 эпикардиальных электродов, заглушенных или поврежденных электродов,
2113 адаптеров/удлинителей электродов [692,694].

2114 **ЕОК — IIa B (УУР А, УДД 3)**

2115 • Рекомендовано рассмотреть возможность выполнения МРТ у пациентов с
2116 системами ЭКС*** и заглушенными эндокардиальными электродами, если нет
2117 доступных альтернативных методов визуализации [697-700].

2118 **ЕОК — IIb C (УУР С, УДД 5)**

2119

2120 **7.3. Если постоянная стимуляция больше не показана**

2121 Возможны несколько вариантов ведения пациентов с имплантированными
2122 кардиостимулирующими системами, которым стимуляция более не по-
2123 казана:

- 2124 1. Оставить на месте всю систему стимуляции, включая устройство и электроды
2125 2. Удалить устройство и оставить электроды
2126 3. Удалить устройство и электроды

2127 Выбор варианта 1 зависит от срока службы имплантированного устройства, который
2128 зависит от производителя и в редких случаях может приводить к осложнениям [701].
2129 Вариант 1 является предпочтительным для ослабленных и пожилых пациентов.
2130 Вариант 2 сопряжен с более низким интраоперационным риском, но в дальнейшем,
2131 могут возникать осложнения со стороны оставленного электрода, например, при
2132 выполнении МРТ. Особенно у молодых пациентов может возникнуть потребность
2133 удаления оставленных электродов в будущем из-за инфекции и более высокий риск
2134 осложнений за счет увеличения длительности процедуры имплантации. В нескольких
2135 исследованиях было показано, что процедура удаления заглушенных электродов
2136 сопряжена с более высоким риском осложнений и меньшей эффективностью [702-705].
2137 Вариант 3 ассоциирован с высоким риском осложнений, связанных с процедурой
2138 удаления электродов, но при этом исключается вероятность возникновения связанных с
2139 устройством осложнений в будущем. Высокая эффективность и низкий уровень
2140 осложнений наблюдаются при процедурах экстракции электродов, выполненных в
2141 специализированных центрах с большим объемом операций и современным
2142 оборудованием [704]. Последний вариант может подходить при сочетании таких
2143 факторов как молодой возраст пациента, низкий риск экстракции электрода и опыт
2144 специалиста.

2145 В рамках пациент-ориентированного ведения решение в таких ситуациях должно быть
2146 основано на индивидуальном соотношении риска и пользы и принято совместно с
2147 пациентом и лицами, осуществляющими уход за ним. Для получения информированного
2148 согласия необходимо предоставление достаточной информации. Следует учитывать
2149 такие факторы как возраст пациента, его клиническое состояние, сопутствующие
2150 заболевания, систему ЭКС, давность имплантации электрода и ожидаемую
2151 продолжительность жизни пациента.

2152

- 2153 • Когда ЭКС*** больше не показана, рекомендован индивидуальный анализ риска и
2154 пользы для принятия решения совместного с пациентом.

2155 **ЕОК — I C (УУР А, УДД 3)**

2156 **Критерии оценки качества медицинской помощи**

2157 Критерии оценки качества первичной медико-санитарной помощи взрослым при

2158 брадиаритмии и нарушениях проводимости (коды по МКБ - 10: I44 (I44.0, I44.1, I44.2,
 2159 I44.3, I44.4, I44.5, I44.6, I44.7), I45 (I45.0, I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, I45.8, I45.9), I46
 2160 (I46.0, I46.1, I46.9), I49.5)
 2161

п/п	Критерии оценки качества	Оценка выполнения
1.	Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога или врача-терапевта первичный	Да/Нет
2.	Выполнена регистрация электрокардиограммы в 12 отведениях (при установлении диагноза)	Да/Нет
3.	Выполнено холтеровское мониторирование сердечного ритма	Да/Нет
4.	Выполнена эхокардиография (при брадикардии или нарушении проводимости блокаде левой ножки пучка Гиса и предсердно-желудочковой блокаде II степени Мобитц II, предсердно-желудочковой блокаде высокой степени или предсердно-желудочковой блокаде III степени при подозрении на структурное заболевание сердца)	Да/Нет
5.	Выполнено тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства дважды в течение 6 месяцев, затем 1 раза в год (после имплантации электрокардиостимулятора) (в специализированных центрах)	Да/Нет

2162
 2163 Критерии оценки качества специализированной медицинской помощи взрослым при
 2164 брадиаритмии и нарушениях проводимости (коды по МКБ - 10: I44 (I44.0, I44.1, I44.2,
 2165 I44.3, I44.4, I44.5, I44.6, I44.7), I45 (I45.0, I45.1, I45.2, I45.3, I45.4, I45.5, I45.8, I45.9), I46
 2166 (I46.0, I46.1, I46.9), I49.5)
 2167

п/п	Критерии оценки качества	Оценка выполнения
1.	Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога или врача-терапевта первичный	Да/Нет
2.	Выполнена регистрация электрокардиограммы в 12 отведениях	Да/Нет
3.	Выполнено холтеровское мониторирование сердечного ритма	Да/Нет
4.	Выполнена эхокардиография (при брадикардии или нарушении проводимости блокаде левой ножки пучка Гиса и предсердно-желудочковой блокаде II степени Мобитц II, предсердно-желудочковой блокаде высокой степени или предсердно-	Да/Нет

	желудочковой блокаде III степени при подозрении на структурное заболевание сердца)	
5.	Выполнена имплантация электрокардиостимулятора (пациентам с дисфункцией синусового узла и предсердно-желудочковой блокадой высокой степени), или осуществлен при наличии медицинских показаний перевод пациента в другую медицинскую организацию, имеющую оборудование в соответствии со стандартом оснащения и кадры в соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами	Да/Нет
6.	Выполнено тестирование состояния постоянного имплантируемого антиаритмического устройства дважды в течение 6 месяцев, затем 1 раза в год (после имплантации электрокардиостимулятора в случае, если не выполнено в амбулаторных условиях) (в специализированных центрах)	Да/Нет

2168
2169

2170

Список литературы

- 2171 1. Howick JH. The Philosophy of Evidence-based Medicine. Wiley. p. 15. ISBN 978–1–
2172 4443–4266–6.
- 2173 2. Sackett DL, Rosenberg WM, Gray JA, et al. Evidence based medicine: what it is and
2174 what it isn't. BMJ. 1996;312:71–72.
- 2175 3. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «Об основах
2176 охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
- 2177 4. Эпидемиологический словарь / под ред. Джона М.Ласта для Международной
2178 эпидемиологической ассоциации. — 4-е изд. — Москва, 2009. — 316 с.
- 2179 5. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.
2180 Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТР 52379–2005. Надлежащая
2181 клиническая практика. — Москва, 2005.
- 2182 6. Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обращении
2183 лекарственных средств»
- 2184 7. Малая медицинская энциклопедия. М.: Медицинская энциклопедия. 1991–96 гг.
2185 http://www.rubricon.com/mme_1.asp
- 2186 8. Андреева Н.С., Реброва О.Ю., Зорин Н.А. Системы оценки достоверности научных
2187 доказательств и убедительности рекомендаций: сравнительная характеристика

- 2188 и перспективы унификации. // Медицинские технологии. Оценка и выбор. —
2189 2012. — № 4. — С. 10–24.
- 2190 9. Robles de Medina E.O., Bernard R., Coumel Ph. et al. Definition of terms related
2191 to cardiac rhythm. WHO/ISFC Task Force. Eur J Cardiol, 1978, v. 8, 127–144.
- 2192 10. Егоров Д.Ф., Гордеев О.Л. Диагностика и лечение пациентов
2193 с имплантированными антиаритмическими устройствами. — СПб.: Человек, 2005. —
2194 256 с.
- 2195 11. Writing Committee Members, Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Barrett C, Edgerton JR,
2196 Ellenbogen KA, Gold MR, Goldschlager NF, Hamilton RM, Joglar JA, Kim RJ, Lee R, Marine
2197 JE, McLeod CJ, Oken KR, Patton KK, Pellegrini CN, Selzman KA, Thompson A, Varosy PD.
2198 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients with
2199 Bradycardia and Cardiac Conduction Delay. JACC. 2019. Vol.74. Issue 7.
- 2200 12. Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, Bordachar P, Boriani G, Breithardt
2201 OA, Cleland J, Deharo JC, Delgado V, Elliott PM, Gorenek B, Israel CW, Leclercq C,
2202 Linde C, Mont L, Padeletti L, Sutton R, Vardas PE.. 2013 ESC Guidelines on cardiac pacing
2203 and cardiac resynchronization therapy. European Heart Journal. 2013;34:2281–2329.
- 2204 13. Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, et al. 2013 ESC Guidelines on cardiac
2205 pacing and cardiac resynchronization therapy. The Task Force on cardiac pacing and
2206 resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in
2207 collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). European Heart Journal.
2208 2013;34:2281–2329.
- 2209 14. Бокерия Л.А., Ревшвили А.Ш., Левант А.Д., Жданов А.М., Колпаков Е.В., Егоров
2210 Д.Ф., Пекарский В.В., Дрогайцев А.Д. Рекомендации для имплантации
2211 электрокардиостимуляторов при брадикардиях, 1993. УДК 616.12–008.314–089.844.
- 2212 15. Del Rosso A, Ungar A, Maggi R, et al. Clinical predictors of cardiac syncope at initial
2213 evaluation in patients referred urgently to a general hospital: the EGSYS score. Heart.
2214 2008;94:1620–6.
- 2215 16. Linzer M, Yang EH, Estes NA 3rd, et al. Diagnosing syncope. Part 1: Value of history,
2216 physical examination, and electrocardiography. Clinical Efficacy Assessment Project of the
2217 American College of Physicians. Ann Intern Med. 1997;126:989–96.
- 2218 17. Perez-Rodon J, Martinez-Alday J, Baron-Esquivias G, et al. Prognostic value of the
2219 electrocardiogram in patients with syncope: data from the group for syncope study in the
2220 emergency room (GESINUR). Heart Rhythm. 2014;11:2035–44.

- 2221 18. Thiruganasambandamoorthy V, Hess EP, Turko E, et al. Defining abnormal
2222 electrocardiography in adult emergency department syncope patients: the Ottawa
2223 Electrocardiographic Criteria. *CJEM*. 2012;14:248–58.
- 2224 19. Shen WK, Sheldon RS, Benditt DG, et al. 2017 ACC/AHA/HRS guideline for the
2225 evaluation and management of patients with syncope: a report of the American College
2226 of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the
2227 Heart Rhythm Society. *Circulation*. 2017;136:e60–122
- 2228 20. Chon SB, Kwak YH, Hwang SS, et al. Severe hyperkalemia can be detected immediately
2229 by quantitative electrocardiography and clinical history in patients with symptomatic
2230 or extreme bradycardia: a retrospective cross-sectional study. *J Crit Care*. 2013;28:1112.e7–13.
- 2231 21. Mandell BF. Cardiovascular involvement in systemic lupus erythematosus. *Semin*
2232 *Arthritis Rheum*. 1987;17:126–41.
- 2233 22. Nakayama Y, Ohno M, Yonemura S, et al. A case of transient 2:1 atrioventricular block,
2234 resolved by thyroxine supplementation for subclinical hypothyroidism. *Pacing Clin*
2235 *Electrophysiol*. 2006;29:106–8.
- 2236 23. Noble K, Isles C. Hyperkalaemia causing profound bradycardia. *Heart*. 2006;92:1063.
- 2237 24. Wan D, Blakely C, Branscombe P, et al. Lyme carditis and high-degree atrioventricular
2238 block. *Am J Cardiol*. 2018;121:1102–4.
- 2239 25. Barrett PM, Komatireddy R, Haaser S, et al. Comparison of 24-hour Holter monitoring
2240 with 14-day novel adhesive patch electrocardiographic monitoring. *Am J Med*.
2241 2014;127:95.e11–7.
- 2242 26. Brown AP, Dawkins KD, Davies JG. Detection of arrhythmias: use of a patient-activated
2243 ambulatory electrocardiogram device with a solid-state memory loop. *Br Heart J*.
2244 1987;58:251–3.
- 2245 27. Cumbee SR, Pryor RE, Linzer M. Cardiac loop ECG recording: a new noninvasive
2246 diagnostic test in recurrent syncope. *South Med J*. 1990;83:39–43.
- 2247 28. Gibson TC, Heitzman MR. Diagnostic efficacy of 24-hour electrocardiographic
2248 monitoring for syncope. *Am J Cardiol*. 1984;53:1013–7.
- 2249 29. Joshi AK, Kowey PR, Prystowsky EN, et al. First experience with a Mobile Cardiac
2250 Outpatient Telemetry (MCOT) system for the diagnosis and management of cardiac
2251 arrhythmia. *Am J Cardiol*. 2005;95:878–81.
- 2252 30. Linzer M, Yang EH, Estes NA 3rd, et al. Diagnosing syncope. Part 2: unexplained
2253 syncope. Clinical Efficacy Assessment Project of the American College of Physicians. *Ann*
2254 *Intern Med*. 1997;127:76–86.

- 2255 31. Locati ET, Moya A, Oliveira M, et al. External prolonged electrocardiogram monitoring
2256 in unexplained syncope and palpitations: results of the SYNARR-Flash study. *Europace*.
2257 2016;18:1265–72.
- 2258 32. Reiffel JA, Schwarzberg R, Murry M. Comparison of autotriggered memory loop
2259 recorders versus standard loop recorders versus 24-hour Holter monitors for arrhythmia
2260 detection. *Am J Cardiol*. 2005;95:1055–9.
- 2261 33. Rosenberg MA, Samuel M, Thosani A, et al. Use of a noninvasive continuous monitoring
2262 device in the management of atrial fibrillation: a pilot study. *Pacing Clin Electrophysiol*.
2263 2013;36:328–33.
- 2264 34. Rothman SA, Laughlin JC, Seltzer J, et al. The diagnosis of cardiac arrhythmias: a
2265 prospective multi-center randomized study comparing mobile cardiac outpatient telemetry
2266 versus standard loop event monitoring. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2007;18:241–7.
- 2267 35. Sivakumaran S, Krahn AD, Klein GJ, et al. A prospective randomized comparison of
2268 loop recorders versus Holter monitors in patients with syncope or presyncope. *Am J Med*.
2269 2003;115:1–5.
- 2270 36. Turakhia MP, Hoang DD, Zimetbaum P, et al. Diagnostic utility of a novel leadless
2271 arrhythmia monitoring device. *Am J Cardiol*. 2013;112:520–4.
- 2272 37. Brignole M, Auricchio A, Baron-Esquivias G, et al. 2013 ESC Guidelines on cardiac
2273 pacing and cardiac resynchronization therapy. The Task Force on cardiac pacing and
2274 resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed in
2275 collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). *European Heart Journal*.
2276 2013; 34: 2281–2329.
- 2277 38. Ревишвили А.Ш., Бойцов С.А., Давтян К.В., Зенин С.А., Кузнецов В.А., Купцов
2278 В.В., Лебедев Д.С., Ломидзе Н.Н., Медведев М.М., Недоступ А.В., Неминуций Н.М.,
2279 Певзнер А.В., Покушалов Е.А., Рзаев Ф.Г., Татарский Б.А., Термосесов С.А., Тюрина
2280 Т.В., Шубик Ю.В., Яшин С.М. Клинические рекомендации по проведению
2281 электрофизиологических исследований, катетерной абляции и применению
2282 имплантируемых антиаритмических устройств. — Москва, 2017.— 702 с.
- 2283 39. Dagues N, Bongiorni MG, Dobeanu D, et al. Current investigation and management
2284 of patients with syncope: results of the European Heart Rhythm Association survey. *Europace*.
2285 2013;15:1812–5
- 2286 40. Schneider JF, Thomas HE Jr, Kreger BE, et al. Newly acquired left bundle-branch block:
2287 the Framingham study. *Ann Intern Med*. 1979;90:303–10.

- 2288 41. Schneider JF, Thomas HE Jr, Sorlie P, et al. Comparative features of newly acquired left
2289 and right bundle branch block in the general population: the Framingham study. *Am J Cardiol.*
2290 1981;47:931–40.
- 2291 42. Talreja D, Gruver C, Sklenar J, et al. Efficient utilization of echocardiography for the
2292 assessment of left ventricular systolic function. *Am Heart J.* 2000;139:394–8.
- 2293 43. Dhingra R, Ho Nam B, Benjamin EJ, et al. Cross-sectional relations of
2294 electrocardiographic QRS duration to left ventricular dimensions: the Framingham Heart
2295 Study. *J Am Coll Cardiol.* 2005;45:685–9.
- 2296 44. Dhingra R, Pencina MJ, Wang TJ, et al. Electrocardiographic QRS duration and the risk
2297 of congestive heart failure: the Framingham Heart Study. *Hypertension.* 2006;47:861–7.
- 2298 45. Badheka AO, Singh V, Patel NJ, et al. QRS duration on electrocardiography and
2299 cardiovascular mortality (from the National Health and Nutrition Examination Survey-III). *Am*
2300 *J Cardiol.* 2013;112:671–7.
- 2301 46. Bogale N, Orn S, James M, et al. Usefulness of either or both left and right bundle branch
2302 block at baseline or during follow-up for predicting death in patients following acute
2303 myocardial infarction. *Am J Cardiol.* 2007;99:647–50.
- 2304 47. Eriksson P, Hansson PO, Eriksson H, et al. Bundle-branch block in a general male
2305 population: the study of men born 1913. *Circulation.* 1998;98:2494–500.
- 2306 48. Fahy GJ, Pinski SL, Miller DP, et al. Natural history of isolated bundle branch block. *Am*
2307 *J Cardiol.* 1996;77:1185–90.
- 2308 49. Imanishi R, Seto S, Ichimaru S, et al. Prognostic significance of incident complete left
2309 bundle branch block observed over a 40-year period. *Am J Cardiol.* 2006;98:644–8.
- 2310 50. Chiu DT, Shapiro NI, Sun BC, et al. Are echocardiography, telemetry, ambulatory
2311 electrocardiography monitoring, and cardiac enzymes in emergency department patients
2312 presenting with syncope useful tests? A preliminary investigation. *J Emerg Med.* 2014;47:113–
2313 8.
- 2314 51. Douglas PS, Garcia MJ, Haines DE, et al. ACCF/ASE/AHA/ASNC/
2315 HFSA/HRS/SCAI/SCCM/SCCT/SCMR. 2011 Appropriate use criteria for echocardiography:
2316 a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task
2317 Force, American Society of Echocardiography, American Heart Association, American Society
2318 of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society
2319 for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Critical Care Medicine, Society
2320 of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance
2321 American College of Chest Physicians. *J Am Soc Echocardiogr.* 2011;24:229–67.

- 2322 52. Menozzi C, Brignole M, Alboni P, et al. The natural course of untreated sick sinus
2323 syndrome and identification of the variables predictive of unfavorable outcome. *Am J Cardiol.*
2324 1998;82:1205–9.
- 2325 53. Bluemke DA, Achenbach S, Budoff M, et al. Noninvasive coronary artery imaging:
2326 magnetic resonance angiography and multidetector computed tomography angiography:
2327 a scientific statement from the american heart association committee on cardiovascular imaging
2328 and intervention of the council on cardiovascular radiology and intervention, and the councils
2329 on clinical cardiology and cardiovascular disease in the young. *Circulation.* 2008;118:586–606.
- 2330 54. Bokhari S, Castano A, Pozniakoff T, et al. (99m)Tc-pyrophosphate scintigraphy for
2331 differentiating light-chain cardiac amyloidosis from the transthyretin-related familial and senile
2332 cardiac amyloidoses. *Circ Cardiovasc Imaging.* 2013;6:195–201.
- 2333 55. Cheong B, Huber S, Muthupillai R, et al. Evaluation of myocardial iron overload
2334 by T(2)* cardiovascular magnetic resonance imaging. *Tex Heart Inst J.* 2005;32:448–9.
- 2335 56. Fontana M, Pica S, Reant P, et al. Prognostic value of late gadolinium enhancement
2336 cardiovascular magnetic resonance in cardiac amyloidosis. *Circulation.* 2015;132:1570–9.
- 2337 57. Franco A, Javidi S, Ruehm SG. Delayed myocardial enhancement in cardiac magnetic
2338 resonance imaging. *J Radiol Case Rep.* 2015;9:6–18.
- 2339 58. Greulich S, Deluigi CC, Gloekler S, et al. CMR imaging predicts death and other adverse
2340 events in suspected cardiac sarcoidosis. *JACC Cardiovasc Imaging.* 2013;6:501–11.
- 2341 59. Haq M, Pawar S, Berk JL, et al. Can 99mTc-pyrophosphate aid in early detection
2342 of cardiac involvement in asymptomatic variant TTR amyloidosis? *JACC Cardiovasc Imaging.*
2343 2017;10:713–4.
- 2344 60. Taylor AJ, Cerqueira M, Hodgson JM, et al. ACCF/SCCT/ACR/
2345 AHA/ASE/ASNC/NASCI/SCAI/SCMR 2010 appropriate use criteria for cardiac computed
2346 tomography: a report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use
2347 Criteria Task Force, the Society of Cardiovascular Computed Tomography, the American
2348 College of Radiology, the American Heart Association, the American Society
2349 of Echocardiography, the American Society of Nuclear Cardiology, the North American
2350 Society for Cardiovascular Imaging, the Society for Cardiovascular Angiography and
2351 Interventions, and the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance. *Circulation.*
2352 2010;122:e525–55.
- 2353 61. Mendu ML, McAvay G, Lampert R, et al. Yield of diagnostic tests in evaluating syncopal
2354 episodes in older patients. *Arch Intern Med.* 2009;169:1299–305.

- 2355 62. Recchia D, Barzilai B. Echocardiography in the evaluation of patients with syncope.
2356 J Gen Intern Med. 1995;10:649–55.
- 2357 63. Tilkian AG, Guilleminault C, Schroeder JS, et al. Sleep-induced apnea syndrome.
2358 Prevalence of cardiac arrhythmias and their reversal after tracheostomy. Am J Med.
2359 1977;63:348–58. S4.2.7–2.
- 2360 64. Guilleminault C, Connolly SJ, Winkle RA. Cardiac arrhythmia and conduction
2361 disturbances during sleep in 400 patients with sleep apnea syndrome. Am J Cardiol.
2362 1983;52:490–4. S4.2.7–3.
- 2363 65. Shepard JW Jr, Garrison MW, Grither DA, et al. Relationship of ventricular ectopy to
2364 oxyhemoglobin desaturation in patients with obstructive sleep apnea. Chest. 1985;88:335–40.
- 2365 66. Shepard JW Jr. Gas exchange and hemodynamics during sleep. Med Clin North Am.
2366 1985;69:1243–64.
- 2367 67. Hoffstein V, Mateika S. Cardiac arrhythmias, snoring, and sleep apnea. Chest.
2368 1994;106:466–71.
- 2369 68. Boudoulas H, Schmidt HS, Clark RW, et al. Anthropometric characteristics, cardiac
2370 abnormalities and adrenergic activity in patients with primary disorders of sleep. J Med.
2371 1983;14:223–38.
- 2372 69. Mehra R, Benjamin EJ, Shahar E, et al. Association of nocturnal arrhythmias with
2373 sleepdisordered breathing: The Sleep Heart Health Study. Am J Respir Crit Care Med.
2374 2006;173:910–6.
- 2375 70. Miller WP. Cardiac arrhythmias and conduction disturbances in the sleep apnea
2376 syndrome. Prevalence and significance. Am J Med. 1982;73:317–21.
- 2377 71. Flemons WW, Remmers JE, Gillis AM. Sleep apnea and cardiac arrhythmias. Is there
2378 a relationship? Am Rev Respir Dis. 1993;148:618–21.
- 2379 72. Stegman SS, Burroughs JM, Henthorn RW. Asymptomatic bradyarrhythmias as a marker
2380 for sleep apnea: appropriate recognition and treatment may reduce the need for pacemaker
2381 therapy. Pacing Clin Electrophysiol. 1996;19:899–904.
- 2382 73. Garrigue S, Pepin JL, Defaye P, et al. High prevalence of sleep apnea syndrome
2383 in patients with long-term pacing: the European Multicenter Polysomnographic Study.
2384 Circulation. 2007;115:1703–9.
- 2385 74. Becker H, Brandenburg U, Peter JH, et al. Reversal of sinus arrest and atrioventricular
2386 conduction block in patients with sleep apnea during nasal continuous positive airway pressure.
2387 Am J Respir Crit Care Med. 1995;151:215–8.

- 2388 75. Koehler U, Fus E, Grimm W, et al. Heart block in patients with obstructive sleep apnoea:
2389 pathogenetic factors and effects of treatment. *Eur Respir J.* 1998;11:434–9.
- 2390 76. Grimm W, Koehler U, Fus E, et al. Outcome of patients with sleep apnea-associated
2391 severe bradyarrhythmias after continuous positive airway pressure therapy. *Am J Cardiol.*
2392 2000;86:688–92, a9.
- 2393 77. Harbison J, O'Reilly P, McNicholas WT. Cardiac rhythm disturbances in the obstructive
2394 sleep apnea syndrome: effects of nasal continuous positive airway pressure therapy. *Chest.*
2395 2000;118:591–5.
- 2396 78. Daccarett M, Segerson NM, Hamdan AL, et al. Relation of daytime bradyarrhythmias
2397 with high risk features of sleep apnea. *Am J Cardiol.* 2008;101:1147–50.
- 2398 79. Bjerregaard P. Premature beats in healthy subjects 40-79 years of age. *Eur Heart J.*
2399 1982;3:493–503.
- 2400 80. Clarke JM, Hamer J, Shelton JR, et al. The rhythm of the normal human heart. *Lancet.*
2401 1976;1:508–12.
- 2402 81. Fleg JL, Kennedy HL. Cardiac arrhythmias in a healthy elderly population: detection
2403 by 24-hour ambulatory electrocardiography. *Chest.* 1982;81:302–7.
- 2404 82. Brodsky M, Wu D, Denes P, et al. Arrhythmias documented by 24 hour continuous
2405 electrocardiographic monitoring in 50 male medical students without apparent heart disease.
2406 *Am J Cardiol.* 1977;39:390–5.
- 2407 83. Meytes I, Kaplinsky E, Yahini JH, et al. Wenckebach A-V block: a frequent feature
2408 following heavy physical training. *Am Heart J.* 1975;90:426–30.
- 2409 84. Northcote RJ, Canning GP, Ballantyne D. Electrocardiographic findings in male veteran
2410 endurance athletes. *Br Heart J.* 1989;61:155–60.
- 2411 85. Viitasalo MT, Kala R, Eisalo A. Ambulatory electrocardiographic recording in endurance
2412 athletes. *Br Heart J.* 1982;47:213–20.
- 2413 86. Brubaker H. and Kitzman D W. Chronotropic Incompetence : Causes, Consequences, and
2414 Management. *Circulation.* 2011;123:1010–1020.
- 2415 87. Morise A. Exercise Testing in Nonatherosclerotic Heart Disease, Hypertrophic
2416 Cardiomyopathy, Valvular Heart Disease, and Arrhythmias. *Circulation.* 2011;123:216–225.
- 2417 88. Farwell DJ, Freemantle N, Sulke AN. Use of implantable loop recorders in the diagnosis
2418 and management of syncope. *Eur Heart J.* 2004;25:1257–63.
- 2419 89. Krahn AD, Klein GJ, Yee R, et al. Randomized assessment of syncope trial: conventional
2420 diagnostic testing versus a prolonged monitoring strategy. *Circulation.* 2001;104:46–51.

- 2421 90. Podoleanu C, DaCosta A, Defaye P, et al. Early use of an implantable loop recorder in
2422 syncope evaluation: a randomized study in the context of the French healthcare system
2423 (FRESH study). *Arch Cardiovasc Dis*. 2014;107:546–52.
- 2424 91. Krahn AD, Klein GJ, Yee R, et al. Final results from a pilot study with an implantable
2425 loop recorder to determine the etiology of syncope in patients with negative noninvasive and
2426 invasive testing. *American Journal of Cardiology*. 1998;82:A8–A9.
- 2427 92. Shen WK, Sheldon RS, Benditt DG, et al. 2017 ACC/AHA/HRS guideline for the
2428 evaluation and management of patients with syncope: a report of the American College of
2429 Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the
2430 Heart Rhythm Society. *Circulation*. 2017;136:e60–122.
- 2431 93. Brignole M, Vardas P, Hoffman E, Huikuri H, Moya A, Ricci R, Sulke N, Wieling W;
2432 EHRA Scientific Documents Committee, Auricchio A, Lip GY, Almendral J, Kirchhof P,
2433 Aliot E, Gasparini M, Braunschweig F; Document Reviewers, Lip GY, Almendral J, Kirchhof
2434 P, Botto GL; EHRA Scientific Documents Committee.. Indications for the use of diagnostic
2435 implantable and external ECG loop recorders. *Europace*. 2009;11:671–687
- 2436 94. Assar M, Krahn A, Klein G, Yee R, Skanes A. Optimal duration of monitoring in patients
2437 with unexplained syncope. *Am J Cardiol*. 2003;92:1231–123
- 2438 95. Farwell D, Freemantle N, Sulke N. The clinical impact of implantable loop recorders in
2439 patients with syncope. *Eur Heart J*. 2006;27:351–6.
- 2440 96. Brignole M, Sutton R, Menozzi C, Garcia-Civera R, Moya A, Wieling W, Andresen D,
2441 Benditt DG, Vardas P; International Study on Syncope of Uncertain Etiology 2 (ISSUE2)
2442 Group. Early application of an implantable loop recorder allows effective specific therapy in
2443 patients with recurrent suspected neurally mediated syncope. *Eur Heart J*. 2006;27:1085–1092.
- 2444 97. Brignole M, Menozzi C, Maggi R, Solano A, Donateo P, Bottoni N et al. The usage and
2445 diagnostic yield of the implantable loop recorder in detection of the mechanism of syncope and
2446 in guiding effective antiarrhythmic therapy in older people. *Europace*. 2005;7:273–279
- 2447 98. Krahn AD, Klein GJ, Yee R, Hoch JS, Skanes AC Cost implications of testing strategy in
2448 patients with syncope: randomized assessment of syncope trial. *J Am Coll Cardiol*. 2003 Aug
2449 6;42(3):495–501.
- 2450 99. Solano A, Menozzi C, Maggi R, Donateo P, Bottoni N, Lolli G et al. Incidence,
2451 diagnostic yield and safety of the implantable looprecorder to detect the mechanismof syncope
2452 in patients with and without structural heart disease. *Eur Heart J*. 2004; 25:1116–9.
- 2453 100. Brignole M, Vardas P, Hoffman E, Huikuri H, Moya A, Ricci R, Sulke N, Wieling
2454 W; EHRA Scientific Documents Committee, Auricchio A, Lip GY, Almendral J, Kirchhof

2455 P, Aliot E, Gasparini M, Braunschweig F; Document Reviewers, Lip GY, Almendral
2456 J, Kirchhof P, Botto GL; EHRA Scientific Documents Committee. Indications for the use
2457 of diagnostic implantable and external ECG loop recorders. *Europace*. 2009;11:671–687.

2458 101. Toshiyuki Furukawa, M.D., Ph.D., Robertomaggi, M. D. Additional Diagnostic Value of
2459 Very Prolonged Observation by Implantable Loop Recorder in Patients with Unexplained
2460 Syncope. *Journal of Cardiovascular Electrophysiology*. Vol. 23, No. 1, January 2012

2461 102. ESC, Guidelines on Management (Diagnosis and Treatment) of Syncope. The Task Force
2462 on Syncope, European Society of Cardiology. *Europace*. 2009;6:467–537.

2463 103. Zaidi A, Clough P, Cooper P, Scheepers B, Fitzpatrick AP. Misdiagnosis of epilepsy:
2464 many seizure-like attacks have a cardiovascular cause. *J Am Coll Cardiol*2000;36:181–184.

2465 104. Brignole M, Menozzi C, Moya A, Garcia-Civera R, Mont L, Alvarez M, Errazquin F,
2466 Beiras J, Bottoni N, Donateo P; International Study on Syncope of Uncertain Etiology (ISSUE)
2467 Investigators. Mechanism of syncope in patients with bundle branch block and negative
2468 electrophysiological test. *Circulation*. 2001;104:2045–2050.

2469 105. Menozzi C, Brignole M, Garcia-Civera R, Moya A, Botto G, Tercedor L, Migliorini R,
2470 Navarro X; International Study on Syncope of Uncertain Etiology (ISSUE) Investigators.
2471 Mechanism of syncope in patients with heart disease and negative electrophysiologic test.
2472 *Circulation*. 2002;105:2741–2745.

2473 106. DiMarco JP, Garan H, Ruskin JN. Approach to the patient with recurrent syncope
2474 of unknown cause. *Mod Concepts Cardiovasc Dis*. 1983;52:11–6.

2475 107. Fisher JD. Role of electrophysiologic testing in the diagnosis and treatment of patients
2476 with known and suspected bradycardias and tachycardias. *Prog Cardiovasc Dis*.
2477 1981;24:25–90.

2478 108. Gulamhusein S, Naccarelli GV, Ko PT, et al. Value and limitations of clinical
2479 electrophysiologic study in assessment of patients with unexplained syncope. *Am J Med*.
2480 1982;73:A53.

2481 109. Krol RB, Morady F, Flaker GC, et al. Electrophysiologic testing in patients with
2482 unexplained syncope: clinical and noninvasive predictors of outcome. *J Am Coll Cardiol*.
2483 1987;10:358-63.

2484 110. Denniss AR, Ross DL, Richards DA, et al. Electrophysiologic studies in patients with
2485 unexplained syncope. *Int J Cardiol*. 1992;35:211–7.

2486 111. Shen WK, Sheldon RS, Benditt DG, et al. 2017 ACC/AHA/HRS guideline for the
2487 evaluation and management of patients with syncope: a report of the American College

2488 of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the
2489 Heart Rhythm Society. *Circulation*. 2017;136:e60–122.

2490 112. Altschuler H, Fisher JD, Furman S. Significance of isolated H-V interval prolongation
2491 in symptomatic patients without documented heart block. *Am Heart J*. 1979;97:19–26.

2492 113. Fujimura O, Yee R, Klein GJ, et al. The diagnostic sensitivity of electrophysiologic
2493 testing inpatients with syncope caused by transient bradycardia. *N Engl J Med*.
2494 1989;321:1703–7.

2495 114. Strauss HC, Bigger JT Jr, Saroff AL, Giardina EG. Electrophysiologic evaluation of sinus
2496 node function in patients with sinus node dysfunction. *Circulation*. 1976;53:763–776.

2497 115. Strauss HC, Saroff AL, Bigger JT Jr, Giardina EG. Premature atrial stimulation as a key
2498 to the understanding of sinoatrial conduction in man: presentation of data and critical review
2499 of the literature. *Circulation*. 1973;47:86–93

2500 116. Breithardt G, Seipel L, Loogen F. Sinus node recovery time and calculated sinoatrial
2501 conduction time in normal subjects and patients with sinus node dysfunction. *Circulation*.
2502 1977;56:43–50.

2503 117. Gann D, Tolentino A, Samet P. Electrophysiologic evaluation of elderly patients with
2504 sinus bradycardia: a long-term follow-up study. *Ann Intern Med*. 1979;90:24–29.16, 17.

2505 118. A study of heart block in man using His bundle recordings. *Circulation*.
2506 1969;39:297–305.

2507 119. Fuster V, Ryden LE, Asinger RW et al. ACC/AHA/ESC guidelines for the management
2508 of patients with atrial fibrillation: executive summary: a report of the American College of
2509 Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European
2510 Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines and Policy Conferences (Committee
2511 to Develop Guidelines for the Management of Patients With Atrial Fibrillation) Developed in
2512 col-laboration with the North American Society of Pacing and Electrophysiology. *Circulation*.
2513 2001;104:2118–50.

2514 120. Scheinman MM, Huang S. The 1998 NASPE prospective catheter ablation registry.
2515 *Pacing Clin Electrophysiol*. 2000;23:1020–8.

2516 121. Crawford MH, Bernstein SJ, Deedwania PC et al. ACC/AHA guidelines for ambulatory
2517 electrocardiography: executive summary and recommendations, a report of the American
2518 College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines
2519 (Committee to Revise the Guidelines for Ambulatory Electrocardiography). *Circulation*.
2520 1999; 100:886–93.

- 2521 122. Page RL, Joglar JA, Caldwell MA, Calkins H, Conti JB, Deal BJ, Estes NAM 3rd, Field
2522 ME, Goldberger ZD, Hammill SC, Indik JH, Lindsay BD, Olshansky B, Russo AM, Shen
2523 WK, Tracy CM, Al-Khatib SM. 2015 ACC/AHA/HRS Guideline for the Management of Adult
2524 Patients With Supraventricular Tachycardia Circulation. 133: e506–e5746, 7, 12.
- 2525 123. Jackson LR 2nd, Rathakrishnan B, Campbell K, et al. Sinus node dysfunction and atrial
2526 fibrillation: a reversible phenomenon? Pacing Clin Electrophysiol. 2017;40:442–50.
- 2527 124. Aghamohammadi H, Mehrabi S, Mohammad Ali Beigi F. Prevention of bradycardia by
2528 atropine sulfate during urological laparoscopic surgery: a randomized controlled trial. Urol J.
2529 2009;6:92–5.
- 2530 125. Grmec S, Strnad M, Podgorsek D. Comparison of the characteristics and outcome among
2531 patients suffering from out-of-hospital primary cardiac arrest and drowning victims in cardiac
2532 arrest. Int J Emerg Med. 2009;2:7–12.
- 2533 126. Cunha BA. The diagnostic significance of relative bradycardia in infectious disease. Clin
2534 Microbiol Infect. 2000;6:633–4.
- 2535 127. Herman SC, Zhou J. Isoproterenol infusion for treatment of refractory symptomatic
2536 bradycardia in parturients with congenital complete heart block. Int J Obstet Anesth.
2537 2011;20:361-3; author reply 3.
- 2538 128. Mandel WJ, Hayakawa H, Allen HN, et al. Assessment of sinus node function in patients
2539 with the sick sinus syndrome. Circulation. 1972;46:761–9.
- 2540 129. Ogawa H, Inoue T, Miwa S, et al. Heart rate responses to autonomic drugs in sick sinus
2541 syndrome--correlation with syncope and electrophysiologic data. Jpn Circ J. 1991;55:15–23.
- 2542 130. Sodeck GH, Domanovits H, Meron G, et al. Compromising bradycardia: management in
2543 the emergency department. Resuscitation. 2007;73:96–102.
- 2544 131. Strauss HC, Bigger JT, Saroff AL, et al. Electrophysiologic evaluation of sinus node
2545 function in patients with sinus node dysfunction. Circulation. 1976;53:763–76.
- 2546 132. Morrison LJ, Long J, Vermeulen M, et al. A randomized controlled feasibility trial
2547 comparing safety and effectiveness of prehospital pacing versus conventional treatment:
2548 «PrePACE». Resuscitation. 2008;76:341–9.
- 2549 133. Bernheim A, Fatio R, Kiowski W, et al. Atropine often results in complete
2550 atrioventricular block or sinus arrest after cardiac transplantation: an unpredictable and dose-
2551 independent phenomenon. Transplantation. 2004;77:1181–5.
- 2552 134. Link MS, Berkow LC, Kudenchuk PJ, et al. Part 7: adult advanced cardiovascular life
2553 support: 2015 American Heart Association guidelines update for cardiopulmonary resuscitation
2554 and emergency cardiovascular care. Circulation. 2015;132:S444–64.

- 2555 135. Dhingra RC, Deedwania PC, Cummings JM, et al. Electrophysiologic effects of lidocaine
2556 on sinus node and atrium in patients with and without sinoatrial dysfunction. *Circulation*.
2557 1978;57:448–54.
- 2558 136. Meyer EC, Sommers DK, Schoeman HS, et al. The effect of atropine on heart-rate:
2559 a comparison between two ethnic groups. *Br J Clin Pharmacol*. 1988;25:776–7.
- 2560 137. Brady WJ, Swart G, DeBehnke DJ, et al. The efficacy of atropine in the treatment
2561 of hemodynamically unstable bradycardia and atrioventricular block: prehospital and
2562 emergency department considerations. *Resuscitation*. 1999;41:47–55.
- 2563 138. Feigl D, Ashkenazy J, Kishon Y. Early and late atrioventricular block in acute inferior
2564 myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol*. 1984;4:35–8.
- 2565 139. Sodeck GH, Domanovits H, Meron G, et al. Compromising bradycardia: management in
2566 the emergency department. *Resuscitation*. 2007;73:96–102.
- 2567 140. Chihrin SM, Mohamed U, Yee R, et al. Utility of isoproterenol in unmasking latent
2568 escape rhythm in pacemaker dependent patients undergoing pacemaker replacement. *Am J*
2569 *Cardiol*. 2008;101:631–3. S6.3.2–5.
- 2570 141. Dhingra RC, Winslow E, Pouget JM, et al. The effect of isoproterenol on
2571 atrioventricular and intraventricular conduction. *Am J Cardiol*. 1973;32:629–36.
- 2572 142. Hatle L, Rokseth R. Conservative treatment of AV block in acute myocardial infarction.
2573 Results in 105 consecutive patients. *Br Heart J*. 1971;33:595–600.
- 2574 143. Morrison LJ, Long J, Vermeulen M, et al. A randomized controlled feasibility trial
2575 comparing safety and effectiveness of prehospital pacing versus conventional treatment:
2576 «PrePACE». *Resuscitation*. 2008;76:341–9.
- 2577 144. Hedges JR, Feero S, Shultz B, et al. Prehospital transcutaneous cardiac pacing for
2578 symptomatic bradycardia. *Pacing Clin Electrophysiol*. 1991;14:1473–8.
- 2579 145. Gallagher JJ, Smith WM, Kerr CR, et al. Esophageal pacing: a diagnostic and therapeutic
2580 tool. *Circulation*. 1982;65:336–41.
- 2581 146. Smith I, Monk TG, White PF. Comparison of transesophageal atrial pacing with
2582 anticholinergic drugs for the treatment of intraoperative bradycardia. *Anesth Analg*.
2583 1994;78:245–52.
- 2584 147. López Ayerbe J, VilluendasSabaté R, García García C, et al. Temporary pacemakers:
2585 current use and complications. *Revista Española de Cardiología (Engl Ed)*. 2004;57:1045–52.
- 2586 148. Ferguson JD, Banning AP, Bashir Y. Randomised trial of temporary cardiac pacing with
2587 emirigid and balloon-flotation electrode catheters. *Lancet*. 1997;349:1883.

- 2588 149. Austin JL, Preis LK, Crampton RS, et al. Analysis of pacemaker malfunction and
2589 complications of temporary pacing in the coronary care unit. *Am J Cardiol.* 1982;49:301–6.
- 2590 150. Betts TR. Regional survey of temporary transvenous pacing procedures and
2591 complications. *Postgrad Med J.* 2003;79:463–5.
- 2592 151. Bjornstad CC, Gjertsen E, Thorup F, et al. Temporary cardiac pacemaker treatment
2593 in five Norwegian regional hospitals. *Scand Cardiovasc J.* 2012;46:137–43.
- 2594 152. Garcia Guerrero JJ, Fernandez de la Concha Castaneda J, Lopez Quero D, et al. Lower
2595 incidence of venous thrombosis with temporary active-fixation lead implantation in mobile
2596 patients. *Europace.* 2010;12:1604–7.
- 2597 153. Hynes JK, Holmes DR Jr, Harrison CE. Five-year experience with temporary pacemaker
2598 therapy in the coronary care unit. *Mayo Clin Proc.* 1983;58:122–6.
- 2599 154. Jou YL, Hsu HP, Tuan TC, et al. Trends of temporary pacemaker implant and underlying
2600 disease substrate. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2010;33:1475–84.
- 2601 155. Jowett NI, Thompson DR, Pohl JE. Temporary transvenous cardiac pacing: 6 years
2602 experience in one coronary care unit. *Postgrad Med J.* 1989;65:211–5.
- 2603 156. McCann P. A review of temporary cardiac pacing wires. *Indian Pacing Electrophysiol J.*
2604 2007;7:40–9.
- 2605 157. Muñoz Bono J, Prieto Palomino MA, Macías Guarasa I, et al. Efficacy and safety
2606 of nonpermanent transvenous pacemaker implantation in an intensive care unit. *Medicina*
2607 *Intensiva (Engl Ed).* 2011;35:410–6.
- 2608 158. Nolewajka AJ, Goddard MD, Brown TC. Temporary transvenous pacing and femoral
2609 vein thrombosis. *Circulation.* 1980;62:646–50.
- 2610 159. Sodeck GH, Domanovits H, Meron G, et al. Compromising bradycardia: management in
2611 the emergency department. *Resuscitation.* 2007;73:96–102.
- 2612 160. Weinstein J, Gnoj J, Mazzara JT, et al. Temporary transvenous pacing via the
2613 percutaneous femoral vein approach. A prospective study of 100 cases. *Am Heart J.*
2614 1973;85:695–705.
- 2615 161. Bektas F, Soyuncu S. The efficacy of transcutaneous cardiac pacing in ED. *Am J Emerg*
2616 *Med.* 2016;34:2090–3.
- 2617 162. Clinton JE, Zoll PM, Zoll R, et al. Emergency noninvasive external cardiac pacing.
2618 *J Emerg Med.* 1985;2:155–62.
- 2619 163. Morrison LJ, Long J, Vermeulen M, et al. A randomized controlled feasibility trial
2620 comparing safety and effectiveness of prehospital pacing versus conventional treatment:
2621 «PrePACE». *Resuscitation.* 2008;76:341–9.

- 2622 164. Sherbino J, Verbeek PR, MacDonald RD, et al. Prehospital transcutaneous cardiac pacing
2623 for symptomatic bradycardia or bradyasystolic cardiac arrest: a systematic review.
2624 Resuscitation. 2006;70:193–200.
- 2625 165. Zoll PM, Zoll RH, Falk RH, et al. External noninvasive temporary cardiac pacing:
2626 clinical trials. *Circulation*. 1985;71:937–44.
- 2627 166. Murphy JJ. Current practice and complications of temporary transvenous cardiac pacing.
2628 *BMJ*. 1996;312:1134.
- 2629 167. Epstein AE, DiMarco JP, Ellenbogen KA, et al. ACC/AHA/HRS 2008 guidelines for
2630 devicebased therapy of cardiac rhythm abnormalities: a report of the American College of
2631 Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing
2632 Committee to Revise the ACC/AHA/NASPE 2002 Guideline Update for Implantation
2633 of Cardiac Pacemakers and Antiarrhythmia Devices). Developed in collaboration with the
2634 American Association for Thoracic Surgery and Society of Thoracic Surgeons. *Circulation*.
2635 2008;117:e350–408.
- 2636 168. Silver MD, Goldschlager N. Temporary transvenous cardiac pacing in the critical care
2637 setting. *Chest*. 1988;93:607–13.
- 2638 169. McLeod AA, Jokhi PP. Pacemaker induced ventricular fibrillation in coronary care units.
2639 *BMJ*. 2004;328:1249–50.
- 2640 170. Braun MU, Rauwolf T, Bock M, et al. Percutaneous lead implantation connected
2641 to an external device in stimulation-dependent patients with systemic infection--a prospective
2642 and controlled study. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2006;29:875–9.
- 2643 171. Bjornstad CC, Gjertsen E, Thorup F, et al. Temporary cardiac pacemaker treatment
2644 in five Norwegian regional hospitals. *Scand Cardiovasc J*. 2012;46:137–43.
- 2645 172. Murphy JJ. Current practice and complications of temporary transvenous cardiac pacing.
2646 *BMJ*. 1996;312:1134.
- 2647 173. Betts TR. Regional survey of temporary transvenous pacing procedures and
2648 complications. *Postgrad Med J*. 2003;79:463–5.
- 2649 174. Hynes JK, Holmes DR Jr, Harrison CE. Five-year experience with temporary pacemaker
2650 therapy in the coronary care unit. *Mayo Clin Proc*. 1983;58:122–6.
- 2651 175. López Ayerbe J, VilluendasSabaté R, García García C, et al. Temporary pacemakers:
2652 current use and complications. *Revista Española de Cardiología (Engl Ed)*. 2004;57:1045–52.
- 2653 176. Ferguson JD, Banning AP, Bashir Y. Randomised trial of temporary cardiac pacing with
2654 semirigid and balloon-flotation electrode catheters. *Lancet*. 1997;349:1883.

- 2655 177. Lang R, David D, Klein HO, et al. The use of the balloon-tipped floating catheter
2656 in temporary transvenous cardiac pacing. *Pacing Clin Electrophysiol.* 1981;4:491–6.
- 2657 178. Braun MU, Rauwolf T, Bock M, et al. Percutaneous lead implantation connected
2658 to an external device in stimulation-dependent patients with systemic infection — a prospective
2659 and controlled study. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2006;29:875–9.
- 2660 179. Chihrin SM, Mohammed U, Yee R, et al. Utility and cost effectiveness of temporary
2661 pacing using active fixation leads and an externally placed reusable permanent pacemaker.
2662 *Am J Cardiol.* 2006;98:1613–5.
- 2663 180. De Cock CC, Van Campen CM, In't Veld JA, et al. Utility and safety of prolonged
2664 temporary transvenous pacing using an active-fixation lead: comparison with a conventional
2665 lead. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2003;26:1245–8.
- 2666 181. Kawata H, Pretorius V, Phan H, et al. Utility and safety of temporary pacing using active
2667 fixation leads and externalized re-usable permanent pacemakers after lead extraction. *Europace.*
2668 2013;15:1287–91.
- 2669 182. Kornberger A, Schmid E, Kalender G, et al. Bridge to recovery or permanent system
2670 implantation: an eight-year single-center experience in transvenous semipermanent pacing.
2671 *Pacing Clin Electrophysiol.* 2013;36:1096–103.
- 2672 183. Lever N, Ferguson JD, Bashir Y, et al. Prolonged temporary cardiac pacing using
2673 subcutaneous tunnelled active-fixation permanent pacing leads. *Heart.* 2003;89:209–10.
- 2674 184. Zei PC, Eckart RE, Epstein LM. Modified temporary cardiac pacing using transvenous
2675 active fixation leads and external re-sterilized pulse generators. *J Am Coll Cardiol.*
2676 2006;47:1487–9.
- 2677 185. Hwang YM, Kim CM, Moon KW. Periprocedural temporary pacing in primary
2678 percutaneous coronary intervention for patients with acute inferior myocardial infarction.
2679 *Clin Interv Aging.* 2016;11:287–92.
- 2680 186. Bocka JJ. External transcutaneous pacemakers. *Ann Emerg Med.* 1989;18:1280–6.
2681 (S6.3.3–21/S6.3.3–22).
- 2682 187. Sharma AD, Rizo-Patron C, Hallstrom AP, et al. Percent right ventricular pacing predicts
2683 outcomes in the DAVID trial. *Heart Rhythm.* 2005;2:830–4.
- 2684 188. Sweeney MO, Prinzen FW. A new paradigm for physiologic ventricular pacing.
2685 *J Am Coll Cardiol.* 2006;47:282–8.
- 2686 189. Alboni P, Menozzi C, Brignole M, et al. Effects of permanent pacemaker and oral
2687 theophylline in sick sinus syndrome the THEOPACE study: a randomized controlled trial.
2688 *Circulation.* 1997;96:260–6.

- 2689 190. Saito D, Matsubara K, Yamanari H, et al. Effects of oral theophylline on sick sinus
2690 syndrome. *J Am Coll Cardiol.* 1993;21:1199–204.
- 2691 191. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2016 ACC/AHA/HFSA focused update on new
2692 pharmacological therapy for heart failure: an update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the
2693 management of heart failure: a report of the American College of Cardiology/American Heart
2694 Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Failure Society
2695 of America. *Circulation.* 2016;134:e282–93.
- 2696 192. Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the management
2697 of heart failure: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart
2698 Association Task Force on Practice Guidelines. *Circulation.* 2013;128:e240–327.
- 2699 193. Jackson LR 2nd, Rathakrishnan B, Campbell K, et al. Sinus node dysfunction and atrial
2700 fibrillation: a reversible phenomenon? *Pacing Clin Electrophysiol.* 2017;40:442–50.
- 2701 194. Dhingra RC, Denes P, Wu D, et al. The significance of second degree atrioventricular
2702 block and bundle branch block. Observations regarding site and type of block. *Circulation.*
2703 1974;49:638–46.
- 2704 195. Ector H, Rolies L, De Geest H. Dynamic electrocardiography and ventricular pauses
2705 of 3 seconds and more: etiology and therapeutic implications. *Pacing Clin Electrophysiol.*
2706 1983;6:548–51.
- 2707 196. Edhag O, Swahn A. Prognosis of patients with complete heart block or arrhythmic
2708 syncope who were not treated with artificial pacemakers. A long-term follow-up study
2709 of 101 patients. *Acta Med Scand.* 1976;200:457–63.
- 2710 197. Shaw DB, Eraut D. Prevalence and morbidity of heart block in Devon. *Br Med J.*
2711 1970;1:144–7.
- 2712 198. Shaw DB, Kekwick CA, Veale D, et al. Survival in second degree atrioventricular block.
2713 *Br Heart J.* 1985;53:587–93.
- 2714 199. Simon AB, Zloto AE. Atrioventricular block: natural history after permanent ventricular
2715 pacing. *Am J Cardiol.* 1978;41:500–7.
- 2716 200. Strasberg B, Amat YLF, Dhingra RC, et al. Natural history of chronic second-degree
2717 atrioventricular nodal block. *Circulation.* 1981;63:1043–9.
- 2718 201. Bhakta D, Shen C, Kron J, et al. Pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator use
2719 in a US myotonic dystrophy type 1 population. *J Cardiovasc Electrophysiol.* 2011;22:1369–75.
- 2720 202. Facenda-Lorenzo M, Hernandez-Afonso J, Rodriguez-Esteban M, et al. Cardiac
2721 manifestations in myotonic dystrophy type 1 patients followed using a standard protocol
2722 in a specialized unit. *Rev Esp Cardiol (Engl Ed).* 2013;66:193–7.

- 2723 203. Groh WJ. Arrhythmias in the muscular dystrophies. *Heart Rhythm*. 2012;9:1890–5.
- 2724 204. Groh WJ, Groh MR, Saha C, et al. Electrocardiographic abnormalities and sudden death
2725 in myotonic dystrophy type 1. *N Engl J Med*. 2008;358:2688–97.
- 2726 205. Ha AH, Tarnopolsky MA, Bergstra TG, et al. Predictors of atrio-ventricular conduction
2727 disease, long-term outcomes in patients with myotonic dystrophy types I and II. *Pacing Clin*
2728 *Electrophysiol*. 2012;35:1262–9.
- 2729 206. Kabunga P, Lau AK, Phan K, et al. Systematic review of cardiac electrical disease
2730 in Kearns- Sayre syndrome and mitochondrial cytopathy. *Int J Cardiol*. 2015;181:303–10.
- 2731 207. Lazarus A, Varin J, Babuty D, et al. Long-term follow-up of arrhythmias in patients with
2732 myotonic dystrophy treated by pacing: a multicenter diagnostic pacemaker study. *J Am Coll*
2733 *Cardiol*. 2002;40:1645–52.
- 2734 208. Wahbi K, Meune C, Porcher R, et al. Electrophysiological study with prophylactic pacing
2735 and survival in adults with myotonic dystrophy and conduction system disease. *JAMA*.
2736 2012;307:1292–301.
- 2737 209. Hilgard J, Ezri MD, Denes P. Significance of ventricular pauses of three seconds or more
2738 detected on twenty-four-hour Holter recordings. *Am J Cardiol*. 1985;55:1005–8.
- 2739 210. Saxon LA, Albert BH, Uretz EF, et al. Permanent pacemaker placement in chronic atrial
2740 fibrillation associated with intermittent AV block and cerebral symptoms. *Pacing Clin*
2741 *Electrophysiol*. 1990;13:724–9.
- 2742 211. O’Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al. 2013 ACCF/AHA guideline for the
2743 management of ST-elevation myocardial infarction: a report of the American College of
2744 Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines.
2745 *Circulation*. 2013;127:e362–425.
- 2746 212. Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, et al. 2014 AHA/ACC guideline for the
2747 management of patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: a report of the
2748 American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice
2749 Guidelines. *Circulation*. 2014;130:e344–426.
- 2750 213. Rationale, design and organization of the Second Chinese Cardiac Study (CCS-2):
2751 a randomized trial of clopidogrel plus aspirin, and of metoprolol, among patients with
2752 suspected acute myocardial infarction. Second Chinese Cardiac Study (CCS-2) Collaborative
2753 Group. *J Cardiovasc Risk*. 2000;7:435–41.
- 2754 214. Packer M, Coats AJ, Fowler MB, et al. Effect of carvedilol on survival in severe chronic
2755 heart failure. *N Engl J Med*. 2001;344:1651–8.

- 2756 215. Dargie HJ. Design and methodology of the CAPRICORN trial — a randomised double
2757 blind placebo controlled study of the impact of carvedilol on morbidity and mortality in
2758 patients with left ventricular dysfunction after myocardial infarction. *Eur J Heart Fail.*
2759 2000;2:325–32.
- 2760 216. Sweeney MO, Hellkamp AS, Ellenbogen KA, et al. Adverse effect of ventricular pacing
2761 on heart failure and atrial fibrillation among patients with normal baseline QRS duration in
2762 a clinical trial of pacemaker therapy for sinus node dysfunction. *Circulation.* 2003;107:2932–7.
- 2763 217. Kiehl EL, Makki T, Kumar R, et al. Incidence and predictors of right ventricular
2764 pacing-induced cardiomyopathy in patients with complete atrioventricular block and preserved
2765 left ventricular systolic function. *Heart Rhythm.* 2016;13:2272–8.
- 2766 218. Kato Y, Morimoto S, Uemura A, et al. Efficacy of corticosteroids in sarcoidosis
2767 presenting with atrioventricular block. *Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis.* 2003;20:133–7.
- 2768 219. Reisinger J, Dubrey SW, Lavalley M, et al. Electrophysiologic abnormalities in AL
2769 (primary) amyloidosis with cardiac involvement. *J Am Coll Cardiol.* 1997;30:1046–51.
- 2770 220. Sadek MM, Yung D, Birnie DH, et al. Corticosteroid therapy for cardiac sarcoidosis:
2771 a systematic review. *Can J Cardiol.* 2013;29:1034–41.
- 2772 221. Sayed RH, Rogers D, Khan F, et al. A study of implanted cardiac rhythm recorders in
2773 advanced cardiac AL amyloidosis. *Eur Heart J.* 2015;36:1098–105.
- 2774 222. Takaya Y, Kusano KF, Nakamura K, et al. Outcomes in patients with high-degree
2775 atrioventricular block as the initial manifestation of cardiac sarcoidosis. *Am J Cardiol.*
2776 2015;115:505–9.
- 2777 223. Zhou Y, Lower EE, Li HP, et al. Cardiac sarcoidosis: the impact of age and implanted
2778 devices on survival. *Chest.* 2017;151:139–48.
- 2779 224. Arbustini E, Pilotto A, Repetto A, et al. Autosomal dominant dilated cardiomyopathy
2780 with atrioventricular block: a lamin A/C defect-related disease. *J Am Coll Cardiol.*
2781 2002;39:981–90.
- 2782 225. Anselme F, Moubarak G, Savoure A, et al. Implantable cardioverter-defibrillators in
2783 lamin A/C mutation carriers with cardiac conduction disorders. *HeartRhythm.* 2013;10:1492–8.
- 2784 226. Scheinman MM, Peters RW, Suave MJ, et al. Value of the H-Q interval in patients with
2785 bundle branch block and the role of prophylactic permanent pacing. *Am J Cardiol.*
2786 1982;50:1316–22.
- 2787 227. Morady F, Higgins J, Peters RW, et al. Electrophysiologic testing in bundle branch block
2788 and unexplained syncope. *Am J Cardiol.* 1984;54:587–91.

- 2789 228. Kubis M, Svejda J. Indication of permanent pacing after acute myocardial infarction
2790 complicated by combined intraventricular block. *Cor Vasa*. 1982;24:295–301.
- 2791 229. Witt CM, Wu G, Yang D, et al. Outcomes with left bundle branch block and mildly
2792 to moderately reduced left ventricular function. *JACC Heart Fail*. 2016;4:897–903.
- 2793 230. Chung ES, Katra RP, Ghio S, et al. Cardiac resynchronization therapy may benefit
2794 patients with left ventricular ejection fraction >35%: a PROSPECT trial substudy. *Eur J Heart*
2795 *Fail*. 2010;12:581–7.
- 2796 231. Peters RW, Scheinman MM, Modin C, et al. Prophylactic permanent pacemakers
2797 for patients with chronic bundle branch block. *Am J Med*. 1979;66:978–85.
- 2798 232. DePasquale NP, Bruno MS. Natural history of combined right bundle branch block and
2799 left anterior hemiblock (bilateral bundle branch block). *Am J Med*. 1973;54:297–303.
- 2800 233. Gadler F, Valzania C, Linde C. Current use of implantable electrical devices in Sweden:
2801 data from the Swedish pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator registry. *Europace*.
2802 2015;17:69–77.
- 2803 234. Armaganijan LV, Toff WD, Nielsen JC, et al. Are elderly patients at increased risk
2804 of complications following pacemaker implantation? A meta-analysis of randomized trials.
2805 *Pacing Clin Electrophysiol*. 2012;35:131–4.
- 2806 235. Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Wilkoff BL, et al. 2017 HRS expert consensus statement
2807 on cardiovascular implantable electronic device lead management and extraction. *Heart*
2808 *Rhythm*. 2017;14:e503–51.
- 2809 236. Lee JZ, Ling J, Diehl NN, et al. Mortality and cerebrovascular events after heart rhythm
2810 disorder management procedures. *Circulation*. 2018;137:24–33.
- 2811 237. Bougioukas I, Jebran AF, Grossmann M, et al. Is there a correlation between late
2812 reexploration after cardiac surgery and removal of epicardial pacemaker wires? *J Cardiothorac*
2813 *Surg*. 2017;12:3.
- 2814 238. Gordon RS, Ivanov J, Cohen G, et al. Permanent cardiac pacing after a cardiac operation:
2815 predicting the use of permanent pacemakers. *AnnThoracSurg*. 1998;66:1698–704
- 2816 239. Caspi Y, Safadi T, Ammar R, et al. The significance of bundle branch block
2817 in the immediate postoperative electrocardiograms of patients undergoing coronary artery
2818 bypass. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 1987;93:442–6.
- 2819 240. Cook DJ, Bailon JM, Douglas TT, et al. Changing incidence, type, and natural history
2820 of conduction defects after coronary artery bypass grafting. *Ann Thorac Surg*. 2005;80:1732–7.
- 2821 241. Mackstaller LL, Alpert JS. Atrial fibrillation: a review of mechanism, etiology, and
2822 therapy. *Clin Cardiol*. 1997;20:640–50.

2823 242. Ngaage DL, Schaff HV, Mullany CJ, et al. Does preoperative atrial fibrillation influence
2824 early and late outcomes of coronary artery bypass grafting? *J Thorac Cardiovasc Surg.*
2825 2007;133:182–9.

2826 243. Puskas JD, Sharoni E, Williams WH, et al. Is routine use of temporary epicardial pacing
2827 wires necessary after either OPCAB or conventional CABG/CPB? *Heart Surg Forum.*
2828 2003;6:E103–6.

2829 244. Satinsky JD, Collins JJ Jr, Dalen JE. Conduction defects after cardiac surgery.
2830 *Circulation.* 1974;50:1170–4.

2831 245. Tuzcu EM, Emre A, Goormastic M, et al. Incidence and prognostic significance
2832 of intraventricular conduction abnormalities after coronary bypass surgery. *J Am Coll Cardiol.*
2833 1990;16:607–10.

2834 246. Yesil M, Bayata S, Arikan E, et al. Should we revascularize before implanting
2835 a pacemaker? *Clin Cardiol.* 2008;31:498–501.

2836 247. Zeldis SM, Morganroth J, Horowitz LN, et al. Fascicular conduction disturbances after
2837 coronary bypass surgery. *Am J Cardiol.* 1978;41:860–4.

2838 248. Bethea BT, Salazar JD, Grega MA, et al. Determining the utility of temporary pacing
2839 wires after coronary artery bypass surgery. *Ann Thorac Surg.* 2005;79:104–7.

2840 249. Bougioukas I, Jebran AF, Grossmann M, et al. Is there a correlation between late
2841 reexploration after cardiac surgery and removal of epicardial pacemaker wires?
2842 *J Cardiothorac Surg.* 2017;12:3.

2843 250. Caspi Y, Safadi T, Ammar R, et al. The significance of bundle branch block in the
2844 immediate postoperative electrocardiograms of patients undergoing coronary artery bypass.
2845 *J Thorac Cardiovasc Surg.* 1987;93:442–6.

2846 251. Cook DJ, Bailon JM, Douglas TT, et al. Changing incidence, type, and natural history
2847 of conduction defects after coronary artery bypass grafting. *Ann Thorac Surg.* 2005;80:1732–7.

2848 252. Mackstaller LL, Alpert JS. Atrial fibrillation: a review of mechanism, etiology, and
2849 therapy. *Clin Cardiol.* 1997;20:640–50.

2850 253. Ngaage DL, Schaff HV, Mullany CJ, et al. Does preoperative atrial fibrillation influence
2851 early and late outcomes of coronary artery bypass grafting? *J Thorac Cardiovasc Surg.*
2852 2007;133:182–9.

2853 254. Gammie JS, Haddad M, Milford-Beland S, et al. Atrial fibrillation correction surgery:
2854 lessons from the Society of Thoracic Surgeons National Cardiac Database. *Ann Thorac Surg.*
2855 2008;85:909–14.

- 2856 255. Gillinov AM, Gelijns AC, Parides MK, et al. Surgical ablation of atrial fibrillation during
2857 mitral-valve surgery. *N Engl J Med*. 2015;372:1399–409.
- 2858 256. Phan K, Xie A, La Meir M, et al. Surgical ablation for treatment of atrial fibrillation
2859 in cardiac surgery: a cumulative meta-analysis of randomised controlled trials. *Heart*.
2860 2014;100:722–30.
- 2861 257. Saint LL, Damiano RJ Jr, Cuculich PS, et al. Incremental risk of the Cox-maze IV
2862 procedure for patients with atrial fibrillation undergoing mitral valve surgery. *J Thorac*
2863 *Cardiovasc Surg*. 2013;146:1072–7.
- 2864 258. Lee R, McCarthy PM, Wang EC, et al. Midterm survival in patients treated for atrial
2865 fibrillation: a propensity-matched comparison to patients without a history of atrial fibrillation.
2866 *J Thorac Cardiovasc Surg*. 2012;143:1341–51; discussion 50–1.
- 2867 259. Ad N, Suri RM, Gammie JS, et al. Surgical ablation of atrial fibrillation trends and
2868 outcomes in North America. *J Thorac Cardiovasc Surg*. 2012;144:1051–60.
- 2869 260. Bagur R, Manazzoni JM, Dumont É, et al. Permanent pacemaker implantation following
2870 isolated aortic valve replacement in a large cohort of elderly patients with severe aortic
2871 stenosis. *Heart*. 2011;97:1687–94.
- 2872 261. Dawkins S, Hobson AR, Kalra PR, et al. Permanent pacemaker implantation after
2873 isolated aortic valve replacement: incidence, indications, and predictors. *Ann Thorac Surg*.
2874 2008;85:108–12.
- 2875 262. Limongelli G, Ducceschi V, D’Andrea A, et al. Risk factors for pacemaker implantation
2876 following aortic valve replacement: a single centre experience. *Heart*. 2003;89:901–4.
- 2877 263. Bagur R, Manazzoni JM, Dumont É, et al. Permanent pacemaker implantation following
2878 isolated aortic valve replacement in a large cohort of elderly patients with severe aortic
2879 stenosis. *Heart*. 2011;97:1687–94.
- 2880 264. Dawkins S, Hobson AR, Kalra PR, et al. Permanent pacemaker implantation after
2881 isolated aortic valve replacement: incidence, indications, and predictors. *Ann Thorac Surg*.
2882 2008;85:108–12.
- 2883 265. Limongelli G, Ducceschi V, D’Andrea A, et al. Risk factors for pacemaker implantation
2884 following aortic valve replacement: a single centre experience. *Heart*. 2003;89:901–4.
- 2885 266. Baraki H, Al Ahmad A, Jeng-Singh S, et al. Pacemaker dependency after isolated aortic
2886 valve replacement: do conductance disorders recover over time? *Interact Cardiovasc Thorac*
2887 *Surg*. 2013;16:476–81.
- 2888 267. Greason KL, Lahr BD, Stulak JM, et al. Long-Term Mortality Effect of Early Pacemaker
2889 Implantation After Surgical Aortic Valve Replacement. *Ann Thorac Surg*. 2017;104:1259–64.

2890 268. Schurr UP, Berli J, Berdajs D, et al. Incidence and risk factors for pacemaker
2891 implantation following aortic valve replacement. *InteractCardiovascThoracSurg.*
2892 2010;11:556–60.

2893 269. Berdajs D, Schurr UP, Wagner A, et al. Incidence and pathophysiology
2894 of atrioventricular block following mitral valve replacement and ring annuloplasty.
2895 *Eur J Cardiothorac Surg.* 2008;34:55–61.

2896 270. Goldstein D, Moskowitz AJ, Gelijns AC, et al. Two-year outcomes of surgical treatment
2897 of severe ischemic mitral regurgitation. *N Engl J Med.* 2016;374:344–53.

2898 271. Levin R, Leacche M, Petracek MR, et al. Extending the use of the pacing pulmonary
2899 artery catheter for safe minimally invasive cardiac surgery. *J Cardiothor Vasc Anesthes.*
2900 2010;24:568–73.

2901 272. Brubaker P.H. and Kitzman D. W. Chronotropic Incompetence : Causes, Consequences,
2902 and Management. *Circulation.* 2011;123:1010-1020

2903 273. Christoph Melzer and Henryk Dreger. Chronotropic incompetence: a never-ending story.
2904 *Europace* (2010) 12, 464–465.

2905 274. E. Adornato, E.M.F. Adornato. Chronotropic Incompetence: How to Diagnose and Treat
2906 It? *Cardiac Arrhythmias.* 1997, 479-484.

2907 275. Chikwe J, Itagaki S, Anyanwu A, et al. Impact of concomitant tricuspid annuloplasty on
2908 tricuspid regurgitation, right ventricular function, and pulmonary artery hypertension after
2909 repair of mitral valve prolapse. *J Am Coll Cardiol.* 2015;65:1931–8.

2910 276. Jokinen JJ, Turpeinen AK, Pitkanen O, et al. Pacemaker therapy after tricuspid valve
2911 operations: implications on mortality, morbidity, and quality of life. *Ann Thorac Surg.*
2912 2009;87:1806–14.

2913 277. McCarthy PM, Bhudia SK, Rajeswaran J, et al. Tricuspid valve repair: durability and risk
2914 factors for failure. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 2004;127:674–85.

2915 278. Scully HE, Armstrong CS. Tricuspid valve replacement. Fifteen years of experience with
2916 mechanical prostheses and bioprostheses. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 1995;109:1035–41.

2917 279. De Cock CC, Vinkers M, Van Campe LC, et al. Long-term outcome of patients with
2918 multiple (> or = 3) noninfected transvenous leads: a clinical and echocardiographic study.
2919 *Pacing Clin Electrophysiol.* 2000;23:423–6.

2920 280. Piazza N, Onuma Y, Jesserun E, et al. Early and persistent intraventricular conduction
2921 abnormalities and requirements for pacemaking after percutaneous replacement of the aortic
2922 valve. *JACC Cardiovasc Interv.* 2008;1:310–6.

- 2923 281. Siontis GC, Juni P, Pilgrim T, et al. Predictors of permanent pacemaker implantation
2924 in patients with severe aortic stenosis undergoing TAVR: a meta-analysis. *J Am Coll Cardiol.*
2925 2014;64:129–40.
- 2926 282. Boerlage-Van Dijk K, Kooiman KM, Yong ZY, et al. Predictors and permanency
2927 of cardiac conduction disorders and necessity of pacing after transcatheter aortic valve
2928 implantation. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2014;37:1520–9.
- 2929 283. Regueiro A, Abdul-Jawad Altisent O, Del Trigo M, et al. Impact of new-onset left bundle
2930 branch block and periprocedural permanent pacemaker implantation on clinical outcomes in
2931 patients undergoing transcatheter aortic valve replacement: a systematic review and meta-
2932 analysis. *Circ Cardiovasc Interv.* 2016;9:e003635.
- 2933 284. Watanabe Y, Kozuma K, Hioki H, et al. Pre-existing right bundle branch block increases
2934 risk for death after transcatheter aortic valve replacement with a balloon-expandable valve.
2935 *JACC Cardiovasc Interv.* 2016;9:2210–6.
- 2936 285. Egger F, Nurnberg M, Rohla M, et al. High-degree atrioventricular block in patients with
2937 preexisting bundle branch block or bundle branch block occurring during transcatheter aortic
2938 valve implantation. *Heart Rhythm.* 2014;11:2176–82.
- 2939 286. Roten L, Wenaweser P, Delacretaz E, et al. Incidence and predictors of atrioventricular
2940 conduction impairment after transcatheter aortic valve implantation. *Am J Cardiol.*
2941 2010;106:1473–80.
- 2942 287. Nazif TM, Dizon JM, Hahn RT, et al. Predictors and clinical outcomes of permanent
2943 pacemaker implantation after transcatheter aortic valve replacement: the PARTNER
2944 (Placement of AoRticTraNscathetER Valves) trial and registry. *JACC Cardiovasc Interv.*
2945 2015;8:60–9.
- 2946 288. Urena M, Mok M, Serra V, et al. Predictive factors and long-term clinical consequences
2947 of persistent left bundle branch block following transcatheter aortic valve implantation with
2948 a balloon-expandable valve. *J Am Coll Cardiol.* 2012;60:1743–52.
- 2949 289. Testa L, Latib A, De Marco F, et al. Clinical impact of persistent left bundle-branch block
2950 after transcatheter aortic valve implantation with CoreValveRevalving System. *Circulation.*
2951 2013;127:1300–7.
- 2952 290. Franzoni I, Latib A, Maisano F, et al. Comparison of incidence and predictors of left
2953 bundle branch block after transcatheter aortic valve implantation using the CoreValve versus
2954 the Edwards valve. *Am J Cardiol.* 2013;112:554–9.

- 2955 291. Toggweiler S, Stortecky S, Holy E, et al. The electrocardiogram after transcatheter aortic
2956 valve replacement determines the risk for post-procedural high-degree AV block and the need
2957 for telemetry monitoring. *JACC Cardiovasc Interv.* 2016;9:1269–76.
- 2958 292. Van der Boon RM, Van Mieghem NM, Theuns DA, et al. Pacemaker dependency after
2959 transcatheter aortic valve implantation with the self-expanding Medtronic Core Valve System.
2960 *Int J Cardiol.* 2013;168:1269–73.
- 2961 293. Dizon JM, Nazif TM, Hess PL, et al. Chronic pacing and adverse outcomes after
2962 transcatheter aortic valve implantation. *Heart.* 2015;101:1665–71.
- 2963 294. Mauri V, Reimann A, Stern D, et al. Predictors of permanent pacemaker implantation
2964 after transcatheter aortic valve replacement with the SAPIEN 3. *JACC Cardiovasc Interv.*
2965 2016;9:2200–9.
- 2966 295. Schymik G, Tzamalīs P, Bramlage P, et al. Clinical impact of a new left bundle branch
2967 block following TAVI implantation: 1-year results of the TAVIK cohort. *Clin Res Cardiol.*
2968 2015;104:351–62.
- 2969 296. Urena M, Webb JG, Eltchaninoff H, et al. Late cardiac death in patients undergoing
2970 transcatheter aortic valve replacement: incidence and predictors of advanced heart failure and
2971 sudden cardiac death. *J Am Coll Cardiol.* 2015;65:437–48.
- 2972 297. Albin G, Hayes DL, Holmes DR Jr. Sinus node dysfunction in pediatric and young adult
2973 patients: treatment by implantation of a permanent pacemaker in 39 cases. *Mayo Clin Proc.*
2974 1985;60:667–72.
- 2975 298. Diller GP, Dimopoulos K, Okonko D, et al. Heart rate response during exercise predicts
2976 survival in adults with congenital heart disease. *J Am Coll Cardiol.* 2006;48:1250–6.
- 2977 299. Fishberger SB, Wernovsky G, Gentles TL, et al. Factors that influence the development
2978 of atrial flutter after the Fontan operation. *J Thorac Cardiovasc Surg.* 1997;113:80–6.
- 2979 300. Gelatt M, Hamilton RM, McCrindle BW, et al. Arrhythmia and mortality after the
2980 Mustard procedure: a 30-year single-center experience. *J Am Coll Cardiol.* 1997;29:194–201.
- 2981 301. Helbing WA, Hansen B, Ottenkamp J, et al. Long-term results of atrial correction for
2982 transposition of the great arteries. Comparison of Mustard and Senning operations. *J Thorac*
2983 *Cardiovasc Surg.* 1994;108:363–72.
- 2984 302. Sanders P, Morton JB, Kistler PM, et al. Electrophysiological and electroanatomic
2985 characterization of the atria in sinus node disease: evidence of diffuse atrial remodeling.
2986 *Circulation.* 2004;109:1514–22.

2987 303. Connelly MS, Liu PP, Williams WG, et al. Congenitally corrected transposition of the
2988 great arteries in the adult: functional status and complications. *J Am Coll Cardiol.*
2989 1996;27:1238–43.

2990 304. Graham TP Jr, Bernard YD, Mellen BG, et al. Long-term outcome in congenitally
2991 corrected transposition of the great arteries: a multi-institutional study. *J Am Coll Cardiol.*
2992 2000;36:255–61.

2993 305. Lundstrom U, Bull C, Wyse RK, et al. The natural and «unnatural» history of
2994 congenitally corrected transposition. *Am J Cardiol.* 1990;65:1222–9.

2995 306. Dewey RC, Capeless MA, Levy AM. Use of ambulatory electrocardiographic monitoring
2996 to identify high-risk patients with congenital complete heart block. *N Engl J Med.*
2997 1987;316:835–9.

2998 307. Michaelsson M, Jonzon A, Riesenfeld T. Isolated congenital complete atrioventricular
2999 block in adult life. A prospective study. *Circulation.* 1995;92:442–9.

3000 308. Glikson M, Dearani JA, Hyberger LK, et al. Indications, effectiveness, and long-term
3001 dependency in permanent pacing after cardiac surgery. *Am J Cardiol.* 1997;80:1309–13.

3002 309. Kim MH, Deeb GM, Eagle KA, et al. Complete atrioventricular block after valvular heart
3003 surgery and the timing of pacemaker implantation. *Am J Cardiol.* 2001;87:649–51, a10.

3004 310. Rhodes LA, Walsh EP, Gamble WJ, et al. Benefits and potential risks of atrial
3005 antitachycardia pacing after repair of congenital heart disease. *Pacing Clin Electrophysiol.*
3006 1995;18:1005-S8.2–16.

3007 311. Stephenson EA, Casavant D, Tuzi J, et al. Efficacy of atrial antitachycardia pacing using
3008 the Medtronic AT500 pacemaker in patients with congenital heart disease. *Am J Cardiol.*
3009 2003;92:871–6.

3010 312. Janousek J, Paul T, Luhmer I, et al. Atrial baffle procedures for complete transposition
3011 of the great arteries: natural course of sinus node dysfunction and risk factors for dysrhythmias
3012 and sudden death. *Z Kardiol.* 1994;83:933–8.

3013 313. DeSimone CV, Friedman PA, Noheria A, et al. Stroke or transient ischemic attack
3014 in patients with transvenous pacemaker or defibrillator and echocardiographically detected
3015 patent foramen ovale. *Circulation.* 2013;128:1433–41.

3016 314. Khairy P, Landzberg MJ, Gatzoulis MA, et al. Transvenous pacing leads and systemic
3017 thromboemboli in patients with intracardiac shunts: a multicenter study. *Circulation.*
3018 2006;113:2391–7.

3019 315. Auffret V, Loirat A, Leurent G, et al. High-degree atrioventricular block complicating ST
3020 segment elevation myocardial infarction in the contemporary era. *Heart.* 2016;102:40–9.

- 3021 316. Hynes JK, Holmes DR Jr, Harrison CE. Five-year experience with temporary pacemaker
3022 therapy in the coronary care unit. *Mayo Clin Proc.* 1983;58:122–6.
- 3023 317. Jowett NI, Thompson DR, Pohl JE. Temporary transvenous cardiac pacing: 6 years
3024 experience in one coronary care unit. *Postgrad Med J.* 1989;65:211–5.
- 3025 318. Kim HL, Kim SH, Seo JB, et al. Influence of second- and third-degree heart block on 30-
3026 day outcome following acute myocardial infarction in the drug-eluting stent era. *Am J Cardiol.*
3027 2014;114:1658–62.
- 3028 319. Ginks WR, Sutton R, Oh W, et al. Long-term prognosis after acute anterior infarction
3029 with atrioventricular block. *Br Heart J.* 1977;39:186–9.
- 3030 320. Singh SM, FitzGerald G, Yan AT, et al. High-grade atrioventricular block in acute
3031 coronary syndromes: insights from the Global Registry of Acute Coronary Events. *Eur Heart J.*
3032 2015;36:976–83.
- 3033 321. Watson RD, Glover DR, Page AJ, et al. The Birmingham trial of permanent pacing
3034 inpatients with intraventricular conduction disorders after acute myocardial infarction.
3035 *Am Heart J.* 1984;108:496–501.
- 3036 322. Ritter WS, Atkins JM, Blomqvist CG, et al. Permanent pacing in patients with transient
3037 trifascicular block during acute myocardial infarction. *Am J Cardiol.* 1976;38:205–8.
- 3038 323. Feigl D, Ashkenazy J, Kishon Y. Early and late atrioventricular block in acute inferior
3039 myocardial infarction. *J Am Coll Cardiol.* 1984;4:35–8.
- 3040 324. Scheinman MM, Thorburn D, Abbott JA. Use of atropine in patients with acute
3041 myocardial infarction and sinus bradycardia. *Circulation.* 1975;52:627–33.
- 3042 325. Swart G, Brady WJ Jr, DeBehnke DJ, et al. Acute myocardial infarction complicated by
3043 hemodynamically unstable bradyarrhythmia: prehospital and ED treatment with atropine.
3044 *Am J Emerg Med.* 1999;17:647–52.
- 3045 326. Gang UJ, Hvelplund A, Pedersen S, et al. High-degree atrioventricular block
3046 complicating ST-segment elevation myocardial infarction in the era of primary percutaneous
3047 coronary intervention. *Europace.* 2012;14:1639–45.
- 3048 327. Gadler F, Valzania C, Linde C. Current use of implantable electrical devices in Sweden:
3049 data from the Swedish pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator registry. *Europace.*
3050 2015;17:69–77.
- 3051 328. Armaganijan LV, Toff WD, Nielsen JC, et al. Are elderly patients at increased risk
3052 of complications following pacemaker implantation? A meta-analysis of randomized trials.
3053 *Pacing Clin Electrophysiol.* 2012;35:131–4.

3054 329. Kusumoto FM, Schoenfeld MH, Wilkoff BL, et al. 2017 HRS expert consensus statement
3055 on cardiovascular implantable electronic device lead management and extraction.
3056 Heart Rhythm. 2017;14:e503–51.

3057 330. Lee JZ, Ling J, Diehl NN, et al. Mortality and cerebrovascular events after heart rhythm
3058 disorder management procedures. Circulation. 2018;137:24–33.

3059 331. Col JJ, Weinberg SL. The incidence and mortality of intraventricular conduction defects
3060 in acute myocardial infarction. Am J Cardiol. 1972;29:344–50.

3061 332. Hindman MC, Wagner GS, JaRo M, et al. The clinical significance of bundle branch
3062 block complicating acute myocardial infarction. 2. Indications for temporary and permanent
3063 pacemaker insertion. Circulation. 1978;58:689–99.

3064 333. Hindman MC, Wagner GS, JaRo M, et al. The clinical significance of bundle branch
3065 block complicating acute myocardial infarction. 1. Clinical characteristics, hospital mortality,
3066 and one-year follow-up. Circulation. 1978;58:679–88.

3067 334. Alnsasra H, Ben-Avraham B, Gottlieb S, et al. High-grade atrioventricular block
3068 in patients with acute myocardial infarction. Insights from a contemporary multi-center survey.
3069 J Electrocardiol. 2018;51:386–91.

3070 335. Kosmidou I, Redfors B, Dordi R, et al. Incidence, predictors, and outcomes of high-grade
3071 atrioventricular block in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing
3072 primary percutaneous coronary intervention (from the HORIZONS-AMI Trial). Am J Cardiol.
3073 2017;119:1295–301.

3074 336. Melgarejo-Moreno A, Galcera-Tomas J, Consuegra-Sanchez L, et al. Relation of new
3075 permanent right or left bundle branch block on short- and long-term mortality in acute
3076 myocardial infarction bundle branch block and myocardial infarction. Am J Cardiol.
3077 2015;116:1003–9.

3078 337. Brignole M, Sutton R, Menozzi C, Garcia-Civera R, Moya A, Wieling W, Andresen D,
3079 Benditt DG, Vardas P, International Study on Syncope of Uncertain Etiology 2 (ISSUE 2)
3080 Group. Early application of an implantable loop recorder allows effective specific therapy in
3081 patients with recurrent suspected neurally mediated syncope. Eur Heart J. 2006;27:1085–1092.

3082 338. Brignole M, Menozzi C, Moya A, Andresen D, Blanc JJ, Krahn AD, Wieling W, Beiras
3083 X, Deharo JC, Russo V, Tomaino M, Sutton R, International Study on Syncope of Uncertain
3084 Etiology 3 (ISSUE-3) Investigators. Pacemaker therapy in patients with neurally mediated
3085 syncope and documented asystole: Third International Study on Syncope of Uncertain Etiology
3086 (ISSUE-3): a randomized trial. Circulation. 2012;125:2566–2571.

3087 339. Sud S, Klein GJ, Skanes AC, Gula LJ, Yee R, Krahn AD. Implications of mechanism
3088 of bradycardia on response to pacing in patients with unexplained syncope. *Europace*.
3089 2007;9:312–318.

3090 340. Brignole M, Arabia F, Ammirati F, Tomaino M, Quartieri F, Rafanelli M, Del Rosso A,
3091 Rita Vecchi M, Russo V, Gaggioli G, Syncope Unit Project 2 (SUP 2) investigators.
3092 Standardized algorithm for cardiac pacing in older patients affected by severe unpredictable
3093 reflex syncope: 3-year insights from the Syncope Unit Project 2 (SUP 2) study. *Europace*.
3094 2016;18:1427–1433.

3095 341. Puggioni E, Guiducci V, Brignole M, Menozzi C, Oddone D, Donateo P, Croci F, Solano
3096 A, Lolli G, Tomasi C, Bottoni N. Results and complications of the carotid sinus massage
3097 performed according to the «method of symptoms». *Am J Cardiol*. 2002;89:599–601.

3098 342. Brignole M, Arabia F, Ammirati F, Tomaino M, Quartieri F, Rafanelli M, Del Rosso A,
3099 Rita Vecchi M, Russo V, Gaggioli G, Syncope Unit Project 2 (SUP 2) investigators.
3100 Standardized algorithm for cardiac pacing in older patients affected by severe unpredictable
3101 reflex syncope: 3-year insights from the Syncope Unit Project 2 (SUP 2) study. *Europace*.
3102 2016;18:1427–1433.

3103 343. Brignole M, Menozzi C. The natural history of carotid sinus syncope and the effect
3104 of cardiac pacing. *Europace*. 2011;13:462–464.

3105 344. Sutton R, Brignole M, Menozzi C, Raviele A, Alboni P, Giani P, Moya A. Dual-chamber
3106 pacing in the treatment of neurally mediated tilt-positive cardioinhibitory syncope: pacemaker
3107 versus no therapy: a multicenter randomized study. The Vasovagal Syncope International Study
3108 (VASIS) Investigators. *Circulation*. 2000;102:294–299.

3109 345. Ammirati F, Colivicchi F, Santini M, Syncope Diagnosis and Treatment Study
3110 Investigators. Permanent cardiac pacing versus medical treatment for the prevention
3111 of recurrent vasovagal syncope: a multicenter, randomized, controlled trial. *Circulation*.
3112 2001;104:52–57.

3113 346. Baron-Esquivias G, Morillo CA, Moya-Mitjans A, Martinez-Alday J, Ruiz-Granell R,
3114 Lacunza-Ruiz J, Garcia-Civera R, Gutierrez-Carretero E, Romero-Garrido R. Dual-chamber
3115 pacing with closed loop stimulation in recurrent reflex vasovagal syncope: the SPAIN Study.
3116 *J Am Coll Cardiol*. 2017;70:1720–1728.

3117 347. Brignole M, Deharo JC, De Roy L, Menozzi C, Blommaert D, Dabiri L, Ruf J, Guieu R.
3118 Syncope due to idiopathic paroxysmal atrioventricular block: longterm follow-up of a distinct
3119 form of atrioventricular block. *J Am Coll Cardiol*. 2011;58:167–173.

- 3120 348. Flammang D, Church TR, De Roy L, Blanc JJ, Leroy J, Mairesse GH, Otmani A, Graux
3121 PJ, Frank R, Purnode P, ATP Multicenter Study. Treatment of unexplained syncope:
3122 a multicenter, randomized trial of cardiac pacing guided by adenosine 5'-triphosphate testing.
3123 *Circulation*. 2012;125:31–36.
- 3124 349. Brignole M, Guieu R, Tomaino M, Iori M, Ungar A, Bertolone C, Unterhuber M, Bottoni
3125 N, Tesi F, Claude Deharo J. Mechanism of syncope without prodromes with normal heart and
3126 normal electrocardiogram. *Heart Rhythm*. 2017;14:234–239.
- 3127 350. Connolly SJ, Sheldon R, Thorpe KE, Roberts RS, Ellenbogen KA, Wilkoff BL, Morillo
3128 C, Gent M, VPS II Investigators. Pacemaker therapy for prevention of syncope in patients with
3129 recurrent severe vasovagal syncope: Second Vasovagal Pacemaker Study (VPS II):
3130 a randomized trial. *JAMA*. 2003;289:2224–2229.
- 3131 351. Raviele A, Giada F, Menozzi C, Speca G, Orazi S, Gasparini G, Sutton R, Brignole M,
3132 Vasovagal Syncope and Pacing Trial Investigators. A randomized, double-blind, placebo-
3133 controlled study of permanent cardiac pacing for the treatment of recurrent tilt-induced
3134 vasovagal syncope. The Vasovagal Syncope and Pacing Trial (SYNPACE). *Eur Heart J*.
3135 2004;25:1741–1748.
- 3136 352. Brignole M, Deharo JC, Menozzi C, Moya A, Sutton R, Tomaino M, Ungar A. The
3137 benefit of pacemaker therapy in patients with neurally-mediated syncope and documented
3138 asystole: a meta-analysis of implantable loop recorder studies. *Europace*;
3139 doi:10.1093/europace/eux321. Published online ahead of print 15 December 2017.
- 3140 353. Brignole M., Auricchio A., Baron-Esquivias G. et al. 2013 ESC Guidelines on cardiac
3141 pacing and cardiac resynchronization therapy. The Task Force on cardiac pacing and
3142 resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC). Developed
3143 in collaboration with the European Heart Rhythm Association (EHRA). *European Heart*
3144 *Journal*. 2013; 34: 2281–2329.
- 3145 354. Hayes DL, Barold SS, Camm AJ, Goldschlager NF. Evolving indications for permanent
3146 cardiac pacing: an appraisal of the 1998 American College of Cardiology/American Heart
3147 Association Guidelines. *Am J Cardiol*. 1998;82:1082-6, A6.
- 3148 355. Epstein A, DiMarco J, Ellenbogen K, et al. ACC/AHA/HRS 2008 guidelines for Device-
3149 Based Therapy of Cardiac Rhythm Abnormalities: a Report of the American College
3150 of Cardiology/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. *Circulation*.
3151 2008;117:2820–2840.
- 3152 356. Slotwiner D, Varma N, Akar JG, et al. Совместное экспертное заключение
3153 Американского общества сердечного ритма (HRS) по удаленной телеметрии

3154 и мониторингу сердечно-сосудистых имплантируемых электронных устройств. //
3155 Вестник аритмологии. — 2015. — №82. — С. 43–72.

3156 357. Sohail MR, Uslan DZ, Khan AH, Friedman PA, Hayes DL, Wilson WR, Steckelberg JM,
3157 Stoner S, Baddour LM. Anagement and outcome of permanentpacemaker and implantable
3158 cardioverter-defibrillator infections. *J Am Coll Cardiol.* 2007;49:1851–1859.

3159 358. Baddour LM, IDSA’s Emerging Infections Network. Long-term suppressiveantimicrobial
3160 therapy for intravascular device-related infections. *Am J Med Sci.* 2001;322:209–212.

3161 359. Chamis AL, Peterson GE, Cabell CH, Corey GR, Sorrentino RA, Greenfield RA, Ryan T,
3162 Reller LB, Fowler VG, Jr. Staphylococcus aureus bacteremia in patientswith permanent
3163 pacemakers or implantable cardioverter-defibrillators. *Circulation.* 2001;104:1029–1033.

3164 360. Dy Chua J, Abdul-Karim A, Mawhorter S, Procop GW, Tchou P, Niebauer M, Saliba W,
3165 Schweikert R, Wilkoff BL. The role of swab and tissue culture in thediagnosis of implantable
3166 cardiac device infection. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2005;28:1276–1281.

3167 361. Klug D, Lacroix D, Savoye C, Goullard L, Grandmougin D, Hennequin JL, Kacet S,
3168 Lekieffre J. Systemic infection related to endocarditis on pacemakerleads: clinical presentation
3169 and management. *Circulation.* 1997;95:2098–2107.

3170 362. Mansur AJ, Grinberg M, Costa R, Ven Chung C, Pileggi F. Dura mater valveendocarditis
3171 related to retained fragment of postoperative temporary epicardial pacemaker lead. *Am Heart J.*
3172 1984;108:1049–1052.

3173 363. Wilkoff BL, Love CJ, Byrd CL, Bongiorno MG, Carrillo RG, Crossley GH 3rd, Epstein
3174 LM, Friedman RA, Kennergren CE, Mitkowski P, Schaerf RH, Wazni OM, Heart Rhythm
3175 Society; American Heart Association. Transvenous lead extraction: Heart Rhythm Society
3176 expert consensus on facilities, training, indications, and patient management: this document
3177 was endorsed by the American Heart Association (AHA). *Heart Rhythm.* 2009;6:1085–1104.

3178 364. Rusanov A, Spotnitz HM. A 15-year experience with permanent pacemaker and
3179 defibrillator lead and patch extractions. *Ann Thorac Surg.* 2010;89:44–50.

3180 365. Riaz T, Nienaber JJ, Baddour LM, Walker RC, Park SJ, Sohail MR. Cardiovascular
3181 implantable electronic device infections in left ventricular assist device recipients. *Pacing Clin*
3182 *Electrophysiology.* 2014;37:225–230.

3183 366. Viola GM, Awan LL, Ostrosky-Zeichner L, Chan W, Darouiche RO. Infections
3184 of cardiac implantable electronic devices: a retrospective multicenter observational study.
3185 *Medicine (Baltimore).* 2012;91:123–130.

3186 367. Epstein AE, Kay GN, Plumb VJ, McElderry HT, Doppalapudi H, Yamada T, Shafiroff J,
3187 Syed ZA, Shkurovich S, ACT Investigators. Implantable cardioverter-defibrillator prescription
3188 in the elderly. *Heart Rhythm*. 2009;6:1136–1143.

3189 368. Baddour LM, Infectious Diseases Society of America’s Emerging Infections Network.
3190 Long-term suppressive antimicrobial therapy for intravascular device-related infections.
3191 *Am J Med Sci*. 2001;322:209–212.

3192 369. Braun MU, Rauwolf T, Bock M, Kappert U, Boscheri A, Schnabel A, Strasser RH.
3193 Percutaneous lead implantation connected to an external device in stimulation-dependent
3194 patients with systemic infection—a prospective and controlled study. *Pacing Clin*
3195 *Electrophysiology*. 2006;29:875–879.

3196 370. Kang J, Simpson CS, Campbell D, Borici-Mazi R, Redfearn DP, Michael KA, Abdollah
3197 H, Baranchuk A. Case Report: Cardiac rhythm device contact dermatitis. *Ann Noninvasive*
3198 *Electrocardiol*. 2013;18:79–83.

3199 371. Citerne O, Gomes S, Scanu P, Milliez P. Painful eczema mimicking pocket infection
3200 in a patient with an ICD. *Circulation*. 2011;123:1241–1242.

3201 372. Bode K, Breithardt OA, Kreuzhuber M, et al. Patient discomfort following catheter
3202 ablation and rhythm device surgery. *Europace*. 2015;17:1129–1135.

3203 373. Celikyurt U, Agacdiken A, Bozyel S, Argan O, Sade I, Vural A, Ural D. Assessment
3204 of shoulder pain and shoulder disability in patients with implantable cardioverter- defibrillator.
3205 *J Interv Card Electrophysiol*. 2013;36:91–94.

3206 374. Khairy P, Landzberg MJ, Gatzoulis MA, Mercier LA, Fernandes SM, Côté JM,
3207 Lavoie JP, Fournier A, Guerra PG, Frogoudaki A, Walsh EP, Dore A. Transvenous pacing
3208 leads and systemic thromboemboli in patients with intracardiac shunts, a mulitcenter study.
3209 *Circulation*. 2006;113:2391–2397.

3210 375. Larsen JM, Theuns DA, Thøgersen AM. Paradoxical thromboembolic stroke during
3211 extraction of a recalled St Jude Medical Riata defibrillator lead with conductor externalization.
3212 *Europace*. 2014;16:240.

3213 376. Noheria A, Ponamgi SP, Desimone CV, et al. Pulmonary embolism in patients with
3214 transvenous cardiac implantable electronic device leads. *Europace*. 2016;18:246–252.

3215 377. Fu HX, Huang XM, Zhong L, Osborn MJ, Bjarnason H, Mulpuru S, Zhao XX, Friedman
3216 PA, Cha YM. Outcome and management of pacemaker-induced superior vena cava syndrome.
3217 *Pacing Clin Electrophysiol*. 2014;37:1470–1476.

3218 378. Riley RF, Petersen SE, Ferguson JD, Bashir Y. Managing superior vena cava syndrome
3219 as a complication of pacemaker implantation: a pooled analysis of clinical practice. *Pacing Clin*
3220 *Electrophysiol.* 2010;33:420–425.

3221 379. Sohal M, Williams S, Akhtar M, et al. Laser lead extraction to facilitate cardiac
3222 implantable electronic device upgrade and revision in the presence of central venous
3223 obstruction. *Europace.* 2014;16:81–87.

3224 380. Gula LJ, Ames A, Woodburn A, Matkins J, McCormick M, Bell J, Sink D, McConville J,
3225 Epstein LM. Central venous occlusion is not an obstacle to device upgrade with the assistance
3226 of laser extraction. *Pacing Clin Electrophysiol.* 2005; 28:661–666.

3227 381. Glikson M, Suleiman M, Luria DM, Martin ML, Hodge DO, Shen WK, Bradley DJ,
3228 Munger TM, Rea RF, Hayes DL, Hammill SC, Friedman PA. Do abandoned leads pose risk
3229 to implantable cardioverter-defibrillator patients? *Heart Rhythm.* 2009;6:65–68.

3230 382. Indik JH, Gimbel JR, Abe H, et al. 2017 HRS expert consensus statement on magnetic
3231 resonance imaging and radiation exposure in patients with cardiovascular implantable
3232 electronic devices. *Heart Rhythm.* 2017;14:e97–e153.

3233 383. Mollerus M, Albin G, Lipinski M, Lucca J. Magnetic resonance imaging of pacemakers
3234 and implantable cardioverter-defibrillators without specific absorption rate restrictions.
3235 *Europace.* 2010;12:947–951.

3236 384. Lee JC, Epstein LM, Huffer LL, Stevenson WG, Koplan BA, Tedrow UB. ICD lead
3237 proarrhythmia cured by lead extraction. *Heart Rhythm.* 2009;6:613–618.

3238 385. Valentino V, Greenberg YJ, Saunders P, Yang F. An unusual interaction between
3239 an abandoned pacing lead and an ICD lead. *Heart Rhythm.* 2015; 12:1400–1401.

3240 386. Landolina M, Gasparini M, Lunati M, et al. Long-term complications related
3241 to biventricular defibrillator implantation: rate of surgical revisions and impact on survival:
3242 insights from the Italian Clinical Service Database. *Circulation.* 2011;123:2526–2535.

3243 387. Worley SJ, Gohn DC, Pulliam RW, Raifsnider MA, Ebersole BI, Tuzi J. Subclavian
3244 venoplasty by the implanting physicians in 373 patients over 11 years. *Heart Rhythm.*
3245 2011;8:526–533.

3246 388. Cohen JD, Costa HS, Russo RJ. Determining the risks of magnetic resonance imaging
3247 at 1.5 tesla for patients with pacemakers and implantable cardioverter defibrillators.
3248 *Am J Cardiol.* 2012;110:1631–1636.

3249 389. Russo RJ, Costa HS, Silva PD, et al. Assessing the risks associated with MRI in patients
3250 with a pacemaker or defibrillator. *N Engl J Med.* 2017;376:755–764.

3251 390. Nazarian S, Roguin A, Zviman MM, Lardo AC, Dickfeld TL, Calkins H, Weiss RG,
3252 Berger RD, Bluemke DA, Halperin HR. Clinical utility and safety of a protocol for noncardiac
3253 and cardiac magnetic resonance imaging of patients with permanent pacemakers and
3254 implantable-cardioverter defibrillators at 1.5 tesla. *Circulation*. 2006;114:1277–1284.

3255 391. Ji SY, Gundewar S, Palma EC. Subclavian venoplasty may reduce implant times and
3256 implant failures in the era of increasing device upgrades. *Pacing Clin Electrophysiol*.
3257 2012;35:444–448.

3258 392. Worley SJ, Gohn DC, Pulliam RW. Excimer laser to open refractory subclavian
3259 occlusion in 12 consecutive patients. *Heart Rhythm*. 2010;7:634–638.

3260 393. Wazni O, Epstein LM, Carrillo RG, et al. Lead extraction in the contemporary setting:
3261 theLExICon study: an observational retrospective study of consecutive laser lead extractions.
3262 *J Am Coll Cardiol*. 2010;55:579–586.

3263 394. Huang XM, Fu H, Osborn MJ, Asirvatham SJ, McLeod CJ, Glickson M, Acker NG,
3264 Friedman PA, Cha YM. Extraction of superfluous device leads: A comparison with removal
3265 of infected leads. *Heart Rhythm*. 2015;12:1177–1182.

3266 395. Wilkoff BL, Bello D, Taborsky M, et al. Magnetic resonance imaging in patients with
3267 a pacemaker system designed for the magnetic resonance environment. *Heart Rhythm*.
3268 2011;8:65–73.

3269 396. Naehle CP, Meyer C, Thomas D, Remerie S, Krautmacher C, Litt H, Luechinger R,
3270 Fimmers R, Schild H, Sommer T. Safety of brain 3-T MR imaging with transmit-receive head
3271 coil in patients with cardiac pacemakers: pilot prospective study with 51 examinations.
3272 *Radiology*. 2008;249:991–1001.

3273 397. Polewczyk A, Kutarski A, Tomaszewski A, Brzozowski W, Czajkowski M,
3274 Polewczyk M, Janion M. Lead dependent tricuspid dysfunction: analysis of the mechanism and
3275 management in patients referred for transvenous lead extraction. *Cardiol J*. 2013;20:402–410.

3276 398. Padmanabhan D, Kella DK, Mehta R, et al. Safety of magnetic resonance imaging
3277 in patients with legacy pacemakers and defibrillators and abandoned leads. *Heart Rhythm*.
3278 2017;14 (Suppl.):S105.

3279 399. Austin CO, Landolfo K, Parikh PP, Patel PC, Venkatachalam KL, Kusumoto FM.
3280 Retained cardiac implantable electronic device fragments are not associated with magnetic
3281 resonance imaging safety issues, morbidity, or mortality after orthotopic heart transplant.
3282 *Am Heart J*. 2017;190:46–53.

3283 400. Lin G, Nishimura RA, Connolly HM, Dearani JA, Sundt TM 3rd, Hayes DL. Severe
3284 symptomatic tricuspid valve regurgitation due to permanent pacemaker or implantable
3285 cardioverter-defibrillator leads. *J Am Coll Cardiol*. 2005;45:1672–1675.

3286 401. Postaci N, Ekşi K, Bayata S, Yeşil M. Effect of the number of ventricular leads on right
3287 ventricular hemodynamics in patients with permanent pacemaker. *Angiology*.
3288 1995;46:421–424.

3289 402. Suga C, Hayes DL, Hyberger LK, Lloyd MA. Is there an adverse outcome from
3290 abandoned pacing leads? *J Interv Card Electrophysiol*. 2000;4:493–499.

3291 403. Franceschi F, Thuny F, Giorgi R, Sanaa I, Peyrouse E, Assouan X, Prévôt S, Bastard E,
3292 Habib G, Deharo JC. Incidence, risk factors, and outcome of traumatic tricuspid regurgitation
3293 after percutaneous ventricular lead removal. *J Am Coll Cardiol*. 2009;53:2168–2174.

3294 404. Atallah J, Erickson CC, Cecchin F, et al. A multi-institutional study of implantable
3295 defibrillator lead performance in children and young adults: Results of the pediatric lead
3296 extractability and survival evaluation (PLEASE) study. *Circulation*. 2013;127:2393–2402.

3297 405. Woelfel AK, Simpson RJ Jr, Gettes LS, Foster JR. Exercise-induced distal
3298 atrioventricular block. *J Am Coll Cardiol* 1983;2:578–581.

3299 406. Byrne JM, Marais HJ, Cheek GA. Exercise-induced complete heart block in a patient
3300 with chronic bifascicular block. *J Electrocardiol* 1994;27:339–342.

3301 407. Aste M, Oddone D, Donato P, Solano A, Maggi R, Croci F, Solari D, Brignole M.
3302 Syncope in patients paced for atrioventricular block. *Europace* 2016;18:1735–1739.

3303 408. Sumiyoshi M, Nakata Y, Yasuda M, Tokano T, Ogura S, Nakazato Y, Yamaguchi H.
3304 Clinical and electrophysiologic features of exercise-induced atrioventricular block. *Am Heart J*
3305 1996;132:1277–1281.

3306 409. Wissocq L, Ennezat PV, Mouquet F. Exercise-induced high-degree atrioventricular
3307 block. *Arch Cardiovasc Dis* 2009;102:733–735. 23. Podoleanu C, Maggi R, Brignole M, Croci
3308 F, Incze A, Solano A, Puggioni E, Carasca E. Lower limb and abdominal compression
3309 bandages prevent progressive orthostatic hypotension in elderly persons: a randomized single-
3310 blind controlled study. *J Am Coll Cardiol* 2006;48:1425–1432.

3311 410. Gibbons CH, Freeman R. Delayed orthostatic hypotension: a frequent cause of orthostatic
3312 intolerance. *Neurology* 2006;67:28–32.

3313 411. Kenny RA, Ingram A, Bayliss J, Sutton R. Head-up tilt: a useful test for investigating
3314 unexplained syncope. *Lancet* 1986;1:1352–1355.

3315 412. Bartoletti A, Alboni P, Ammirati F, Brignole M, Del Rosso A, Foglia Manzillo G,
3316 Menozzi C, Raviele A, Sutton R. ‘The Italian Protocol’: a simplified head-up tilt testing

3317 potentiated with oral nitroglycerin to assess patients with unexplained syncope. *Europace*
3318 2000;2:339–342.

3319 413. Kenny RA, O’Shea D, Parry SW. The Newcastle protocols for head-up tilt table testing in
3320 the diagnosis of vasovagal syncope, carotid sinus hypersensitivity, and related disorders. *Heart*
3321 2000;83:564–569.

3322 414. Benditt DG, Ferguson DW, Grubb BP, Kapoor WN, Kugler J, Lerman BB, Maloney JD,
3323 Raviele A, Ross B, Sutton R, Wolk MJ, Wood DL. Tilt table testing for assessing syncope.
3324 *American College of Cardiology. J Am Coll Cardiol* 1996;28:263–275.

3325 415. Morillo CA, Klein GJ, Zandri S, Yee R. Diagnostic accuracy of a low-dose isoproterenol
3326 head-up tilt protocol. *Am Heart J* 1995;129:901–906.

3327 416. Parry SW, Gray JC, Newton JL, Reeve P, O’Shea D, Kenny RA. ‘Front-loaded’ head-up
3328 tilt table testing: validation of a rapid first line nitrate-provoked tilt protocol for the diagnosis of
3329 vasovagal syncope. *Age Ageing* 2008;37:411–415.

3330 417. Verheyden B, Gisolf J, Beckers F, Karemaker JM, Wesseling KH, Aubert AE, Wieling
3331 W. Impact of age on the vasovagal response provoked by sublingual nitroglycerine in routine
3332 tilt testing. *Clin Sci (Lond)* 2007;113:329–337.

3333 418. Nilsson D, Sutton R, Tas W, Burri P, Melander O, Fedorowski A. Orthostatic changes in
3334 hemodynamics and cardiovascular biomarkers in dysautonomic patients. *PLoS One*
3335 2015;10:e0128962.

3336 419. Low PA, Sandroni P, Joyner M, Shen WK. Postural tachycardia syndrome (POTS). *J*
3337 *Cardiovasc Electrophysiol* 2009;20:352–358.

3338 420. Petersen ME, Williams TR, Sutton R. Psychogenic syncope diagnosed by prolonged
3339 head-up tilt testing. *QJM* 1995;88:209–213.

3340 421. Tannemaat MR, van Niekerk J, Reijntjes RH, Thijs RD, Sutton R, van Dijk JG. The
3341 semiology of tilt-induced psychogenic pseudosyncope. *Neurology* 2013;81:752–758.

3342 422. Blad H, Lamberts RJ, van Dijk GJ, Thijs RD. Tilt-induced vasovagal syncope and
3343 psychogenic pseudosyncope: Overlapping clinical entities. *Neurology* 2015;85:2006–2010.

3344 423. Moya A, Permanyer-Solari D, Maggi R, Oddone D, Solano A, Croci F, Donateo P,
3345 Brignole M. Clinical context and outcome of carotid sinus syndrome diagnosed by means of
3346 the ‘method of symptoms’. *Europace* 2014;16:928–934. Solari D, Maggi R, Oddone D, Solano
3347 A, Croci F, Donateo P, Brignole M. Clinical context and outcome of carotid sinus syndrome
3348 diagnosed by means of the ‘method of symptoms’. *Europace* 2014;16:928–934.

- 3349 424. Solari D, Maggi R, Oddone D, Solano A, Croci F, Donateo P, Wieling W, Brignole M.
3350 Assessment of the vasodepressor reflex in carotid sinus syndrome. *Circ Arrhythm*
3351 *Electrophysiol* 2014;7:505–510.
- 3352 425. Solari D, Maggi R, Oddone D, Solano A, Croci F, Donateo P, Brignole M. Clinical
3353 context and outcome of carotid sinus syndrome diagnosed by means of the ‘method of
3354 symptoms’. *Europace* 2014;16:928–934.
- 3355 426. Brignole M, Ungar A, Casagrande I, Gulizia M, Lunati M, Ammirati F, Del Rosso A,
3356 Sasdelli M, Santini M, Maggi R, Vitale E, Morrione A, Francese GM, Vecchi MR, Giada F,
3357 Syncope Unit Project (SUP) investigators. Prospective multicenter systematic guideline-based
3358 management of patients referred to the Syncope Units of general hospitals. *Europace*
3359 2010;12:109–118.
- 3360 427. Guieu R, Deharo JC, Ruf J, Mottola G, Kipson N, Bruzzese L, Gerolami V, Franceschi F,
3361 Ungar A, Tomaino M, Iori M, Brignole M. Adenosine and clinical forms of neurally-mediated
3362 syncope. *J Am Coll Cardiol* 2015;66:204–205.
- 3363 428. Flammang D, Church TR, De Roy L, Blanc JJ, Leroy J, Mairesse GH, Otmani A, Graux
3364 PJ, Frank R, Purnode P, ATP Multicenter Study. Treatment of unexplained syncope: a
3365 multicenter, randomized trial of cardiac pacing guided by adenosine 5'-triphosphate testing.
3366 *Circulation* 2012;125:31–36.
- 3367 429. Brignole M, Gaggioli G, Menozzi C, Gianfranchi L, Bartoletti A, Bottoni N, Lolli G,
3368 Oddone D, Del Rosso A, Pellinghelli G. Adenosine-induced atrioventricular block in patients
3369 with unexplained syncope: the diagnostic value of ATP testing. *Circulation* 1997;96:3921–
3370 3927.
- 3371 430. Scheinman MM, Thorburn D, Abbott JA. Use of atropine in patients with acute
3372 myocardial infarction and sinus bradycardia. *Circulation*. 1975;52:627-33.
- 3373 431. Swart G, Brady WJ Jr, DeBehnke DJ, et al. Acute myocardial infarction complicated by
3374 hemodynamically unstable bradyarrhythmia: prehospital and ED treatment with atropine. *Am J*
3375 *Emerg Med*. 1999;17:647-52.
- 3376 432. Warren JV, Lewis RP. Beneficial effects of atropine in the pre-hospital phase of coronary
3377 care. *Am J Cardiol*. 1976;37:68-72.
- 3378 433. Gee SW, Karsies TJ. Listeria meningitis-associated bradyarrhythmia treated with
3379 isoproterenol. *Am J Emerg Med*. 2015;33:306.e1-2.
- 3380 434. Andersen HR, Nielsen JC, Thomsen PE, et al. Long-term follow-up of patients from a
3381 randomised trial of atrial versus ventricular pacing for sick-sinus syndrome. *Lancet*.
3382 1997;350:1210-6.

- 3383 435. Connolly SJ, Kerr CR, Gent M, et al. Effects of physiologic pacing versus ventricular
3384 pacing on the risk of stroke and death due to cardiovascular causes. Canadian Trial of
3385 Physiologic Pacing Investigators. *N Engl J Med.* 2000;342:1385-91.
- 3386 436. Lamas GA, Lee KL, Sweeney MO, et al. Ventricular pacing or dual-chamber pacing for
3387 sinus-node dysfunction. *N Engl J Med.* 2002;346:1854-62.
- 3388 437. Lamas GA, Orav EJ, Stambler BS, et al. Quality of life and clinical outcomes in elderly
3389 patients treated with ventricular pacing as compared with dual-chamber pacing. *Pacemaker*
3390 *Selection in the Elderly Investigators.* *N Engl J Med.* 1998;338:1097-104.
- 3391 438. Brandt NH, Kirkfeldt RE, Nielsen JC, et al. Single lead atrial vs. dual chamber pacing in
3392 sick sinus syndrome: extended register-based follow-up in the DANPACE trial. *Europace.*
3393 2016;
- 3394 439. Sweeney MO, Bank AJ, Nsah E, et al. Minimizing ventricular pacing to reduce atrial
3395 fibrillation in sinus-node disease. *N Engl J Med.* 2007;357:1000-8.
- 3396 440. Gillis AM, Russo AM, Ellenbogen KA, et al. HRS/ACCF expert consensus statement on
3397 pacemaker device and mode selection. *J Am Coll Cardiol.* 2012;60:682-703.
- 3398 441. Dretzke J, Toff WD, Lip GY, et al. Dual chamber versus single chamber ventricular
3399 pacemakers for sick sinus syndrome and atrioventricular block. *Cochrane Database Syst Rev.*
3400 2004;CD003710.
- 3401 442. Andersen HR, Nielsen JC, Thomsen PE, et al. Atrioventricular conduction during long-
3402 term follow-up of patients with sick sinus syndrome. *Circulation.* 1998;98:1315-21.
- 3403 443. Brandt J, Anderson H, Fahraeus T, et al. Natural history of sinus node disease treated
3404 with atrial pacing in 213 patients: implications for selection of stimulation mode. *J Am Coll*
3405 *Cardiol.* 1992;20:633-9.
- 3406 444. Dhingra RC, Denes P, Wu D, et al. The significance of second degree atrioventricular
3407 block and bundle branch block. Observations regarding site and type of block. *Circulation.*
3408 1974;49:638-46.
- 3409 445. Ector H, Rolies L, De Geest H. Dynamic electrocardiography and ventricular pauses of 3
3410 seconds and more: etiology and therapeutic implications. *Pacing Clin Electrophysiol.*
3411 1983;6:548-51.
- 3412 446. Edhag O, Swahn A. Prognosis of patients with complete heart block or arrhythmic
3413 syncope who were not treated with artificial pacemakers. A long-term follow-up study of 101
3414 patients. *Acta Med Scand.* 1976;200:457-63.
- 3415 447. Shaw DB, Eraut D. Prevalence and morbidity of heart block in Devon. *Br Med J.*
3416 1970;1:144-7.

- 3417 448. Shaw DB, Kekwick CA, Veale D, et al. Survival in second degree atrioventricular block.
3418 Br Heart J. 1985;53:587-93.
- 3419 449. Simon AB, Zloto AE. Atrioventricular block: natural history after permanent ventricular
3420 pacing. Am J Cardiol. 1978;41:500-7.
- 3421 450. Strasberg B, Amat YLF, Dhingra RC, et al. Natural history of chronic second-degree
3422 atrioventricular nodal block. Circulation. 1981;63:1043-9.
- 3423 451. Bhakta D, Shen C, Kron J, et al. Pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator use
3424 in a US myotonic dystrophy type 1 population. J Cardiovasc Electrophysiol. 2011;22:1369-75.
- 3425 452. Facenda-Lorenzo M, Hernandez-Afonso J, Rodriguez-Esteban M, et al. Cardiac
3426 manifestations in myotonic dystrophy type 1 patients followed using a standard protocol in a
3427 specialized unit. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2013;66:193-7.
- 3428 453. Groh WJ. Arrhythmias in the muscular dystrophies. Heart Rhythm. 2012;9:1890-5.
- 3429 454. Groh WJ, Groh MR, Saha C, et al. Electrocardiographic abnormalities and sudden death
3430 in myotonic dystrophy type 1. N Engl J Med. 2008;358:2688-97.
- 3431 455. Glikson M, Nielsen J C, Kronborg M B, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing
3432 and cardiac resynchronization therapy Developed by the Task Force on cardiac pacing and
3433 cardiac resynchronization therapy of the European Society of Cardiology (ESC) With the
3434 special contribution of the European Heart Rhythm Association (EHRA). European Heart
3435 Journal (2021) 00,1-94.
- 3436 456. Gauss A, Hubner C, Meierhenrich R, et al. Perioperative transcutaneous pacemaker in
3437 patients with chronic bifascicular block or left bundle branch block and additional first-degree
3438 atrioventricular block. Acta Anaesthesiol Scand. 1999;43:731-6.
- 3439 457. Im SH, Han MH, Kim SH, et al. Transcutaneous temporary cardiac pacing in carotid
3440 stenting: noninvasive prevention of angioplasty-induced bradycardia and hypotension. J
3441 Endovasc Ther. 2008;15:110-6.
- 3442 458. Marrocco-Trischitta MM, Mazzone P, Vitale R, et al. Temporary transvenous pacemaker
3443 implantation during carotid endarterectomy in patients with trifascicular block. Ann Vasc Surg.
3444 2016;34:206-11.
- 3445 459. Morris D, Mulvihill D, Lew WY. Risk of developing complete heart block during
3446 bedside pulmonary artery catheterization in patients with left bundle-branch block. Arch Intern
3447 Med. 1987;147: 2005-10.
- 3448 460. Unnikrishnan D, Idris N, Varshneya N. Complete heart block during central venous
3449 catheter placement in a patient with pre-existing left bundle branch block. Br J Anaesth.
3450 2003;91:747-9.

3451 461. Halliday BP, Gulati A, Ali A, Guha K, Newsome S, Arzanauskaite M, Vassiliou VS,
3452 Lota A, Izgi C, Tayal U, Khalique Z, Stirrat C, Auger D, Pareek N, Ismail TF, Rosen SD, Vazir
3453 A, Alpendurada F, Gregson J, Frenneaux MP, Cowie MR, Cleland JGF, Cook SA, Pennell DJ,
3454 Prasad SK. Association between midwall late gadolinium enhancement and sudden cardiac
3455 death in patients with dilated cardiomyopathy and mild and moderate left ventricular systolic
3456 dysfunction. *Circulation* 2017;135:2106_2115.

3457 462. Kazmirczak F, Chen KA, Adabag S, von Wald L, Roukoz H, Benditt DG, Okasha O,
3458 Farzaneh-Far A, Markowitz J, Nijjar PS, Velangi PS, Bhargava M, Perlman D, Duval S,
3459 Akcakaya M, Shenoy C. Assessment of the 2017 AHA/ACC/HRS Guideline
3460 Recommendations for Implantable Cardioverter-Defibrillator Implantation in Cardiac
3461 Sarcoidosis. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2019;12:e007488.

3462 463. Aquaro GD, Perfetti M, Camastra G, Monti L, Dellegrottaglie S, Moro C, Pepe A,
3463 Todiere G, Lanzillo C, Scatteia A, Di Roma M, Pontone G, Perazzolo Marra M, Barison A, Di
3464 Bella G. Cardiac MR with late gadolinium enhancement in acute myocarditis with preserved
3465 systolic function: ITAMY Study. *J Am Coll Cardiol* 2017;70:1977_1987.

3466 464. Ferreira VM, Schulz-Menger J, Holmvang G, Kramer CM, Carbone I, Sechtem U,
3467 Kindermann I, Gutberlet M, Cooper LT, Liu P, Friedrich MG. Cardiovascular magnetic
3468 resonance in nonischemic myocardial inflammation: expert recommendations. *J Am Coll*
3469 *Cardiol* 2018;72:3158_3176.

3470 465. Kandolin R, Lehtonen J, Kupari M. Cardiac sarcoidosis and giant cell myocarditis as
3471 causes of atrioventricular block in young and middle-aged adults. *Circ Arrhythm*
3472 *Electrophysiol* 2011;4:303_309.

3473 466. Grimm W, Hoffmann J, Menz V, Kohler U, Heitmann J, Peter JH, Maisch B.
3474 Electrophysiologic evaluation of sinus node function and atrioventricular conduction in patients
3475 with prolonged ventricular asystole during obstructive sleep apnea. *Am J Cardiol*
3476 1996;77:1310_1314. 102. Zwillich C, Devlin T, White D, Douglas N, Weil J, Martin R.
3477 Bradycardia during sleep apnea. Characteristics and mechanism. *J Clin Invest*
3478 1982;69:1286_1292.

3479 467. Guilleminault C, Pool P, Motta J, Gillis AM. Sinus arrest during REM sleep in young
3480 adults. *N Engl J Med* 1984;311:1006_1010.

3481 468. Simantirakis EN, Schiza SI, Marketou ME, Chrysostomakis SI, Chlouverakis GI,
3482 Klapsinos NC, Siafakas NS, Vardas PE. Severe bradyarrhythmias in patients with sleep
3483 apnoea: the effect of continuous positive airway pressure treatment: a long-term evaluation
3484 using an insertable loop recorder. *Eur Heart J* 2004;25:1070_1076.

3485 469. Savonen KP, Kiviniemi V, Laukkanen JA, Lakka TA, Rauramaa TH, Salonen JT,
3486 Rauramaa R. Chronotropic incompetence and mortality in middle-aged men with known or
3487 suspected coronary heart disease. *Eur Heart J* 2008;29:1896_1902.

3488 470. Brignole M, Moya A, de Lange FJ, Deharo JC, Elliott PM, Fanciulli A, Fedorowski A,
3489 Furlan R, Kenny RA, Martin A, Probst V, Reed MJ, Rice CP, Sutton R, Ungar A, van Dijk JG.
3490 2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope. *Eur Heart J*
3491 2018;39:1883_1948.

3492 471. Wissocq L, Ennezat PV, Mouquet F. Exercise-induced high-degree atrioventricular
3493 block. *Arch Cardiovasc Dis* 2009;102:733_735.

3494 472. Oliveros RA, Seaworth J, Weiland FL, Boucher CA. Intermittent left anterior hemiblock
3495 during treadmill exercise test. Correlation with coronary arteriogram. *Chest* 1977;72:492_494.

3496 473. Solari D, Maggi R, Oddone D, Solano A, Croci F, Donateo P, Wieling W, Brignole M.
3497 Assessment of the vasodepressor reflex in carotid sinus syndrome. *Circ Arrhythm*
3498 *Electrophysiol* 2014;7:505_510. 65.

3499 474. Ackerman MJ, Priori SG, Willems S, Berul C, Brugada R, Calkins H, Camm AJ, Ellinor
3500 PT, Gollob M, Hamilton R, Hershberger RE, Judge DP, Le Marec H, McKenna WJ, Schulze-
3501 Bahr E, Semsarian C, Towbin JA, Watkins H, Wilde A, Wolpert C, Zipes DP. HRS/EHRA
3502 expert consensus statement on the state of genetic testing for the channelopathies and
3503 cardiomyopathies. *Heart Rhythm* 2011;8:1308_1339.

3504 475. Ishikawa T, Tsuji Y, Makita N. Inherited bradyarrhythmia: a diverse genetic background.
3505 *J Arrhythm* 2016;32:352_358.

3506 476. Smits JP, Veldkamp MW, Wilde AA. Mechanisms of inherited cardiac conduction
3507 disease. *Europace* 2005;7:122_137.

3508 477. Priori SG, Wilde AA, Horie M, Cho Y, Behr ER, Berul C, Blom N, Brugada J, Chiang
3509 CE, Huikuri H, Kannankeril P, Krahn A, Leenhardt A, Moss A, Schwartz PJ, Shimizu W,
3510 Tomaselli G, Tracy C. HRS/EHRA/APHRS expert consensus statement on the diagnosis and
3511 management of patients with inherited primary arrhythmia syndromes: document endorsed by
3512 HRS, EHRA, and APHRS in May 2013 and by ACCF, AHA, PACES, and AEPC in June
3513 2013. *Heart Rhythm* 2013;10:1932_1963.

3514 478. Da Costa A, Defaye P, Romeyer-Bouchard C, Roche F, Dauphinot V, Deharo JC, Jacon
3515 P, Lamaison D, Bathelemy JC, Isaaz K, Laurent G. Clinical impact of the implantable loop
3516 recorder in patients with isolated syncope, bundle branch block and negative workup: a
3517 randomized multicentre prospective study. *Arch Cardiovasc Dis* 2013;106:146_154.

- 3518 479. Podoleanu C, DaCosta A, Defaye P, Taieb J, Galley D, Bru P, Maury P, Mabo P, Boveda
3519 S, Cellarier G, Anselme F, Kouakam C, Delarche N, Deharo JC. Early use of an implantable
3520 loop recorder in syncope evaluation: a randomized study in the context of the French healthcare
3521 system (FRESH study). *Arch Cardiovasc Dis* 2014;107:546_552.
- 3522 480. Sulke N, Sugihara C, Hong P, Patel N, Freemantle N. The benefit of a remotely
3523 monitored implantable loop recorder as a first line investigation in unexplained syncope: the
3524 EaSyAS II trial. *Europace* 2016;18:912_918.
- 3525 481. Gann D, Tolentino A, Samet P. Electrophysiologic evaluation of elderly patients with
3526 sinus bradycardia: a long-term follow-up study. *Ann Intern Med* 1979;90:24_29.
- 3527 482. McAnulty JH, Rahimtoola SH, Murphy E, DeMots H, Ritzmann L, Kanarek PE,
3528 Kauffman S. Natural history of ‘high-risk’ bundle-branch block: final report of a prospective
3529 study. *N Engl J Med* 1982;307:137_143.
- 3530 483. Gronda M, Magnani A, Occhetta E, Sauro G, D’Aulerio M, Carfora A, Rossi P.
3531 Electrophysiological study of atrio-ventricular block and ventricular conduction defects.
3532 Prognostic and therapeutical implications. *G Ital Cardiol* 1984;14:768_773.
- 3533 484. Bergfeldt L, Edvardsson N, Rosenqvist M, Vallin H, Edhag O. Atrioventricular block
3534 progression in patients with bifascicular block assessed by repeated electrocardiography and a
3535 bradycardia-detecting pacemaker. *Am J Cardiol* 1994;74:1129_1132.
- 3536 485. Kaul U, Dev V, Narula J, Malhotra AK, Talwar KK, Bhatia ML. Evaluation of patients
3537 with bundle branch block and ‘unexplained’ syncope: a study based on comprehensive
3538 electrophysiologic testing and ajmaline stress. *Pacing Clin Electrophysiol* 1988;11:289_297.
- 3539 486. Moya A, Garcia-Civera R, Croci F, Menozzi C, Brugada J, Ammirati F, Del Rosso A,
3540 Bellver-Navarro A, Garcia-Sacristan J, Bortnik M, Mont L, Ruiz-Granell R, Navarro X.
3541 Diagnosis, management, and outcomes of patients with syncope and bundle branch block. *Eur*
3542 *Heart J* 2011;32:1535_1541.
- 3543 487. Twidale N, Heddle WF, Tonkin AM. Procainamide administration during
3544 electrophysiology study—utility as a provocative test for intermittent atrioventricular block.
3545 *Pacing Clin Electrophysiol* 1988;11:1388_1397.
- 3546 488. Scheinman MM, Peters RW, Suave MJ, Desai J, Abbott JA, Cogan J, Wohl B, Williams
3547 K. Value of the H_Q interval in patients with bundle branch block and the role of prophylactic
3548 permanent pacing. *Am J Cardiol* 1982;50:1316_1322
- 3549 489. Tjong FVY, de Ruijter UW, Beurskens NEG, Knops RE. A comprehensive scoping
3550 review on transvenous temporary pacing therapy. *Neth Heart J* 2019;27:462_473.

- 3551 490. Bektas F, Soyuncu S. The efficacy of transcutaneous cardiac pacing in ED. *Am J Emerg*
3552 *Med* 2016;34:2090_2093.
- 3553 491. Quast ABE, Beurskens NEG, Ebner A, Wasley R, Vehmeijer JT, Marcovecchio A,
3554 Sanghera R, Knops RE, Burke MC. Feasibility of an entirely extracardiac, minimally invasive,
3555 temporary pacing system. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2019;12:e007182.
- 3556 492. Polyzos KA, Konstantelias AA, Falagas ME. Risk factors for cardiac implantable
3557 electronic device infection: a systematic review and meta-analysis. *Europace* 2015;17:767_777.
- 3558 493. Rastan AJ, Doll N, Walther T, Mohr FW. Pacemaker dependent patients with device
3559 infection—a modified approach. *Eur J Cardiothorac Surg* 2005;27:1116_1118.
- 3560 494. Kawata H, Pretorius V, Phan H, Mulpuru S, Gadiyaram V, Patel J, Steltzner D, Krummen
3561 D, Feld G, Birgersdotter-Green U. Utility and safety of temporary pacing using active fixation
3562 leads and externalized re-usable permanent pacemakers after lead extraction. *Europace*
3563 2013;15:1287_1291.
- 3564 495. Dwamena F, Holmes-Rovner M, Gaulden CM, Jorgenson S, Sadigh G, Sikorskii A,
3565 Lewin S, Smith RC, Coffey J, Olomu A. Interventions for providers to promote a patient-
3566 centred approach in clinical consultations. *Cochrane Database Syst Rev* 2012;12:Cd003267.
- 3567 496. Olsson LE, Jakobsson Ung E, Swedberg K, Ekman I. Efficacy of person-centred care as
3568 an intervention in controlled trials—a systematic review. *J Clin Nurs* 2013;22:456_465.
- 3569 497. McMillan SS, Kendall E, Sav A, King MA, Whitty JA, Kelly F, Wheeler AJ.
3570 Patientcentered approaches to health care: a systematic review of randomized controlled trials.
3571 *Med Care Res Rev* 2013;70:567_596.
- 3572 498. Ekman I, Wolf A, Olsson LE, Taft C, Dudas K, Schaufelberger M, Swedberg K. Effects
3573 of person-centred care in patients with chronic heart failure: the PCCHF study. *Eur Heart J*
3574 2012;33:1112_1119.
- 3575 499. Ulin K, Olsson LE, Wolf A, Ekman I. Person-centred care—an approach that improves
3576 the discharge process. *Eur J Cardiovasc Nurs* 2016;15:e19_e26.
- 3577 500. Dudas K, Olsson LE, Wolf A, Swedberg K, Taft C, Schaufelberger M, Ekman I.
3578 Uncertainty in illness among patients with chronic heart failure is less in person-centred care
3579 than in usual care. *Eur J Cardiovasc Nurs* 2013;12:521_528.
- 3580 501. Auricchio A, Ellenbogen KA. Reducing ventricular pacing frequency in patients with
3581 atrioventricular block: is it time to change the current pacing paradigm? *Circ Arrhythm*
3582 *Electrophysiol* 2016;9:e004404.
- 3583 502. Stockburger M, Boveda S, Moreno J, Da Costa A, Hatala R, Brachmann J, Butter C,
3584 Garcia Seara J, Rolando M, Defaye P. Long-term clinical effects of ventricular pacing

3585 reduction with a changeover mode to minimize ventricular pacing in a general pacemaker
3586 population. *Eur Heart J* 2015;36:151_157.

3587 503. Boriani G, Tukkie R, Manolis AS, Mont L, Purerfellner H, Santini M, Inama G, Serra P,
3588 de Sousa J, Botto GL, Mangoni L, Grammatico A, Padeletti L, MINERVA Investigators.
3589 Atrial antitachycardia pacing and managed ventricular pacing in bradycardia patients with
3590 paroxysmal or persistent atrial tachyarrhythmias: the MINERVA randomized multicentre
3591 international trial. *Eur Heart J* 2014;35:2352_2362.

3592 504. Stockburger M, Gomez-Doblas JJ, Lamas G, Alzueta J, Fernandez-Lozano I, Cobo E,
3593 Wiegand U, Concha JF, Navarro X, Navarro-Lopez F, de Teresa E. Preventing ventricular
3594 dysfunction in pacemaker patients without advanced heart failure: results from a multicentre
3595 international randomized trial (PREVENT-HF). *Eur J Heart Fail* 2011;13:633_641.

3596 505. Stockburger M, Defaye P, Boveda S, Stancak B, Lazarus A, Sipotz J, Nardi S, Rolando
3597 M, Moreno J. Safety and efficiency of ventricular pacing prevention with an AAI-DDD
3598 changeover mode in patients with sinus node disease or atrioventricular block: impact on
3599 battery longevity—a sub-study of the ANSWER trial. *Europace* 2016;18:739_746.

3600 506. Thibault B, Simpson C, Gagne CE, Blier L, Senaratne M, McNicoll S, Stuglin C,
3601 Williams R, Pinter A, Khaykin Y, Nitzsche R. Impact of AV conduction disorders on SafeR
3602 mode performance. *Pacing Clin Electrophysiol* 2009;32 Suppl 1:S231_235.

3603 507. Thibault B, Ducharme A, Baranchuk A, Dubuc M, Dyrda K, Guerra PG, Macle L,
3604 Mondesert B, Rivard L, Roy D, Talajic M, Andrade J, Nitzsche R, Khairy P, CAN-SAVE R
3605 Study Investigators. Very low ventricular pacing rates can be achieved safely in a
3606 heterogeneous pacemaker population and provide clinical benefits: the CANadian Multi-Centre
3607 Randomised Study-Spontaneous AtrioVentricular Conduction pReservation (CAN-SAVE R)
3608 Trial. *J Am Heart Assoc* 2015;4:e001983

3609 508. Bellocci F, Spampinato A, Ricci R, Puglisi A, Capucci A, Dini P, Boriani G, Botto G,
3610 Curnis A, Moracchini PV, Nicotra G, Lisi F, Nigro P. Antiarrhythmic benefits of dual chamber
3611 stimulation with rate-response in patients with paroxysmal atrial fibrillation and chronotropic
3612 incompetence: a prospective, multicentre study. *Europace* 1999;1:220_225.

3613 509. Santini M, Ricci R, Puglisi A, Mangiameli S, Proclemer A, Menozzi C, De Fabrizio G,
3614 Leoni G, Lisi F, De Seta F. Long-term haemodynamic and antiarrhythmic benefits of DDIR
3615 versus DDI pacing mode in sick sinus syndrome and chronotropic incompetence. *G Ital Cardiol*
3616 1997;27:892_900.

3617 510. Calkins H, Hindricks G, Cappato R, Kim YH, Saad EB, Aguinaga L, Akar JG, Badhwar
3618 V, Brugada J, Camm J, Chen PS, Chen SA, Chung MK, Cosedis Nielsen J, Curtis AB, Davies

3619 DW, Day JD, d'Avila A, Natasja de Groot NMS, Di Biase L, Duytschaever M, Edgerton JR,
3620 Ellenbogen KA, Ellinor PT, Ernst S, Fenelon G, Gerstenfeld EP, Haines DE, Haissaguerre M,
3621 Helm RH, Hylek E, Jackman WM, Jalife J, Kalman JM, Kautzner J, Kottkamp H, Kuck KH,
3622 Kumagai K, Lee R, Lewalter T, Lindsay BD, Macle L, Mansour M, Marchlinski FE, Michaud
3623 GF, Nakagawa H, Natale A, Nattel S, Okumura K, Packer D, Pokushalov E, Reynolds MR,
3624 Sanders P, Scanavacca M, Schilling R, Tondo C, Tsao HM, Verma A, Wilber DJ, Yamane T,
3625 Document Reviewers. 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE expert consensus
3626 statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation. *Europace* 2018;20:e1_e160.
3627 511. Chen YW, Bai R, Lin T, Salim M, Sang CH, Long DY, Yu RH, Tang RB, Guo XY, Yan
3628 XL, Nie JG, Du X, Dong JZ, Ma CS. Pacing or ablation: which is better for paroxysmal atrial
3629 fibrillation-related tachycardia-bradycardia syndrome? *Pacing Clin Electrophysiol*
3630 2014;37:403_411.

3631 512. Inada K, Yamane T, Tokutake K, Yokoyama K, Mishima T, Hioki M, Narui R, Ito K,
3632 Tanigawa S, Yamashita S, Tokuda M, Matsuo S, Shibayama K, Miyanaga S, Date T, Sugimoto
3633 K, Yoshimura M. The role of successful catheter ablation in patients with paroxysmal atrial
3634 fibrillation and prolonged sinus pauses: outcome during a 5-year follow-up. *Europace*
3635 2014;16:208_213.

3636 513. Fleischmann KE, Orav EJ, Lamas GA, Mangione CM, Schron E, Lee KL, Goldman L.
3637 Pacemaker implantation and quality of life in the Mode Selection Trial (MOST). *Heart Rhythm*
3638 2006;3:653_659.

3639 514. Capucci A, Boriani G, Specchia S, Marinelli M, Santarelli A, Magnani B. Evaluation by
3640 cardiopulmonary exercise test of DDDR versus DDD pacing. *Pacing Clin Electrophysiol*
3641 1992;15:1908_1913.

3642 515. Lamas GA, Knight JD, Sweeney MO, Mianulli M, Jorapur V, Khalighi K, Cook JR,
3643 Silverman R, Rosenthal L, Clapp-Channing N, Lee KL, Mark DB. Impact of ratemodulated
3644 pacing on quality of life and exercise capacity—evidence from the Advanced Elements of
3645 Pacing Randomized Controlled Trial (ADEPT). *Heart Rhythm* 2007;4:1125_1132.

3646 516. Hocini M, Sanders P, Deisenhofer I, Jais P, Hsu LF, Scavee C, Weerasoriya R, Raybaud
3647 F, Macle L, Shah DC, Garrigue S, Le Metayer P, Clementy J, Haissaguerre M. Reverse
3648 remodeling of sinus node function after catheter ablation of atrial fibrillation in patients with
3649 prolonged sinus pauses. *Circulation* 2003;108:1172_1175.

3650 517. Inada K, Yamane T, Tokutake K, Yokoyama K, Mishima T, Hioki M, Narui R, Ito K,
3651 Tanigawa S, Yamashita S, Tokuda M, Matsuo S, Shibayama K, Miyanaga S, Date T, Sugimoto
3652 K, Yoshimura M. The role of successful catheter ablation in patients with paroxysmal atrial

3653 fibrillation and prolonged sinus pauses: outcome during a 5-year follow-up. *Europace*
3654 2014;16:208_213.

3655 518. Jackson LR, 2nd, Rathakrishnan B, Campbell K, Thomas KL, Piccini JP, Bahnson T,
3656 Stiber JA, Daubert JP. Sinus node dysfunction and atrial fibrillation: a reversible phenomenon?
3657 *Pacing Clin Electrophysiol* 2017;40:442_450.

3658 519. Boriani G, Tukkie R, Manolis AS, Mont L, Purerfellner H, Santini M, Inama G, Serra P,
3659 de Sousa J, Botto GL, Mangoni L, Grammatico A, Padeletti L, MINERVA Investigators. Atrial
3660 antitachycardia pacing and managed ventricular pacing in bradycardia patients with paroxysmal
3661 or persistent atrial tachyarrhythmias: the MINERVA randomized multicentre international trial.
3662 *Eur Heart J* 2014;35:2352_2362.

3663 520. Crossley GH, Padeletti L, Zweibel S, Hudnall JH, Zhang Y, Boriani G. Reactive atrial-
3664 based antitachycardia pacing therapy reduces atrial tachyarrhythmias. *Pacing Clin*
3665 *Electrophysiol* 2019;42:970_979.

3666 521. Brignole M, Menozzi C, Moya A, Andresen D, Blanc JJ, Krahn AD, Wieling W, Beiras
3667 X, Deharo JC, Russo V, Tomaino M, Sutton R, International Study on Syncope of Uncertain
3668 Etiology Investigators. Pacemaker therapy in patients with neurally mediated syncope and
3669 documented asystole: Third International Study on Syncope of Uncertain Etiology (ISSUE-3):
3670 a randomized trial. *Circulation* 2012;125:2566_2571.

3671 522. Lau CP, Rushby J, Leigh-Jones M, Tam CY, Poloniecki J, Ingram A, Sutton R, Camm
3672 AJ. Symptomatology and quality of life in patients with rate-responsive pacemakers: a double-
3673 blind, randomized, crossover study. *Clin Cardiol* 1989;12:505_512.

3674 523. Leung SK, Lau CP. Developments in sensor-driven pacing. *Cardiol Clin*
3675 2000;18:113_155, ix. 203. Oto MA, Muderrisoglu H, Ozin MB, Korkmaz ME,
3676 Karamehmetoglu A, Oram A, Oram E, Ugurlu S. Quality of life in patients with rate responsive
3677 pacemakers: a randomized, cross-over study. *Pacing Clin Electrophysiol* 1991;14:800_806.

3678 524. Proietti R, Manzoni G, Di Biase L, Castelnuovo G, Lombardi L, Fundaro C, Vegliante N,
3679 Pietrabissa G, Santangeli P, Canby RA, Sagone A, Viecca M, Natale Closed loop stimulation is
3680 effective in improving heart rate and blood pressure response to mental stress: report of a
3681 single-chamber pacemaker study in patients with chronotropic incompetent atrial fibrillation.
3682 *Pacing Clin Electrophysiol* 2012;35:990_998.

3683 525. Shaw DB, Gowers JI, Kekwick CA, New KH, Whistance AW. Is Mobitz type I
3684 atrioventricular block benign in adults? *Heart* 2004;90:169_174.

3685 526. Coumbe AG, Naksuk N, Newell MC, Somasundaram PE, Benditt DG, Adabag S. Long-
3686 term follow-up of older patients with Mobitz type I second degreeatrioventricular block. *Heart*
3687 2013;99:334_338.

3688 527. Barold SS. Indications for permanent cardiac pacing in first-degree AV block: class I, II,
3689 or III? *Pacing Clin Electrophysiol* 1996;19:747_751.

3690 528. Brecker SJ, Xiao HB, Sparrow J, Gibson DG. Effects of dual-chamber pacing with short
3691 atrioventricular delay in dilated cardiomyopathy. *Lancet*1992;340:1308_1312.

3692 529. Carroz P, Delay D, Girod G. Pseudo-pacemaker syndrome in a young woman with first-
3693 degree atrio-ventricular block. *Europace* 2010;12:594_596.

3694 530. Santini M, Castro A, Giada F, Ricci R, Inama G, Gaggioli G, Calo L, Orazi S, Viscusi M,
3695 Chiodi L, Bartoletti A, Foglia-Manzillo G, Ammirati F, Loricchio ML, Pedrinazzi C, Turreni F,
3696 Gasparini G, Accardi F, Raciti G, Raviele A. Prevention of syncope through permanent cardiac
3697 pacing in patients with bifascicular blockand syncope of unexplained origin: the PRESS study.
3698 *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2013;6:101_107.

3699 531. Olshansky B, Day JD, Sullivan RM, Yong P, Galle E, Steinberg JS. Does cardiac
3700 resynchronization therapy provide unrecognized benefit in patients with prolonged PR
3701 intervals? The impact of restoring atrioventricular synchrony: an analysis from the
3702 COMPANION Trial. *Heart Rhythm* 2012;9:34_39.

3703 532. Gervais R, Leclercq C, Shankar A, Jacobs S, Eiskjaer H, Johannessen A, Freemantle N,
3704 Cleland JG, Tavazzi L, Daubert C, CARE-HF investigators. Surface electrocardiogram to
3705 predict outcome in candidates for cardiac resynchronization therapy: a sub-analysis of the
3706 CARE-HF trial. *Eur J Heart Fail* 2009;11:699_705.

3707 533. Friedman DJ, Bao H, Spatz ES, Curtis JP, Daubert JP, Al-Khatib SM. Association
3708 Between a Prolonged PR interval and outcomes of cardiac resynchronization therapy: a report
3709 from the National Cardiovascular Data Registry. *Circulation* 2016;134:1617_1628.

3710 534. Leclercq C, Kass DA. Retiming the failing heart: principles and current clinical status of
3711 cardiac resynchronization. *J Am Coll Cardiol* 2002;39:194_201.

3712 535. Leclercq C, Hare JM. Ventricular resynchronization: current state of the art. *Circulation*
3713 2004;109:296_299.

3714 536. Cunningham C, Kwok CS, Satchithananda DK, Patwala A, Khan MA, Zaidi A, Ahmed
3715 FZ, Mamas MA. Cardiac resynchronisation therapy is not associated with a reduction in
3716 mortality or heart failure hospitalisation in patients with non-left bundle branch block QRS
3717 morphology: meta-analysis of randomized controlled trials. *Heart* 2015;101:1456_1462.

3718 537. Zareba W, Klein H, Cygankiewicz I, Hall WJ, McNitt S, Brown M, Cannom D, Daubert
3719 JP, Eldar M, Gold MR, Goldberger JJ, Goldenberg I, Lichstein E, Pitschner H, Rashtian M,
3720 Solomon S, Viskin S, Wang P, Moss AJ. Effectiveness of cardiac resynchronization therapy by
3721 QRS morphology in the Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial-Cardiac
3722 Resynchronization Therapy (MADIT-CRT). *Circulation* 2011;123:1061_1072.

3723 538. Birnie DH, Ha A, Higginson L, Sidhu K, Green M, Philippon F, Thibault B, Wells G,
3724 Tang A. Impact of QRS morphology and duration on outcomes after cardiac resynchronization
3725 therapy: results from the Resynchronization-Defibrillation for Ambulatory Heart Failure Trial
3726 (RAFT). *Circ Heart Fail* 2013;6:1190_1198.

3727 539. Bilchick KC, Kamath S, DiMarco JP, Stukenborg GJ. Bundle-branch block morphology
3728 and other predictors of outcome after cardiac resynchronization therapy in Medicare patients.
3729 *Circulation* 2010;122:2022_2030.

3730 540. Woods B, Hawkins N, Mealing S, Sutton A, Abraham WT, Beshai JF, Klein H, Sculpher
3731 M, Plummer CJ, Cowie MR. Individual patient data network metaanalysis of mortality effects
3732 of implantable cardiac devices. *Heart* 2015;101:1800_1806.

3733 541. Gold MR, Thebault C, Linde C, Abraham WT, Gerritse B, Ghio S, St John Sutton M,
3734 Daubert JC. Effect of QRS duration and morphology on cardiac resynchronization therapy
3735 outcomes in mild heart failure: results from the Resynchronization Reverses Remodeling in
3736 Systolic Left Ventricular Dysfunction (REVERSE) study. *Circulation* 2012;126:822_829.

3737 542. Fantoni C, Kawabata M, Massaro R, Regoli F, Raffa S, Arora V, Salerno-Uriarte JA,
3738 Klein HU, Auricchio A. Right and left ventricular activation sequence in patients with heart
3739 failure and right bundle branch block: a detailed analysis using three-dimensional non-
3740 fluoroscopic electroanatomic mapping system. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2005;16:112_119;
3741 discussion 120_121.

3742 543. Nery PB, Ha AC, Keren A, Birnie DH. Cardiac resynchronization therapy in patients
3743 with left ventricular systolic dysfunction and right bundle branch block: a systematic review.
3744 *Heart Rhythm* 2011;8:1083_1087.

3745 544. Kutiyifa V, Stockburger M, Daubert JP, Holmqvist F, Olshansky B, Schuger C, Klein H,
3746 Goldenberg I, Brenyo A, McNitt S, Merkely B, Zareba W, Moss AJ. PR interval identifies
3747 clinical response in patients with non-left bundle branch block: a Multicenter Automatic
3748 Defibrillator Implantation Trial-Cardiac Resynchronization Therapy substudy. *Circ Arrhythm
3749 Electrophysiol* 2014;7:645_651.

3750 545. Kewcharoen J, Kanitsoraphan C. Prolonged PR interval and outcome in cardiac
3751 resynchronization therapy. *Arq Bras Cardiol* 2019;113:109_110.

3752 546. Caputo ML, van Stipdonk A, Illner A, D'Ambrosio G, Regoli F, Conte G, Moccetti T,
3753 Klersy C, Prinzen FW, Vernooy K, Auricchio A. The definition of left bundle branch block
3754 influences the response to cardiac resynchronization therapy. *Int J Cardiol* 2018;269:165_169.

3755 547. Van Stipdonk AMW, Vanbelle S, Ter Horst IAH, Luermans JG, Meine M, Maass AH,
3756 Auricchio A, Prinzen FW, Vernooy K. Large variability in clinical judgement and definitions
3757 of left bundle branch block to identify candidates for cardiac resynchronisation therapy. *Int J*
3758 *Cardiol* 2019;286:61_65.

3759 548. Tomlinson DR, Bashir Y, Betts TR, Rajappan K. Accuracy of manual QRS duration
3760 assessment: its importance in patient selection for cardiac resynchronization and implantable
3761 cardioverter defibrillator therapy. *Europace* 2009;11:638_642.

3762 549. Vancura V, Wichterle D, Ulc I, Smid J, Brabec M, Zarybnicka M, Rokyta R. The
3763 variability of automated QRS duration measurement. *Europace* 2017;19:636_643.

3764 550. Tang AS, Wells GA, Talajic M, Arnold MO, Sheldon R, Connolly S, Hohnloser SH,
3765 Nichol G, Birnie DH, Sapp JL, Yee R, Healey JS, Rouleau JL. Cardiac-resynchronization
3766 therapy for mild-to-moderate heart failure. *N Engl J Med* 2010;363:2385_2395.

3767 551. Cleland JG, Daubert JC, Erdmann E, Freemantle N, Gras D, Kappenberger L, Tavazzi L.
3768 The effect of cardiac resynchronization on morbidity and mortality in heart failure. *N Engl J*
3769 *Med* 2005;352:1539_1549.

3770 552. Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS, Klein H, Brown MW, Daubert JP, Estes NA 3rd, Foster
3771 E, Greenberg H, Higgins SL, Pfeffer MA, Solomon SD, Wilber D, Zareba W, MADIT-CRT
3772 Trial Investigators. Cardiac-resynchronization therapy for the prevention of heart-failure
3773 events. *N Engl J Med* 2009;361:1329_1338.

3774 553. Auricchio A, Stellbrink C, Sack S, Block M, Vogt J, Bakker P, Huth C, Schondube F,
3775 Wolfhard U, Bocker D, Krahnefeld O, Kirkels H. Long-term clinical effect of
3776 hemodynamically optimized cardiac resynchronization therapy in patients with heart failure
3777 and ventricular conduction delay. *J Am Coll Cardiol* 2002;39:2026_2033.

3778 554. Auricchio A, Stellbrink C, Butter C, Sack S, Vogt J, Misier AR, Bocker D, Block M,
3779 Kirkels JH, Kramer A, Huvelle E. Clinical efficacy of cardiac resynchronization therapy using
3780 left ventricular pacing in heart failure patients stratified by severity of ventricular conduction
3781 delay. *J Am Coll Cardiol* 2003;42:2109_2116.

3782 555. Cazeau S, Leclercq C, Lavergne T, Walker S, Varma C, Linde C, Garrigue S,
3783 Kappenberger L, Haywood GA, Santini M, Bailleul C, Daubert JC. Effects of multisite
3784 biventricular pacing in patients with heart failure and intraventricular conduction delay. *N Engl*
3785 *J Med* 2001;344:873_880.

3786 556. Linde C, Leclercq C, Rex S, Garrigue S, Lavergne T, Cazeau S, McKenna W, Fitzgerald
3787 M, Deharo JC, Alonso C, Walker S, Braunschweig F, Bailleul C, Daubert JC. Long-term
3788 benefits of biventricular pacing in congestive heart failure: results from the MULTISITE
3789 STimulation in cardiomyopathy (MUSTIC) study. *J Am Coll Cardiol* 2002;40:111_118.

3790 557. Abraham WT, Fisher WG, Smith AL, Delurgio DB, Leon AR, Loh E, Kocovic DZ,
3791 Packer M, Clavell AL, Hayes DL, Ellestad M, Trupp RJ, Underwood J, Pickering F, Truex C,
3792 McAtee P, Messenger J. Cardiac resynchronization in chronic heart failure. *N Engl J Med*
3793 2002;346:1845_1853.

3794 558. Abraham WT, Young JB, Leon AR, Adler S, Bank AJ, Hall SA, Lieberman R, Liem LB,
3795 O'Connell JB, Schroeder JS, Wheelan KR. Effects of cardiac resynchronization on disease
3796 progression in patients with left ventricular systolic dysfunction, an indication for an
3797 implantable cardioverter-defibrillator, and mildly symptomatic chronic heart failure.
3798 *Circulation* 2004;110:2864_2868.

3799 559. Bristow MR, Saxon LA, Boehmer J, Krueger S, Kass DA, De Marco T, Carson P,
3800 DiCarlo L, DeMets D, White BG, DeVries DW, Feldman AM. Cardiac-resynchronization
3801 therapy with or without an implantable defibrillator in advanced chronic heart failure. *N Engl J*
3802 *Med* 2004;350:2140_2150.

3803 560. Cleland JG, Daubert JC, Erdmann E, Freemantle N, Gras D, Kappenberger L, Tavazzi L.
3804 Longer-term effects of cardiac resynchronization therapy on mortality in heart failure [the
3805 CARDiac RESynchronization-Heart Failure (CARE-HF) trial extension phase]. *Eur Heart J*
3806 2006;27:1928_1932.

3807 561. Linde C, Abraham WT, Gold MR, St John Sutton M, Ghio S, Daubert C. Randomized
3808 trial of cardiac resynchronization in mildly symptomatic heart failure patients and in
3809 asymptomatic patients with left ventricular dysfunction and previous heart failure symptoms. *J*
3810 *Am Coll Cardiol* 2008;52:1834_1843.

3811 562. Daubert C, Gold MR, Abraham WT, Ghio S, Hassager C, Goode G, Szili-Torok T, Linde
3812 C. Prevention of disease progression by cardiac resynchronization therapy in patients with
3813 asymptomatic or mildly symptomatic left ventricular dysfunction: insights from the European
3814 cohort of the REVERSE (Resynchronization Reverses Remodeling in Systolic Left Ventricular
3815 Dysfunction) trial. *J Am Coll Cardiol* 2009;54:1837_1846.

3816 563. Ruschitzka F, Abraham WT, Singh JP, Bax JJ, Borer JS, Brugada J, Dickstein K, Ford I,
3817 Gorcsan J 3rd, Gras D, Krum H, Sogaard P, Holzmeister J. Cardiac resynchronization therapy in
3818 heart failure with a narrow QRS complex. *N Engl J Med* 2013;369:1395_1405.

3819 564. Goldenberg I, Kutiyifa V, Moss AJ. Survival with cardiac-resynchronization therapy. *N*
3820 *Engl J Med* 2014;371:477_478.

3821 565. Cleland JG, Abraham WT, Linde C, Gold MR, Young JB, Claude Daubert J, Sherfese L,
3822 Wells GA, Tang AS. An individual patient meta-analysis of five randomized trials assessing
3823 the effects of cardiac resynchronization therapy on morbidity and mortality in patients with
3824 symptomatic heart failure. *Eur Heart J* 2013;34:3547_3556.

3825 566. Zusterzeel R, Selzman KA, Sanders WE, Canos DA, O'Callaghan KM, Carpenter JL,
3826 Pina IL, Strauss DG. Cardiac resynchronization therapy in women:US Food and Drug
3827 Administration meta-analysis of patient-level data. *JAMA Intern Med* 2014;174:1340_1348.

3828 567. Zweerink A, Friedman DJ, Klem I, van de Ven PM, Vink C, Biesbroek PS, Hansen SM,
3829 Emerek K, Kim RJ, van Rossum AC, Atwater BD, Nijveldt R, Allaart CP. Size Matters:
3830 Normalization of QRS duration to left ventricular dimension improves prediction of long-term
3831 cardiac resynchronization therapy outcome. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2018;11:e006767.

3832 568. Birnie DH, Ha A, Higginson L, Sidhu K, Green M, Philippon F, Thibault B, Wells G,
3833 Tang A. Impact of QRS morphology and duration on outcomes after cardiac resynchronization
3834 therapy: results from the Resynchronization-Defibrillation for Ambulatory Heart Failure Trial
3835 (RAFT). *Circ Heart Fail* 2013;6:1190_1198.

3836 569. Bilchick KC, Kamath S, DiMarco JP, Stukenborg GJ. Bundle-branch block morphology
3837 and other predictors of outcome after cardiac resynchronization therapy in Medicare patients.
3838 *Circulation* 2010;122:2022_2030.

3839 570. Woods B, Hawkins N, Mealing S, Sutton A, Abraham WT, Beshai JF, Klein H, Sculpher
3840 M, Plummer CJ, Cowie MR. Individual patient data network metaanalysis of mortality effects
3841 of implantable cardiac devices. *Heart* 2015;101:1800_1806.

3842 571. Gold MR, Thebault C, Linde C, Abraham WT, Gerritse B, Ghio S, St John Sutton M,
3843 Daubert JC. Effect of QRS duration and morphology on cardiac resynchronization therapy
3844 outcomes in mild heart failure: results from the Resynchronization Reverses Remodeling in
3845 Systolic Left Ventricular Dysfunction (REVERSE) study. *Circulation* 2012;126:822_829.

3846 572. Fantoni C, Kawabata M, Massaro R, Regoli F, Raffa S, Arora V, Salerno-Uriarte JA,
3847 Klein HU, Auricchio A. Right and left ventricular activation sequence in patients with heart
3848 failure and right bundle branch block: a detailed analysis using three-dimensional non-
3849 fluoroscopic electroanatomic mapping system. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2005;16:112_119;
3850 discussion 120_121.

3851 573. Nery PB, Ha AC, Keren A, Birnie DH. Cardiac resynchronization therapy in patients
3852 with left ventricular systolic dysfunction and right bundle branch block:a systematic review.
3853 Heart Rhythm 2011;8:1083_1087.

3854 574. Steffel J, Robertson M, Singh JP, Abraham WT, Bax JJ, Borer JS, Dickstein K, Ford I,
3855 Gorcsan J 3rd, Gras D, Krum H, Sogaard P, Holzmeister J, Brugada J, Ruschitzka F. The effect
3856 of QRS duration on cardiac resynchronization therapy in patients with a narrow QRS complex:
3857 a subgroup analysis of the EchoCRT trial. Eur Heart J 2015;36:1983_1989.

3858 575. Arshad A, Moss AJ, Foster E, Padeletti L, Barsheshet A, Goldenberg I, Greenberg H,
3859 Hall WJ, McNitt S, Zareba W, Solomon S, Steinberg JS. Cardiac resynchronization therapy is
3860 more effective in women than in men: the MADIT-CRT (Multicenter Automatic Defibrillator
3861 Implantation Trial with Cardiac Resynchronization Therapy) trial. J Am Coll Cardiol
3862 2011;57:813_820.

3863 576. Gasparini M, Leclercq C, Lunati M, Landolina M, Auricchio A, Santini M, Boriani G,
3864 Lamp B, Proclemer A, Curnis A, Klersy C, Leyva F. Cardiac resynchronization therapy in
3865 patients with atrial fibrillation: the CERTIFY study (Cardiac Resynchronization Therapy in
3866 Atrial Fibrillation Patients Multinational Registry). JACC Heart Fail 2013;1:500_507

3867 577. Yin J, Hu H, Wang Y, Xue M, Li X, Cheng W, Li X, Yan S. Effects of atrioventricular
3868 nodal ablation on permanent atrial fibrillation patients with cardiac resynchronization therapy:
3869 a systematic review and meta-analysis. Clin Cardiol 2014;37:707_715.

3870 578. Tolosana JM, Arnau AM, Madrid AH, Macias A, Lozano IF, Osca J, Quesada A,
3871 Toquero J, France's RM, Bolao IG, Berruezo A, Sitges M, Alcal_a MG, Brugada J, Mont L.
3872 Cardiac resynchronization therapy in patients with permanent atrial fibrillation. Is it mandatory
3873 to ablate the atrioventricular junction to obtain a good response? Eur J Heart Fail
3874 2012;14:635_641.

3875 579. Kirchhof P, Benussi S, Kotecha D, Ahlsson A, Atar D, Casadei B, Castella M, Diener
3876 HC, Heidbuchel H, Hendriks J, Hindricks G, Manolis AS, Oldgren J, Popescu BA, Schotten U,
3877 Van Putte B, Vardas P. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation
3878 developed in collaboration with EACTS. Eur Heart J 2016;37:2893_2962

3879 580. Yin J, Hu H, Wang Y, Xue M, Li X, Cheng W, Li X, Yan S. Effects of atrioventricular
3880 nodal ablation on permanent atrial fibrillation patients with cardiac resynchronization therapy:
3881 a systematic review and meta-analysis. Clin Cardiol 2014;37:707_715.art J
3882 2016;37:2893_2962.

3883 581. Tolosana JM, Trucco E, Khatib M, Doltra A, Borrás R, Castel M, Berruezo A, Arbelo E,
3884 Sitges M, Matas M, Guasch E, Brugada J, Mont L. Complete atrioventricular block does not

3885 reduce long-term mortality in patients with permanent atrial fibrillation treated with cardiac
3886 resynchronization therapy. *Eur J Heart Fail* 2013;15:1412_1418

3887 582. Doshi RN, Daoud EG, Fellows C, Turk K, Duran A, Hamdan MH, Pires LA, PAVE
3888 Study Group. Left ventricular-based cardiac stimulation post AV nodal ablation evaluation (the
3889 PAVE study). *J Cardiovasc Electrophysiol* 2005;16:1160_1165.

3890 583. Huang W, Su L, Wu S, Xu L, Xiao F, Zhou X, Ellenbogen KA. Benefits of permanent
3891 His bundle pacing combined with atrioventricular node ablation in atrial fibrillation patients
3892 with heart failure with both preserved and reduced left ventricular ejection fraction. *J Am Heart*
3893 *Assoc* 2017;6:e005309.

3894 584. McDonagh TA, Metra M, Adamo M, Gardner RS, Baumbach A, Böhm M, Burri H,
3895 Butler J, Celutkiene J, Chioncel O, Cleland JGF, Coats AJS, Crespo-Leiro MG, Farmakis D,
3896 Gilard M, Heymans S, Hoes AW, Jaarsma T, Jankowska EA, Lainscak M, Lam CSP, Lyon
3897 AR, McMurray JJV, Mebazaa A, Mindham R, Muneretto C, Piepoli MF, Price S, Rosano
3898 GMC, Ruschitzka F, Skibelund AK; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines
3899 for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. *Eur Heart J*
3900 2021;doi:10.1093/eurheartj/ehab368.

3901 585. Yu CM, Chan JY, Zhang Q, Omar R, Yip GW, Hussin A, Fang F, Lam KH, Chan HC,
3902 Fung JW. Biventricular pacing in patients with bradycardia and normal ejection fraction. *N*
3903 *Engl J Med* 2009;361:2123_2134.

3904 586. Tang AS, Wells GA, Talajic M, Arnold MO, Sheldon R, Connolly S, Hohnloser SH,
3905 Nichol G, Birnie DH, Sapp JL, Yee R, Healey JS, Rouleau JL. Cardiac-resynchronization
3906 therapy for mild-to-moderate heart failure. *N Engl J Med* 2010;363:2385_2395

3907 587. Wilkoff BL, Cook JR, Epstein AE, Greene HL, Hallstrom AP, Hsia H, Kutalek SP,
3908 Sharma A, Dual Chamber VVI Implantable Defibrillator Trial Investigators. Dual-chamber
3909 pacing or ventricular backup pacing in patients with an implantable defibrillator: the Dual
3910 Chamber and VVI Implantable Defibrillator (DAVID) Trial. *JAMA* 2002;288:3115_3123.

3911 588. Curtis AB, Worley SJ, Adamson PB, Chung ES, Niazi I, Sherfese L, Shinn T, Sutton
3912 MS, Biventricular versus Right Ventricular Pacing in Heart Failure Patients with
3913 Atrioventricular Block Trial Investigators. Biventricular pacing for atrioventricular block and
3914 systolic dysfunction. *N Engl J Med* 2013;368:1585_1593.

3915 589. Baker CM, Christopher TJ, Smith PF, Langberg JJ, Delurgio DB, Leon AR. Addition of a
3916 left ventricular lead to conventional pacing systems in patients with congestive heart failure:
3917 feasibility, safety, and early results in 60 consecutive patients. *Pacing Clin Electrophysiol*
3918 2002;25:1166_1171.

3919 590. Valls-Bertault V, Fatemi M, Gilard M, Pennec PY, Etienne Y, Blanc JJ. Assessment of
3920 upgrading to biventricular pacing in patients with right ventricular pacing and congestive heart
3921 failure after atrioventricular junctional ablation for chronic atrial fibrillation. *Europace*
3922 2004;6:438_443.

3923 591. Eldadah ZA, Rosen B, Hay I, Edvardsen T, Jayam V, Dickfeld T, Meininger GR, Judge
3924 DP, Hare J, Lima JB, Calkins H, Berger RD. The benefit of upgrading chronically right
3925 ventricle-paced heart failure patients to resynchronization therapy demonstrated by strain rate
3926 imaging. *Heart Rhythm* 2006;3:435_442.

3927 592. Shimano M, Tsuji Y, Yoshida Y, Inden Y, Tsuboi N, Itoh T, Suzuki H, Muramatsu T,
3928 Okada T, Harata S, Yamada T, Hirayama H, Nattel S, Murohara T. Acute and chronic effects
3929 of cardiac resynchronization in patients developing heart failure with long-term pacemaker
3930 therapy for acquired complete atrioventricular block. *Europace* 2007;9:869_874.

3931 593. Laurenzi F, Achilli A, Avella A, Peraldo C, Orazi S, Perego GB, Cesario A, Valsecchi S,
3932 De Santo T, Puglisi A, Tondo C. Biventricular upgrading in patients with conventional pacing
3933 system and congestive heart failure: results and response predictors. *Pacing Clin Electrophysiol*
3934 2007;30:1096_1104.

3935 594. Vatankulu MA, Goktekin O, Kaya MG, Ayhan S, Kucukdurmaz Z, Sutton R, Henein M.
3936 Effect of long-term resynchronization therapy on left ventricular remodeling in pacemaker
3937 patients upgraded to biventricular devices. *Am J Cardiol* 2009;103:1280_1284.

3938 595. Hoiyer CJ, Meurling C, Brandt J. Upgrade to biventricular pacing in patients
3939 with conventional pacemakers and heart failure: a double-blind, randomized crossover study.
3940 *Europace* 2006;8:51_55.

3941 596. Delnoy PP, Ottervanger JP, Vos DH, Elvan A, Misier AR, Beukema WP, Steendijk P,
3942 van Hemel NM. Upgrading to biventricular pacing guided by pressure _volume loop analysis
3943 during implantation. *J Cardiovasc Electrophysiol* 2011;22:677_683.

3944 597. Van Geldorp IE, Vernooy K, Delhaas T, Prins MH, Crijns HJ, Prinzen FW, Dijkman B.
3945 Beneficial effects of biventricular pacing in chronically right ventricular paced patients with
3946 mild cardiomyopathy. *Europace* 2010;12:223_229.

3947 598. Leclercq C, Cazeau S, Lellouche D, Fossati F, Anselme F, Davy JM, Sadoul N, Klug D,
3948 Mollo L, Daubert JC. Upgrading from single chamber right ventricular to biventricular pacing
3949 in permanently paced patients with worsening heart failure: the RD-CHF Study. *Pacing Clin*
3950 *Electrophysiol* 2007;30 Suppl 1:S23_S30.

3951 599. Kosztin A, Vamos M, Aradi D, Schwertner WR, Kovacs A, Nagy KV, Zima E, Geller L,
3952 Duray GZ, Kutuyifa V, Merkely B. De novo implantation vs. upgrade cardiac resynchronization
3953 therapy: a systematic review and meta-analysis. *Heart Fail Rev* 2018;23:15_26.

3954 600. Linde CM, Normand C, Bogale N, Auricchio A, Sterlinski M, Marinskis G, Sticherling
3955 C, Bulava A, Perez OC, Maass AH, Witte KK, Rekvava R, Abdelali S, Dickstein K. Upgrades
3956 from a previous device compared to de novo cardiac resynchronization therapy in the European
3957 Society of Cardiology CRT Survey II. *Eur J Heart Fail* 2018;20:1457_1468.

3958 601. Stockburger M, Gomez-Doblas JJ, Lamas G, Alzueta J, Fernandez-Lozano I, Cobo E,
3959 Wiegand U, Concha JF, Navarro X, Navarro-Lopez F, de Teresa E. Preventing ventricular
3960 dysfunction in pacemaker patients without advanced heart failure: results from a multicentre
3961 international randomized trial (PREVENT-HF). *Eur J Heart Fail* 2011;13:633_641.
3962 *Eur J Heart Fail* 2018;20:1457_1468.

3963 602. Funck RC, Mueller HH, Lunati M, Piorkowski C, De Roy L, Paul V, Wittenberg M,
3964 Wuensch D, Blanc JJ. Characteristics of a large sample of candidates for permanent ventricular
3965 pacing included in the Biventricular Pacing for Atrioventricular Block to Prevent Cardiac
3966 Desynchronization Study (BioPace). *Europace* 2014;16:354_362.

3967 603. Yu CM, Fang F, Luo XX, Zhang Q, Azlan H, Razali O. Long-term follow-up results of
3968 the pacing to avoid cardiac enlargement (PACE) trial. *Eur J Heart Fail* 2014;16:1016_1025.

3969 604. Albertsen AE, Mortensen PT, Jensen HK, Poulsen SH, Egeblad H, Nielsen JC. Adverse
3970 effect of right ventricular pacing prevented by biventricular pacing during long-term follow-up:
3971 a randomized comparison. *Eur J Echocardiogr* 2011;12:767_772.

3972 605. Kiehl EL, Makki T, Kumar R, Gumber D, Kwon DH, Rickard JW, Kanj M, Wazni OM,
3973 Saliba WI, Varma N, Wilkoff BL, Cantillon DJ. Incidence and predictors of right ventricular
3974 pacing-induced cardiomyopathy in patients with complete atrioventricular block and preserved
3975 left ventricular systolic function. *Heart Rhythm* 2016;13:2272_2278

3976 606. Starr N, Dayal N, Domenichini G, Stettler C, Burri H. Electrical parameters with His-
3977 bundle pacing: considerations for automated programming. *Heart Rhythm* 2019;16:1817_1824.

3978 607. Burri H, Keene D, Whinnett Z, Zanon F, Vijayaraman P. Device programming for His
3979 bundle pacing. *Circ Arrhythm Electrophysiol* 2019;12:e006816.

3980 608. Sharma PS, Dandamudi G, Herweg B, Wilson D, Singh R, Naperkowski A, Koneru JN,
3981 Ellenbogen KA, Vijayaraman P. Permanent His-bundle pacing as an alternative to biventricular
3982 pacing for cardiac resynchronization therapy: a multicenter experience. *Heart Rhythm*
3983 2018;15:413_420.

3984 609. Keene D, Arnold AD, Jastrzebski M, Burri H, Zweibel S, Crespo E, Chandrasekaran B,
3985 Bassi S, Joghetaei N, Swift M, Moskal P, Francis DP, Foley P, Shun-Shin MJ, Whinnett ZI.
3986 His bundle pacing, learning curve, procedure characteristics, safety, and feasibility: insights
3987 from a large international observational study. *J Cardiovasc Electrophysiol*
3988 2019;30:1984_1993.

3989 610. Vijayaraman P, Dandamudi G, Zanon F, Sharma PS, Tung R, Huang W, Koneru J, Tada
3990 H, Ellenbogen KA, Lustgarten DL. Permanent His bundle pacing: recommendations from a
3991 Multicenter His Bundle Pacing Collaborative Working Group for standardization of definitions,
3992 implant measurements, and follow-up. *Heart Rhythm* 2018;15:460_468

3993 611. Giraldi F, Cattadori G, Roberto M, Carbucicchio C, Pepi M, Ballerini G, Alamanni F,
3994 Della Bella P, Pontone G, Andreini D, Tondo C, Agostoni PG. Long-term effectiveness of
3995 cardiac resynchronization therapy in heart failure patients with unfavorable cardiac veins
3996 anatomy comparison of surgical versus hemodynamic procedure. *J Am Coll Cardiol*
3997 2011;58:483_490.

3998 612. Barba-Pichardo R, Manovel Sanchez A, Fernandez-Gomez JM, Morina-Vazquez P,
3999 Venegas-Gamero J, Herrera-Carranza M. Ventricular resynchronization therapy by direct His-
4000 bundle pacing using an internal cardioverter defibrillator. *Europace* 2013;15:83_88.

4001 613. Teigeler T, Kolominsky J, Vo C, Shepard RK, Kalahasty G, Kron J, Huizar JF, Kaszala
4002 K, Tan AY, Koneru JN, Ellenbogen KA, Padala SK. Intermediate term performance and safety
4003 of His bundle pacing leads: a single center experience. *Heart Rhythm* 2021;18:743749.

4004 614. Zweerink A, Bakelants E, Stettler C, Burri H. Cryoablation vs. radiofrequency ablation of
4005 the atrioventricular node in patients with His-bundle pacing. *Europace* 2020;23:421_430.
4006 *Heart Rhythm* 2021;18:743_749.

4007 615. Huang W, Su L, Wu S, Xu L, Xiao F, Zhou X, Ellenbogen KA. Benefits of permanent
4008 His bundle pacing combined with atrioventricular node ablation in atrial fibrillation patients
4009 with heart failure with both preserved and reduced left ventricular ejection fraction. *J Am Heart*
4010 *Assoc* 2017;6:e005309

4011 616. Deshmukh P, Casavant DA, Romanyshyn M, Anderson K. Permanent, direct His-bundle
4012 pacing: a novel approach to cardiac pacing in patients with normal His_Purkinje activation.
4013 *Circulation* 2000;101:869_877.

4014 617. Occhetta E, Bortnik M, Magnani A, Francalacci G, Piccinino C, Plebani L, Marino P.
4015 Prevention of ventricular desynchronization by permanent para-Hisian pacing after
4016 atrioventricular node ablation in chronic atrial fibrillation: a crossover, blinded, randomized
4017 study versus apical right ventricular pacing. *J Am Coll Cardiol* 2006;47:1938_1945.

4018 618. Sharma PS, Dandamudi G, Herweg B, Wilson D, Singh R, Naperkowski A, Koneru JN,
4019 Ellenbogen KA, Vijayaraman P. Permanent His-bundle pacing as an alternative to biventricular
4020 pacing for cardiac resynchronization therapy: a multicenter experience. *Heart Rhythm*
4021 2018;15:413_420.

4022 619. Vijayaraman P, Naperkowski A, Ellenbogen KA, Dandamudi G. Electrophysiologic
4023 insights into site of atrioventricular block. *JACC Clin Electrophysiol* 2015;1:571_581.

4024 620. Abdelrahman M, Subzposh FA, Beer D, Durr B, Naperkowski A, Sun H, Oren JW,
4025 Dandamudi G, Vijayaraman P. Clinical outcomes of His bundle pacing compared to right
4026 ventricular pacing. *J Am Coll Cardiol* 2018;71:2319_2330.

4027 621. Chung MK. Cardiac surgery: postoperative arrhythmias. *Crit Care Med*
4028 2000;28:N136N14

4029 622. Hill TE, Kiehl EL, Shrestha NK, Gordon SM, Pettersson GB, Mohan C, Hussein A,
4030 Hussain S, Wazni O, Wilkoff BL, Menon V, Tarakji KG. Predictors of permanent pacemaker
4031 requirement after cardiac surgery for infective endocarditis. *Eur Heart J Acute Cardiovasc Care*
4032 2021;10:329334.

4033 623. Knops RE, Tjong FV, Neuzil P, Sperzel J, Miller MA, Petru J, Simon J, Sediva L, de
4034 Groot JR, Dukkipati SR, Koruth JS, Wilde AA, Kautzner J, Reddy VY. Chronic performance
4035 of a leadless cardiac pacemaker: 1-year follow-up of the LEADLESS trial. *J Am Coll Cardiol*
4036 2015;65:14971504.

4037 624. Noheria A, van Zyl M, Scott LR, Srivathsan K, Madhavan M, Asirvatham SJ, McLeod
4038 CJ. Single-site ventricular pacing via the coronary sinus in patients with tricuspid valve disease.
4039 *Europace* 2018;20:636642.

4040 625. Leon MB, Smith CR, Mack M, Miller DC, Moses JW, Svensson LG, Tuzcu EM, Webb
4041 JG, Fontana GP, Makkar RR, Brown DL, Block PC, Guyton RA, Pichard AD, Bavaria JE,
4042 Herrmann HC, Douglas PS, Petersen JL, Akin JJ, Anderson WN, Wang D, Pocock S.
4043 Transcatheter aortic-valve implantation for aortic stenosis in patients who cannot undergo
4044 surgery. *N Engl J Med* 2010;363:15971607.

4045 626. Smith CR, Leon MB, Mack MJ, Miller DC, Moses JW, Svensson LG, Tuzcu EM, Webb
4046 JG, Fontana GP, Makkar RR, Williams M, Dewey T, Kapadia S, Babaliaros V, Thourani VH,
4047 Corso P, Pichard AD, Bavaria JE, Herrmann HC, Akin JJ, Anderson WN, Wang D, Pocock SJ.
4048 Transcatheter versus surgical aortic-valve replacement in high-risk patients. *N Engl J Med*
4049 2011;364:21872198.

4050 627. Leon MB, Smith CR, Mack MJ, Makkar RR, Svensson LG, Kodali SK, Thourani VH,
4051 Tuzcu EM, Miller DC, Herrmann HC, Doshi D, Cohen DJ, Pichard AD, Kapadia S, Dewey T,

4052 Babaliaros V, Szeto WY, Williams MR, Kereiakes D, Zajarias A, Greason KL, Whisenant BK,
4053 Hodson RW, Moses JW, Trento A, Brown DL, Fearon WF, Pibarot P, Hahn RT, Jaber WA,
4054 Anderson WN, Alu MC, Webb JG. Transcatheter or surgical aortic-valve replacement in
4055 intermediate-risk patients. *N Engl J Med* 2016;374:16091620.

4056 628. Mack MJ, Leon MB, Thourani VH, Makkar R, Kodali SK, Russo M, Kapadia SR,
4057 Malaisrie SC, Cohen DJ, Pibarot P, Leipsic J, Hahn RT, Blanke P, Williams MR, McCabe JM,
4058 Brown DL, Babaliaros V, Goldman S, Szeto WY, Genereux P, Pershad A, Pocock SJ, Alu MC,
4059 Webb JG, Smith CR. Transcatheter aortic-valve replacement with a balloon-expandable valve
4060 in low-risk patients. *N Engl J Med* 2019;380:16951705.

4061 629. Adams DH, Popma JJ, Reardon MJ, Yakubov SJ, Coselli JS, Deeb GM, Gleason TG,
4062 Buchbinder M, Hermiller J Jr, Kleiman NS, Chetcuti S, Heiser J, Merhi W, Zorn G, Tadros P,
4063 Robinson N, Petrossian G, Hughes GC, Harrison JK, Conte J, Maini B, Mumtaz M, Chenoweth
4064 S, Oh JK. Transcatheter aortic-valvreplacement with a self-expanding prosthesis. *N Engl J*
4065 *Med* 2014;370:17901798.

4066 630. Popma JJ, Deeb GM, Yakubov SJ, Mumtaz M, Gada H, O’Hair D, Bajwa T, Heiser JC,
4067 Merhi W, Kleiman NS, Askew J, Sorajja P, Rovin J, Chetcuti SJ, Adams DH, Teirstein PS,
4068 Zorn GL 3rd, Forrest JK, Tchetché D, Resar J, Walton A, Piazza N, Ramlawi B, Robinson N,
4069 Petrossian G, Gleason TG, Oh JK, Boulware MJ, Qiao H, Mugglin AS, Reardon MJ.
4070 Transcatheter aortic-valve replacement with a self-expanding valve in low-risk patients. *N Engl*
4071 *J Med* 2019;380:17061715.

4072 631. Reardon MJ, Van Mieghem NM, Popma JJ, Kleiman NS, Sondergaard L, Mumtaz M,
4073 Adams DH, Deeb GM, Maini B, Gada H, Chetcuti S, Gleason T, Heiser J, Lange R, Merhi W,
4074 Oh JK, Olsen PS, Piazza N, Williams M, Windecker S, Yakubov SJ, Grube E, Makkar R, Lee
4075 JS, Conte J, Vang E, Nguyen H, Chang Y, Mugglin AS, Serruys PW, Kappetein AP. Surgical or
4076 transcatheter aortic-valve replacement in intermediate-risk patients. *N Engl J Med*
4077 2017;376:13211331.

4078 632. Barbash IM, Finkelstein A, Barsheshet A, Segev A, Steinvil A, Assali A, Ben Gal Y,
4079 Vaknin Assa H, Fefer P, Sagie A, Guetta V, Kornowski R. Outcomes of patients at estimated
4080 low, intermediate, and high risk undergoing transcatheter aortic valve implantation for aortic
4081 stenosis. *Am J Cardiol* 2015;116:19161922.

4082 633. Bekerredjian R, Szabo G, Balaban U, Bleiziffer S, Bauer T, Ensminger S, Frerker C,
4083 Herrmann E, Beyersdorf F, Hamm C, Beckmann A, Mollmann H, Karck M, Katus HA,
4084 Walther T. Patients at low surgical risk as defined by the Society of Thoracic Surgeons Score

4085 undergoing isolated interventional or surgical aortic valve implantation: in-hospital data and 1-
4086 year results from the German Aortic Valve Registry (GARY). *Eur Heart J* 2019;40:13231330.

4087 634. Gilard M, Eltchaninoff H, Iung B, Donzeau-Gouge P, Chevreul K, Fajadet J, Leprince P,
4088 Leguerrier A, Lievre M, Prat A, Teiger E, Lefevre T, Himbert D, Tchetché D, Carrie D, Albat
4089 B, Cribier A, Rioufol G, Sudre A, Blanchard D, Collet F, Dos Santos P, Meneveau N,
4090 Tirouvanziam A, Caussin C, Guyon P, Boschhat J, Le Breton H, Collart F, Houel R, Delpine S,
4091 Souteyrand G, Favereau X, Ohlmann P, Doisy V, Grollier G, Gommeaux A, Claudel JP,
4092 Bourlon F, Bertrand B, Van Belle E, Laskar M. Registry of transcatheter aortic-valve
4093 implantation in high-risk patients. *N Engl J Med* 2012;366:17051715.

4094 635. Moat NE, Ludman P, de Belder MA, Bridgewater B, Cunningham AD, Young CP,
4095 Thomas M, Kovac J, Spyt T, MacCarthy PA, Wendler O, Hildick-Smith D, Davies SW,
4096 Trivedi U, Blackman DJ, Levy RD, Brecker SJ, Baumbach A, Daniel T, Gray H, Mullen MJ.
4097 Long-term outcomes after transcatheter aortic valve implantation in high-risk patients with
4098 severe aortic stenosis: the U.K. TAVI (United Kingdom Transcatheter Aortic Valve
4099 Implantation) Registry. *J Am Coll Cardiol* 2011;58:21302138.

4100 636. Thomas M, Schymik G, Walther T, Himbert D, Lefevre T, Treede H, Eggebrecht H,
4101 Rubino P, Michev I, Lange R, Anderson WN, Wendler O. Thirty-day results of the SAPIEN
4102 aortic Bioprosthesis European Outcome (SOURCE) Registry: a European registry of
4103 transcatheter aortic valve implantation using the Edwards SAPIEN valve. *Circulation*
4104 2010;122:6269.

4105 637. Werner N, Zahn R, Beckmann A, Bauer T, Bleiziffer S, Hamm CW, Berkeredjian R,
4106 Berkowitsch A, Mohr FW, Landwehr S, Katus HA, Harringer W, Ensminger S, Freker C,
4107 Mollmann H, Walther T, Schneider S, Lange R. Patients at intermediate surgical risk
4108 undergoing isolated interventional or surgical aortic valve implantation for severe symptomatic
4109 aortic valve stenosis. *Circulation* 2018;138:26112623.

4110 638. Fadahunsi OO, Olowoyeye A, Ukaigwe A, Li Z, Vora AN, Vemulapalli S, Elgin E,
4111 Donato A. Incidence, predictors, and outcomes of permanent pacemaker implantation
4112 following transcatheter aortic valve replacement: analysis from the U.S. Society of Thoracic
4113 Surgeons/American College of Cardiology TVT Registry. *JACC Cardiovasc Interv*
4114 2016;9:21892199.

4115 639. Chamandi C, Barbanti M, Munoz-Garcia A, Latib A, Nombela-Franco L, Gutierrez-
4116 Ibanez E, Veiga-Fernandez G, Cheema AN, Cruz-Gonzalez I, Serra V, Tamburino C, Mangieri
4117 A, Colombo A, Jimenez-Quevedo P, Elizaga J, Laughlin G, Lee DH, Garcia Del Blanco B,
4118 Rodriguez-Gabella T, Marsal JR, Cote M, Philippon F, Rodes-Cabau J. Long-term outcomes in

4119 patients with new permanent pacemaker implantation following transcatheter aortic valve
4120 replacement.
4121 JACC Cardiovasc Interv 2018;11:301310.

4122 640. Mohananey D, Jobanputra Y, Kumar A, Krishnaswamy A, Mick S, White JM, Kapadia
4123 SR. Clinical and echocardiographic outcomes following permanent pacemaker implantation
4124 after transcatheter aortic valve replacement: metaanalysis and meta-regression. Circ Cardiovasc
4125 Interv 2017;10:e005046.

4126 641. Ueshima D, Nai Fovino L, Mojoli M, Napodano M, Fraccaro C, Tarantini G. The
4127 interplay between permanent pacemaker implantation and mortality in patients treated by
4128 transcatheter aortic valve implantation: a systematic review and meta-analysis. Catheter
4129 Cardiovasc Interv 2018;92:E159E167.

4130 642. Urena M, Webb JG, Tamburino C, Munoz-Garcia AJ, Cheema A, Dager AE, Serra V,
4131 Amat-Santos IJ, Barbanti M, Imme S, Briales JH, Benitez LM, Al Lawati H, Cucalon AM,
4132 Garcia Del Blanco B, Lopez J, Dumont E, Delarochelliere R, Ribeiro HB, Nombela-Franco L,
4133 Philippon F, Rodes-Cabau J. Permanent pacemaker implantation after transcatheter aortic valve
4134 implantation: impact on late clinical outcomes and left ventricular function. Circulation
4135 2014;129:12331243

4136 643. Fujita B, Schmidt T, Bleiziffer S, Bauer T, Beckmann A, Bekeredjian R, Mollmann H,
4137 Walther T, Landwehr S, Hamm C, Beyersdorf F, Katus HA, Harringer W, Ensminger S,
4138 Frerker C, GARY Executive Board. Impact of new pacemaker implantation following surgical
4139 and transcatheter aortic valve replacement on 1- year outcome. Eur J Cardiothorac Surg
4140 2020;57:151159.

4141 644. Zhang XH, Chen H, Siu CW, Yiu KH, Chan WS, Lee KL, Chan HW, Lee SW, Fu GS,
4142 Lau CP, Tse HF. New-onset heart failure after permanent right ventricular apical pacing in
4143 patients with acquired high-grade atrioventricular block and normal left ventricular function. J
4144 Cardiovasc Electrophysiol 2008;19:136141.

4145 645. Dizon JM, Nazif TM, Hess PL, Biviano A, Garan H, Douglas PS, Kapadia S, Babaliaros
4146 V, Herrmann HC, Szeto WY, Jilaihawi H, Fearon WF, Tuzcu EM, Pichard AD, Makkar R,
4147 Williams M, Hahn RT, Xu K, Smith CR, Leon MB, Kodali SK. Chronic pacing and adverse
4148 outcomes after transcatheter aortic valve implantation. Heart 2015;101:16651671.

4149 646. Auffret V, Webb JG, Eltchaninoff H, Munoz-Garcia AJ, Himbert D, Tamburino C,
4150 Nombela-Franco L, Nietlispach F, Moris C, Ruel M, Dager AE, Serra V, Cheema AN, Amat-
4151 Santos IJ, de Brito FS Jr, Lemos PA, Abizaid A, Sarmento- Leite R, Dumont E, Barbanti M,
4152 Durand E, Alonso Briales JH, Vahanian A, Bouleti C, Imme S, Maisano F, Del Valle R,

4153 Benitez LM, Garcia Del Blanco B, Puri R, Philippon F, Urena M, Rodes-Cabau J. Clinical
4154 impact of baseline right bundle branch block in patients undergoing transcatheter aortic valve
4155 replacement. *JACC Cardiovasc Interv* 2017;10:15641574.

4156 647. Junquera L, Freitas-Ferraz AB, Padron R, Silva I, Nunes Ferreira-Neto A, Guimaraes L,
4157 Mohammadi S, Moris C, Philippon F, Rodes-Cabau J. Intraprocedural high-degree
4158 atrioventricular block or complete heart block in transcatheter aortic valve replacement
4159 recipients with no prior intraventricular conduction disturbances. *Catheter Cardiovasc Interv*
4160 2019;95:982990.

4161 648. Jorgensen TH, De Backer O, Gerds TA, Bieliauskas G, Svendsen JH, Sondergaard L.
4162 Immediate post-procedural 12-lead electrocardiography as predictor of late conduction defects
4163 after transcatheter aortic valve replacement. *JACC Cardiovasc Interv* 2018;11:15091518.

4164 649. Rodes-Cabau J, Urena M, Nombela-Franco L, Amat-Santos I, Kleiman N, Munoz-
4165 Garcia A, Atienza F, Serra V, Deyell MW, Veiga-Fernandez G, Masson JB, Canadas-Godoy V,
4166 Himbert D, Castrodeza J, Elizaga J, Francisco Pascual J, Webb JG, de la Torre JM, Asmarats
4167 L, Pelletier-Beaumont E, Philippon F. Arrhythmic burden as determined by ambulatory
4168 continuous cardiac monitoring in patients with new-onset persistent left bundle branch block
4169 following transcatheter aortic valve replacement: the MARE study. *JACC Cardiovasc Interv*
4170 2018;11:14951505.

4171 650. Urena M, Webb JG, Eltchaninoff H, Munoz-Garcia AJ, Bouleti C, Tamburino C,
4172 Nombela-Franco L, Nietlispach F, Moris C, Ruel M, Dager AE, Serra V, Cheema AN, Amat-
4173 Santos IJ, de Brito FS, Lemos PA, Abizaid A, Sarmento-Leite R, Ribeiro HB, Dumont E,
4174 Barbanti M, Durand E, Alonso Briales JH, Himbert D, Vahanian A, Imme S, Garcia E,
4175 Maisano F, del Valle R, Benitez LM, Garcia del Blanco B, Gutierrez H, Perin MA, Siqueira D,
4176 Bernardi G, Philippon F, Rodes Cabau J. Late cardiac death in patients undergoing
4177 transcatheter aortic valve replacement: incidence and predictors of advanced heart failure and
4178 sudden cardiac death. *J Am Coll Cardiol* 2015;65:437448.

4179 651. Chung MK. Cardiac surgery: postoperative arrhythmias. *Crit Care Med*
4180 2000;28:N136N14

4181 652. Holt ND, McComb JM. Cardiac transplantation and pacemakers: when and what to
4182 implant. *Card Electrophysiol Rev* 2002;6:140151.

4183 653. Krongrad E. Prognosis for patients with congenital heart disease and postoperative
4184 intraventricular conduction defects. *Circulation* 1978;57:867870.

4185 654. Kusumoto FM, Calkins H, Boehmer J, Buxton AE, Chung MK, Gold MR, Hohnloser SH,
4186 Indik J, Lee R, Mehra MR, Menon V, Page RL, Shen WK, Slotwiner DJ, Stevenson LW,

4187 Varosy PD, Welikovich L. HRS/ACC/AHA expert consensus statement on the use of
4188 implantable cardioverter-defibrillator therapy in patients who are not included or not well
4189 represented in clinical trials. *Circulation* 2014;130:94125.

4190 655. Jim MH, Chan AO, Tse HF, Barold SS, Lau CP. Clinical and angiographic findings of
4191 complete atrioventricular block in acute inferior myocardial infarction. *Ann Acad Med*
4192 *Singapore* 2010;39:185190.

4193 656. Proclemer A, Facchin D, Feruglio GA. [Syncope of unknown origin after
4194 electrophysiologic study: is the treatment with pacemaker useful?]. *G Ital Cardiol*
4195 1990;20:195201.

4196 657. Raviele A, Proclemer A, Gasparini G, Di Pede F, Delise P, Piccolo E, Feruglio GA.
4197 Long-term follow-up of patients with unexplained syncope and negative electrophysiologic
4198 study. *Eur Heart J* 1989;10:127132.

4199 658. Nishimura RA, Trusty JM, Hayes DL, Ilstrup DM, Larson DR, Hayes SN, Allison TG,
4200 Tajik AJ. Dual-chamber pacing for hypertrophic cardiomyopathy: a randomized, double-blind,
4201 crossover trial. *J Am Coll Cardiol* 1997;29:435441.

4202 659. Kappenberger L, Linde C, Daubert C, McKenna W, Meisel E, Sadoul N, Chojnowska L,
4203 Guize L, Gras D, Jeanrenaud X, Ryden L. Pacing in hypertrophic obstructive cardiomyopathy:
4204 a randomized crossover study. *Eur Heart J* 1997;18:12491256.

4205 660. Maron BJ, Nishimura RA, McKenna WJ, Rakowski H, Josephson ME, Kieval RS.
4206 Assessment of permanent dual-chamber pacing as a treatment for drug-refractory symptomatic
4207 patients with obstructive hypertrophic cardiomyopathy. A randomized, double-blind, crossover
4208 study (M-PATHY). *Circulation* 1999;99:29272933.

4209 661. Slade AK, Sadoul N, Shapiro L, Chojnowska L, Simon JP, Saumarez RC, Dodinot B,
4210 Camm AJ, McKenna WJ, Aliot E. DDD pacing in hypertrophic cardiomyopathy: a multicentre
4211 clinical experience. *Heart* 1996;75:4449.

4212 662. Megevand A, Ingles J, Richmond DR, Semsarian C. Long-term follow-up of patients
4213 with obstructive hypertrophic cardiomyopathy treated with dual-chamber pacing. *Am J Cardiol*
4214 2005;95:991993.

4215 663. Linde C, Gadler F, Kappenberger L, Ryden L. Placebo effect of pacemaker implantation
4216 in obstructive hypertrophic cardiomyopathy. PIC Study Group. *Pacing In Cardiomyopathy. Am*
4217 *J Cardiol* 1999;83:903907.

4218 664. Ommen SR, Nishimura RA, Squires RW, Schaff HV, Danielson GK, Tajik AJ.
4219 Comparison of dual-chamber pacing versus septal myectomy for the treatment of patients with

4220 hypertrophic obstructive cardiomyopathy: a comparison of objective hemodynamic and
4221 exercise end points. *J Am Coll Cardiol* 1999;34:191196.

4222 665. Arnold AD, Howard JP, Chiew K, Kerrigan WJ, de Vere F, Johns HT, Churlilov L,
4223 Ahmad Y, Keene D, Shun-Shin MJ, Cole GD, Kanagaratnam P, Sohaib SMA, Varnava A,
4224 Francis DP, Whinnett ZI. Right ventricular pacing for hypertrophic obstructive
4225 cardiomyopathy: meta-analysis and meta-regression of clinical trials. *Eur Heart J Qual Care*
4226 *Clin Outcomes* 2019;5:321333.

4227 666. Elliott PM, Anastasakis A, Borger MA, Borggrefe M, Cecchi F, Charron P, Hagege AA,
4228 Lafont A, Limongelli G, Mahrholdt H, McKenna WJ, Mogensen J, Nihoyannopoulos P, Nistri
4229 S, Pieper PG, Pieske B, Rapezzi C, Rutten FH, Tillmanns C, Watkins H. 2014 ESC Guidelines
4230 on diagnosis and management of hypertrophic cardiomyopathy: the Task Force for the
4231 Diagnosis and Management of Hypertrophic Cardiomyopathy of the European Society of
4232 Cardiology (ESC). *Eur Heart J* 2014;35:27332779.

4233 667. Chang SM, Nagueh SF, Spencer WH 3rd, Lakkis NM. Complete heart block:
4234 determinants and clinical impact in patients with hypertrophic obstructive cardiomyopathy
4235 undergoing nonsurgical septal reduction therapy. *J Am Coll Cardiol* 2003;42:296300.

4236 668. Lawrenz T, Lieder F, Bartelsmeier M, Leuner C, Borchert B, Meyer zu Vilsendorf D,
4237 Strunk-Mueller C, Reinhardt J, Feuchtl A, Stellbrink C, Kuhn H. Predictors of complete heart
4238 block after transcatheter ablation of septal hypertrophy: results of a prospective
4239 electrophysiological investigation in 172 patients with hypertrophic obstructive
4240 cardiomyopathy. *J Am Coll Cardiol* 2007;49:23562363.

4241 669. Laurenzi F, Achilli A, Avella A, Peraldo C, Orazi S, Perego GB, Cesario A, Laurent V,
4242 Pellieux S, Corcia P, Magro P, Pierre B, Fauchier L, Raynaud M, Babuty D. Mortality in
4243 myotonic dystrophy patients in the area of prophylactic pacing devices. *Int J Cardiol*
4244 2011;150:5458.

4245 670. Mankad P, Mitchell B, Birnie D, Kron J. Cardiac sarcoidosis. *Curr Cardiol Rep*
4246 2019;21:152.

4247 671. Birnie DH, Sauer WH, Bogun F, Cooper JM, Culver DA, Duvernoy CS, Judson MA,
4248 Kron J, Mehta D, Cosedis Nielsen J, Patel AR, Ohe T, Raatikainen P, Soejima K. HRS expert
4249 consensus statement on the diagnosis and management of arrhythmias associated with cardiac
4250 sarcoidosis. *Heart Rhythm* 2014;11:13051323.

4251 672. Birnie DH, Sauer WH, Judson MA. Consensus statement on the diagnosis and
4252 management of arrhythmias associated with cardiac sarcoidosis. *Heart* 2016;102:411414

4253 673. Bradshaw PJ, Stobie P, Knuiman MW, Briffa TG, Hobbs MS. Trends in the incidence and
4254 prevalence of cardiac pacemaker insertions in an ageing population. *Open Heart*
4255 2014;1:e000177.

4256 674. Mimos O, Lucet J-C, Kerforne T, Pascal J, Souweine B, Goudet V, Mercat A, Bouadma
4257 L, Lasocki S, Alfandari S, Friggeri A, Wallet F, Allou N, Ruckly S, Balayn D, Lepape A,
4258 Timsit J-F. Skin antisepsis with chlorhexidinealcohol versus povidone iodinealcohol, with and
4259 without skin scrubbing, for prevention of intravascular-catheter-related infection (CLEAN): an
4260 open-label, multicentre, randomised, controlled, two-by-two factorial trial. *Lancet*
4261 2015;386:20692077.

4262 675. Darouiche RO, Wall MJ Jr, Itani KM, Otterson MF, Webb AL, Carrick MM, Miller HJ,
4263 Awad SS, Crosby CT, Mosier MC, Alsharif A, Berger DH. Chlorhexidinealcohol versus
4264 povidone-iodine for surgical-site antisepsis. *N Engl J Med* 2010;362:1826.

4265 676. Kirkfeldt RE, Johansen JB, Nohr EA, Moller M, Arnsbo P, Nielsen JC. Pneumothorax in
4266 cardiac pacing: a population-based cohort study of 28 860 Danish patients. *Europace*
4267 2012;14:11321138.

4268 677. Liu P, Zhou Y-F, Yang P, Gao Y-S, Zhao G-R, Ren S-Y, Li X-L. Optimized axillary vein
4269 technique versus subclavian vein technique in cardiovascular implantable electronic device
4270 implantation. *Chin Med J* 2016;129:26472651

4271 678. Behar JM, Bostock J, Zhu Li AP, Chin HMS, Jubb S, Lent E, Gamble J, Foley PWX,
4272 Betts TR, Rinaldi CA, Herring N. Cardiac resynchronization therapy delivered via a multipolar
4273 left ventricular lead is associated with reduced mortality and elimination of phrenic nerve
4274 stimulation: long-term follow-up from a multicenter registry. *J Cardiovasc Electrophysiol*
4275 2015;26:540546.

4276 679. Forleo GB, Di Biase L, Panattoni G, Mantica M, Parisi Q, Martino A, Pappalardo A,
4277 Sergi D, Tesauro M, Papavasileiou LP, Santini L, Calo L, Tondo C, Natale A, Romeo F.
4278 Improved implant and postoperative lead performance in CRT-D patients implanted with a
4279 quadripolar left ventricular lead. A 6-month follow-up analysis from a multicenter
4280 prospective comparative study. *J Interv Card Electrophysiol* 2015;42:5966.

4281 680. Leyva F, Zegard A, Qiu T, Acquaye E, Ferrante G, Walton J, Marshall H. Cardiac
4282 resynchronization therapy using quadripolar versus non-quadripolar left ventricular leads
4283 programmed to biventricular pacing with single-site left ventricular pacing: impact on survival
4284 and heart failure hospitalization. *J Am Heart Assoc* 2017;6:e007026.

4285 681. Lakshmanadoss U, Nuanez B, Kutinsky I, Khalid R, Haines DE, Wong WS. Incidence of
4286 pocket infection postcardiac device implantation using antibiotic versus saline solution for
4287 pocket irrigation. *Pacing Clin Electrophysiol* 2016;39:978984.

4288 682. Mueller TC, Loos M, Haller B, Mihaljevic AL, Nitsche U, Wilhelm D, Friess H, Kleeff J,
4289 Bader FG. Intra-operative wound irrigation to reduce surgical site infections after abdominal
4290 surgery: a systematic review and meta-analysis. *Langenbeck's Arch Surg* 2015;400:167181.

4291 683. Tarakji KG, Mittal S, Kennergren C, Corey R, Poole JE, Schloss E, Gallastegui J, Pickett
4292 RA, Evonich R, Philippon F, McComb JM, Roark SF, Sorrentino D, Sholevar D, Cronin E,
4293 Berman B, Riggio D, Biffi M, Khan H, Silver MT, Collier J, Eldadah Z, Wright DJ, Lande JD,
4294 Lexcen DR, Cheng A, Wilkoff BL, WRAP-IT Investigators. Antibacterial envelope to prevent
4295 cardiac implantable device infection. *N Engl J Med* 2019;380:18951905.

4296 684. Henrikson CA, Sohail MR, Acosta H, Johnson EE, Rosenthal L, Pachulski R, Dan D,
4297 Paladino W, Khairallah FS, Gleed K, Hanna I, Cheng A, Lexcen DR, Simons GR. Antibacterial
4298 envelope is associated with low infection rates after implantable cardioverter-defibrillator and
4299 cardiac resynchronization therapy device replacement: results of the Citadel and Centurion
4300 studies. *JACC Clin Electrophysiol* 2017;3:11581167.

4301 685. Cano O, Andres A, Alonso P, Osca J, Sancho-Tello MJ, Olague J, Martinez-Dolz L.
4302 Incidence and predictors of clinically relevant cardiac perforation associated with systematic
4303 implantation of active-fixation pacing and defibrillation leads: a single-centre experience with
4304 over 3800 implanted leads. *Europace* 2017;19:96102.

4305 686. Mahapatra S, Bybee KA, Bunch TJ, Espinosa RE, Sinak LJ, McGoon MD, Hayes DL.
4306 Incidence and predictors of cardiac perforation after permanent pacemaker placement. *Heart*
4307 *Rhythm* 2005;2:907911.

4308 687. Birnie DH, Healey JS, Wells GA, Verma A, Tang AS, Krahn AD, Simpson CS, Ayala-
4309 Paredes F, Coutu B, Leiria TLL, Essebag V, BRUISE CONTROL Investigators. Pacemaker or
4310 defibrillator surgery without interruption of anticoagulation. *N Engl J Med*
4311 2013;368:20842093.

4312 688. Ghanbari H, Phard WS, Al-Ameri H, Latchamsetty R, Jongnarngsin K, Crawford T,
4313 Good E, Chugh A, Oral H, Bogun F, Morady F, Pelosi F Jr. Meta-analysis of safety and
4314 efficacy of uninterrupted warfarin compared to heparin-based bridging therapy during
4315 implantation of cardiac rhythm devices. *Am J Cardiol* 2012;110:14821488

4316 689. Garcia-Fernandez FJ, Osca Asensi J, Romero R, Fernandez Lozano I, Larrazabal JM,
4317 Martinez Ferrer J, Ortiz R, Pombo M, Tornes FJ, Moradi Kolbolandi M. Safety and efficiency
4318 of a common and simplified protocol for pacemaker and defibrillator surveillance based on

4319 remote monitoring only: a long-term randomized trial (RM-ALONE). *Eur Heart J*
4320 2019;40:18371846.

4321 690. Mabo P, Victor F, Bazin P, Ahres S, Babuty D, Da Costa A, Binet D, Daubert JC,
4322 COMPAS Trial Investigators. A randomized trial of long-term remote monitoring of
4323 pacemaker recipients (the COMPAS trial). *Eur Heart J* 2012;33:11051111

4324 691. Ricci RP, Morichelli L, Santini M. Remote control of implanted devices through Home
4325 Monitoring technology improves detection and clinical management of atrial fibrillation.
4326 *Europace* 2009;11:5461

4327 692. Russo RJ, Costa HS, Silva PD, Anderson JL, Arshad A, Biederman RW, Boyle NG,
4328 Frabizzio JV, Birgersdotter-Green U, Higgins SL, Lampert R, Machado CE, Martin ET, Rivard
4329 AL, Rubenstein JC, Schaerf RH, Schwartz JD, Shah DJ, Tomassoni GF, Tominaga GT, Tonkin
4330 AE, Uretsky S, Wolff SD. Assessing the risks associated with MRI in patients with a
4331 pacemaker or defibrillator. *N Engl J Med* 2017;376:755764.

4332 693. Indik JH, Gimbel JR, Abe H, Alkmim-Teixeira R, Birgersdotter-Green U, Clarke GD,
4333 Dickfeld TL, Froelich JW, Grant J, Hayes DL, Heidbuchel H, Idriss SF, Kanal E, Lampert R,
4334 Machado CE, Mandrola JM, Nazarian S, Patton KK, Rozner MA, Russo RJ, Shen WK,
4335 Shinbane JS, Teo WS, Uribe W, Verma A, Wilkoff BL, Woodard PK. 2017 HRS expert
4336 consensus statement on magnetic resonance imaging and radiation exposure in patients with
4337 cardiovascular implantable electronic devices. *Heart Rhythm* 2017;14:e97e153.

4338 694. Nazarian S, Hansford R, Rahsepar AA, Weltin V, McVeigh D, Gucuk Ipek E, Kwan A,
4339 Berger RD, Calkins H, Lardo AC, Kraut MA, Kamel IR, Zimmerman SL, Halperin HR. Safety
4340 of magnetic resonance imaging in patients with cardiac devices. *N Engl J Med*
4341 2017;377:25552564.

4342 695. Shenthur J, Milasinovic G, Al Fagih A, Gotte M, Engel G, Wolff S, Tse HF, Herr J,
4343 Carrithers J, Cerkenik J, Nahle CP. MRI scanning in patients with new and existing
4344 CapSureFix Novus 5076 pacemaker leads: randomized trial results. *Heart Rhythm*
4345 2015;12:759765.

4346 696. Gimbel JR, Bello D, Schmitt M, Merkely B, Schwitter J, Hayes DL, Sommer T, Schloss
4347 EJ, Chang Y, Willey S, Kanal E. Randomized trial of pacemaker and lead system for safe
4348 scanning at 1.5 Tesla. *Heart Rhythm* 2013;10:685691

4349 697. Higgins JV, Gard JJ, Sheldon SH, Espinosa RE, Wood CP, Felmlee JP, Cha YM,
4350 Asirvatham SJ, Dalzell C, Acker N, Watson RE Jr, Friedman PA. Safety and outcomes of
4351 magnetic resonance imaging in patients with abandoned pacemaker and defibrillator leads.
4352 *Pacing Clin Electrophysiol* 2014;37:12841290.

4353 698. Padmanabhan D, Kella DK, Mehta R, Kapa S, Deshmukh A, Mulpuru S, Jaffe AS,
4354 Felmlee JP, Jondal ML, Dalzell CM, Asirvatham SJ, Cha YM, Watson RE Jr, Friedman PA.
4355 Safety of magnetic resonance imaging in patients with legacy pacemakers and defibrillators and
4356 abandoned leads. *Heart Rhythm* 2018;15:228233.

4357 699. Horwood L, Attili A, Luba F, Ibrahim EH, Parmar H, Stojanovska J, Gadoth-Goodman S,
4358 Fette C, Oral H, Bogun F. Magnetic resonance imaging in patients with cardiac implanted
4359 electronic devices: focus on contraindications to magnetic resonance imaging protocols.
4360 *Europace* 2017;19:812817.

4361 700. Vuorinen AM, Pakarinen S, Jaakkola I, Holmstrom M, Kivisto S, Kaasalainen T. Clinical
4362 experience of magnetic resonance imaging in patients with cardiac pacing devices: unrestricted
4363 patient population. *Acta Radiol* 2019;60:14141421.

4364 701. Hauser RG, Hayes DL, Kallinen LM, Cannom DS, Epstein AE, Almquist AK, Song SL,
4365 Tyers GF, Vlay SC, Irwin M. Clinical experience with pacemaker pulse generators and
4366 transvenous leads: an 8-year prospective multicenter study. *Heart Rhythm* 2007;4:154160.

4367 702. Merchant FM, Tejada T, Patel A, El-Khalil J, Desai Y, Keeling B, Lattouf OM, Leon AR,
4368 El-Chami MF. Procedural outcomes and long-term survival associated with lead extraction in
4369 patients with abandoned leads. *Heart Rhythm* 2018;15:855859.

4370 703. Diemberger I, Mazzotti A, Giulia MB, Biffi M, Cristian M, Massaro G, Matteo M,
4371 Martignani C, Letizia ZM, Ziacchi M, Reggiani B, Reggiani ML, Battistini P, Boriani G. From
4372 lead management to implanted patient management: systematic review and meta-analysis of the
4373 last 15 years of experience in lead extraction. *Expert Rev Med Devices* 2013;10:551573.

4374 704. Bongiorno MG, Kennergren C, Butter C, Deharo JC, Kutarski A, Rinaldi CA, Romano
4375 SL, Maggioni AP, Andarala M, Auricchio A, Kuck KH, Blomstrom-Lundqvist C, ELECTRA
4376 Investigators. The European Lead Extraction ConTRolled (ELECTRa) study: a European Heart
4377 Rhythm Association (EHRA) registry of transvenous lead extraction outcomes. *Eur Heart J*
4378 2017;38:29953005.

4379 705. Segreti L, Rinaldi CA, Claridge S, Svendsen JH, Blomstrom-Lundqvist C, Auricchio A,
4380 Butter C, Dagues N, Deharo JC, Maggioni AP, Kutarski A, Kennergren C, Laroche C, Kempa
4381 M, Magnani A, Casteigt B, Bongiorno MG, ELECTRa Investigators. Procedural outcomes
4382 associated with transvenous lead extraction in patients with abandoned leads: an ESC-EHRA
4383 ELECTRa (European Lead Extraction ConTRolled) registry sub-analysis. *Europace*
4384 2019;21:645654.

4385

4386

4387 **Приложение А1. Состав рабочей группы по разработке и пересмотру клинических**
4388 **рекомендаций**

4389

4390 **Члены рабочей группы подтвердили отсутствие финансовой**
4391 **поддержки/конфликта интересов. В случае сообщения о наличии конфликта**
4392 **интересов член(ы) рабочей группы был(и) исключен(ы) из обсуждения разделов,**
4393 **связанных с областью конфликта интересов.**

4394

4395 **Приложение А2. Методология разработки клинических рекомендаций**

4396 Представленные рекомендации разработаны на основе:

4397 - Клинических рекомендаций по проведению электрофизиологических исследований,
4398 катетерной абляции и применению имплантируемых антиаритмических устройств»
4399 Всероссийского научного общества специалистов по клинической электрофизиологии,
4400 аритмологии и электрокардиостимуляции (ВНОА) (2017 г.);

4401 - Клинических рекомендаций «Брадиаритмии» Минздрава РФ (2017 г.);

4402 - Руководства по оценке и ведению пациентов с брадикардией и нарушениями сердечной
4403 проводимости ACC/АНА/HRS (2018 г.);

4404 - Рекомендации ЕОК по диагностике и лечению синкопальных состояний (2018 г.);

4405 - Консенсусного заключения экспертов HRS 2017 года по управлению сердечно-
4406 сосудистыми имплантируемыми электронными устройствами и экстракции электродов;

4407 - Консенсусного заключения EHRA 2018 года по экстракции электродов;

4408 - Рекомендации ЕОК по электрокардиостимуляции и сердечной ресинхронизирующей
4409 терапии (2013 г.);

4410 - Рекомендации ЕОК по ведению инфекционного эндокардита (2015 г.).

4411 В рекомендациях представлены основные принципы диагностики и современные
4412 подходы к лечению брадиаритмий и нарушений проводимости на основе обобщенного
4413 и систематизированного анализа имеющихся клинических исследований
4414 по профилактике, диагностике и лечению пациентов с БА.

4415 **Целевая аудитория данных клинических рекомендаций:**

4416 1. Врач-кардиолог.

4417 2. Врач-терапевт.

4418 3. Врач общей практики.

4419 4. Врач-сердечно-сосудистый хирург.

4420 5. Врач по рентгенэндоваскулярным методам диагностики и лечения.

4421 Вследствие того, что члены Российского кардиологического общества входят
4422 в состав Европейского общества кардиологов и также являются его членами, все
4423 рекомендации Европейского общества кардиологов (ЕОК) формируются с участием
4424 российских экспертов, которые являются соавторами европейских рекомендаций. Таким
4425 образом, существующие рекомендации ЕОК отражают общее мнение ведущих
4426 российских и европейских кардиологов. В связи с этим формирование Национальных
4427 рекомендаций проводилось на основе рекомендаций ЕОК с учетом национальной
4428 специфики, особенностей обследования, лечения, и доступности медицинской помощи.

4429 По этой причине в тексте настоящих клинических рекомендаций одновременно
 4430 использованы две шкалы оценки достоверности доказательств тезисов рекомендаций:
 4431 уровни достоверности доказательств ЕОК с УУР и УДД. Добавлены классы
 4432 рекомендаций ЕОК, позволяющие оценить необходимость выполнения тезиса
 4433 рекомендаций (таблицы 1, 2, 3, 4,5).

4434 **Таблица 1.** Классы показаний согласно рекомендациям Европейского общества
 4435 кардиологов (ЕОК)

Класс рекомендаций ЕОК	Определение	Предлагаемая формулировка
I	Доказано или общепризнано, что диагностическая процедура, вмешательство/лечение являются эффективными и полезными	Рекомендовано/ показано
II	Противоречивые данные и/или мнения об эффективности/пользе диагностической процедуры, вмешательства, лечения	Целесообразно применять
IIa	Большинство данных/мнений в пользу эффективности/пользы диагностической процедуры, вмешательства, лечения	
IIb	Эффективность/польза диагностической процедуры, вмешательства, лечения установлены менее убедительно	
III	Данные или единое мнение, что диагностическая процедура, вмешательство, лечение бесполезны/не эффективны, а в ряде случаев могут приносить вред	Не рекомендуется применять

4436

4437 **Таблица 2.** Уровни достоверности доказательств согласно рекомендациям Европейского
 4438 общества кардиологов (ЕОК)

Уровни достоверности доказательств ЕОК	
A	Данные многочисленных рандомизированных клинических исследований или метаанализов
B	Данные получены по результатам одного рандомизированного клинического исследования или крупных нерандомизированных исследований
C	Согласованное мнение экспертов и/или результаты небольших исследований, ретроспективных исследований, регистров

4439

4440 **Таблица 3.** Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов
 4441 диагностики (диагностических вмешательств)

УДД	Расшифровка
1	Систематические обзоры исследований с контролем референсным методом или систематический обзор рандомизированных клинических исследований с применением метаанализа
2	Отдельные исследования с контролем референсным методом или отдельные рандомизированные клинические исследования и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением рандомизированных клинических исследований, с применением метаанализа
3	Исследования без последовательного контроля референсным методом или исследования с референсным методом, не являющимся независимым от исследуемого метода, или нерандомизированные сравнительные исследования, в том числе когортные исследования
4	Несравнительные исследования, описание клинического случая
5	Имеется лишь обоснование механизма действия или мнение экспертов

4442

4443 **Таблица 4.** Шкала оценки уровней достоверности доказательств (УДД) для методов
4444 профилактики, лечения и реабилитации (профилактических, лечебных, реабилитационных
4445 вмешательств)

УДД	Расшифровка
1	Систематический обзор РКИ с применением метаанализа
2	Отдельные РКИ и систематические обзоры исследований любого дизайна, за исключением РКИ, с применением метаанализа
3	Нерандомизированные сравнительные исследования, в т.ч. когортные исследования
4	Несравнительные исследования, описание клинического случая или серии случаев, исследования «случай-контроль»
5	Имеется лишь обоснование механизма действия вмешательства (доклинические исследования) или мнение экспертов

4446

4447 **Таблица 5.** Шкала оценки уровней убедительности рекомендаций (УУР) для методов
4448 профилактики, диагностики, лечения и реабилитации (профилактических,
4449 диагностических, лечебных, реабилитационных вмешательств)

4450

УУР	Расшифровка
А	Сильная рекомендация (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество, их выводы по интересующим исходам являются согласованными)
В	Условная рекомендация (не все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются важными, не все исследования имеют высокое или удовлетворительное методологическое качество и/или их выводы по интересующим исходам не являются согласованными)
С	Слабая рекомендация/отсутствие доказательств надлежащего качества (все рассматриваемые критерии эффективности (исходы) являются неважными, все исследования имеют низкое методологическое качество, и их выводы

	по интересующим исходам не являются согласованными)
--	---

4451

4452

Порядок обновления клинических рекомендаций

4453

Механизм обновления клинических рекомендаций предусматривает

4454

их систематическую актуализацию — не реже чем один раз в три года, а также при

4455

появлении новых данных с позиции доказательной медицины по вопросам диагностики,

4456

лечения, профилактики и реабилитации конкретных заболеваний, наличии обоснованных

4457

дополнений/замечаний к ранее утвержденным КР, но не чаще 1 раза в 6 месяцев.

4458

4459

4460 Приложение А3. Справочные материалы, включая соответствие показаний к
 4461 применению и противопоказаний, способов применения и доз лекарственных
 4462 препаратов, инструкции по применению лекарственного препарата

4463

4464 Медицинские препараты, зарегистрированные в России, для медикаментозного
 4465 тестирования БА у пациентов с синкопальными состояниями.

Препарат (класс)	Дозы и схемы	Применение	Параметры ЭКГ, требующие внимания	Нежелательные побочные эффекты	Межлекарственные взаимодействия
Атропин **	1–2 мг (до 0,04 мг/кг), внутривенно	Медикаментозный тест при обследовании пациентов с синкопальными состояниями	Функциональная синусовая брадикардия и АВБ I степени. Увеличение частоты синусового ритма более чем на 25% от исходной или более 90 имп/мин свидетельствует о вагусной природе дисфункции синусового узла. Исчезновение нарушений АВ проводимости указывает на их вагусную природу и локализацию нарушения на уровне АВУ	Сухость во рту, расширение зрачка, парез аккомодации, тахикардия, затруднение мочеиспускания, атония кишечника, головокружение, головная боль	Со средствами, обладающими антихолинергической активностью - усиление антихолинергического действия. С фенилэфрином** - повышение АД. С органическими нитратами -повышение внутриглазного давления. С Прокаиномидом** - усиление антихолинергическое действия.

4466

4467 Не рекомендовано выполнение медикаментозного тестирования пациентам нарушение
 4468 функции почек и печени, пожилых и беременных.

4469 Медицинские препараты, зарегистрированные в России, для острого
 4470 медикаментозного лечения БА

Препарат (класс)	Дозы и схемы	Применение	Параметры ЭКГ, требующие внимания	Нежелательные побочные эффекты	Межлекарственные взаимодействия
Атропин* *	Начало — 0,5–1 мг, Повторное введение — каждые 3–5 мин. до макси- мальной дозы 3 мг, внутривенно	Острое медикамент озное лечение ДСУ и АВБ	Увеличение частоты сердечных сокращений	Сухость во рту, расширение зрачка, парез аккомодации, тахикардия, затруднение мочеиспуска- ния, атония кишечника, головокруже- ние, головная боль	С антихолинергическими средствами и средствами, обладающими антихолинергической активностью - усиление антихолинергического действия. С фенилэфрином** - повышение АД. С органическими нитратами -повышение внутриглазного давления. С прокаинамидом** - усиление антихолинергическое действия.
#Допамин** **	5–20 мкг/кг/мин Начало с 5 мкг/кг/мин и увеличе- ние на 5 мкг/кг/ми н каждые 2 мин., внутривенно	Острое медикамент озное лечение ДСУ и АВБ	Увеличение частоты сердечных сокращений	Головная боль, тревожность, двигательное беспокойство, тремор пальцев рук, снижение АД, нарушение проводимости, расширение комплекса QRS, вазоспазм, тошнота, рвота	С диуретиками - усиливается мочегонное действие #допамина**. С некоторыми препаратами- фуразолидоном, прокарбазином, селегилином), - усиление интенсивности и длительности кардиостимулирующего и прессорного эффектов #допамина**. С бета- адреноблокаторами - уменьшение действия. С метилэргометрином**, окситоцином** - увеличение вазоконстрикторного

					<p>эффекта, риск возникновения ишемии и гангрены, а также тяжелой артериальной гипертензии, вплоть до внутричерепного кровоизлияния.</p> <p>С сердечными гликозидами возможно - повышение риска развития нарушений сердечного ритма, аддитивный положительный инотропный эффект.</p>
--	--	--	--	--	--

4471

4472 Не рекомендовано введение препаратов пациентам с нарушением функции почек и печени,

4473 пожилых и беременных.

4474

4475

4476 **Связанные документы**

- 4477 Стандарт медицинской помощи пациентам фибрилляцией и трепетанием
4478 предсердий (при оказании специализированной помощи), утвержден приказом
4479 Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 декабря 2012г. № 1622н.
- 4480 1. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.02.2019 № 103н
4481 «Об утверждении порядка и сроков разработки клинических рекомендаций, их
4482 пересмотра, типовой формы клинических рекомендаций и требований к их структуре,
4483 составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации
4484 информации» (Зарегистрирован 08.05.2019 № 54588).
- 4485 2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г.
4486 № 918н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-
4487 сосудистыми заболеваниями».
- 4488 3. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июля 2016 г.
4489 № 520н «Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи».
- 4490

4491 **Приложение Б. Алгоритмы действий врача**

4492 **Таблица 1.** Алгоритм оценки состояния пациента при подозрении на брадикардию
4493 и нарушения проводимости

4494

4495 **Таблица 2.** Острое медикаментозное лечение брадикардии при симптомной ДСУ и АВБ

4496

Атропин**	Внутривенно Начало 0,5–1 мг Повторное введение каждые 3–5 мин до максимальной дозы 3 мг
Адрено- и допамин-стимуляторы #Допамин**	Внутривенно 5–20 мкг/кг/мин Начало с 5 мкг/кг/мин и увеличение на 5 мкг/кг/мин каждые 2 мин

4497

4498

4499

4500

4501 **Таблица 3.** Алгоритм действий при острой брадикардии

4502

4503

4504 **Таблица 4.** Алгоритм принятия решения при рефлекторном синкопе

4505

4506

4507 **Таблица 5.** Единый Код ЭКС*** — номенклатура NBG-NASPE/BPEG (2001 г.)

Позиция букв в номенклатуре кода				
I	II	III	IV	V
функциональное значение букв в номенклатуре кода				
камера (ы) стимулируемая (ые)	камера (ы) воспринимаемая (ые)	вид ответа на собственную активность	наличие частотной адаптации	многокамерная стимуляция
0 — нет A — предсердие V — желудочек D — обе камеры (A+V)	0 — нет A — предсердие V — желудочек D — обе камеры (A + V)	0 — нет T — триггер 1 — подавление D — обе функции (T + I)	0 — нет R — частотная адаптация	0 — нет A — предсердная V — желудочковая D — двойная функция (A+V)
S — однокамерная (A или V)	S — однокамерная (A или V)			

4508

4509 **Таблица 6.** Рекомендации по выбору модели ЭКС*** согласно определенным
4510 показаниям электрокардиостимуляции

4511

4512

4513

4514

4515

4516

4517

4518

4519

4520

4521

4522

4523

4524

4525

4526

	Дисфункция СПУ	АВ-блокада	Рефлекторные синкопе
Однокамерная предсердная стимуляция (AAI)	Интактность АВ-проведения и отсутствие риска развития АВ-блокады в будущем. Поддержание АВ-синхронизации во время стимуляции. Наличие частотной адаптации (при необходимости).	Неприемлема	Неприемлема
Однокамерная желудочковая стимуляция (VVI)	Нет необходимости поддержания АВ-синхронизации во время стимуляции. Наличие частотной адаптации (при необходимости).	Хроническая фибрилляция предсердий или другие предсердные тахикардии или нет необходимости поддержания АВ-синхронизации. Наличие частотной адаптации (при необходимости).	Хроническая фибрилляция предсердий или другие предсердные тахикардии. Наличие частотной адаптации (при необходимости).
Двухкамерная стимуляция (DDD)	Поддержание АВ-синхронизации. Подозрение на нарушение АВ-проведения или высокий риск развития АВ-блокады в будущем. Наличие частотной адаптации (при необходимости).	Наличие частотной адаптации (при желании). Поддержание АВ-синхронизации. Стимуляция предсердий.	Наличие синусового ритма. Наличие частотной адаптации (при необходимости).
Моноэлектродные желудочковые ЭКС с детекцией предсердной активности (VDD)	Неприемлема	Нормальная функция СПУ и нет необходимости в стимуляции предсердий. Желание ограничить количество эндокардиальных электродов.	Неприемлема

4527 **Алгоритм наблюдения за пациентами с имплантированными ЭКС***:**

- 4528 1. Первое программирование ЭКС*** — интраоперационно.
- 4529 2. Повторное программирование ЭКС*** — перед выпиской пациента
- 4530 из стационара (при необходимости раньше).
- 4531 3. Через 3–4 месяца после имплантации ЭКС*** пациент должен быть осмотрен
- 4532 в кабинете программирования.
- 4533 4. Поддерживающий период наблюдения пациента при отсутствии нарушений
- 4534 работы ЭКС*** проводится через 3–4 месяца после имплантации с периодичностью
- 4535 последующих осмотров 1 раз в 6–12 месяцев.
- 4536 5. Период интенсивного наблюдения пациента — по достижении времени
- 4537 рекомендуемой замены ЭКС***.

4538 **Алгоритмы программирования пациентов с имплантированными ЭКС***:**

- 4539 • Первое программирование ЭКС*** осуществляется специалистами,
- 4540 непосредственно принимающими участие в процедуре имплантации ЭКС***.
- 4541 • Интраоперационно: внесение данных пациента, клинических показаний
- 4542 к имплантации, референтных и серийных номеров имплантируемых электродов,
- 4543 измерение порогов стимуляции предсердного и/или желудочкового электродов,
- 4544 амплитуды предсердной и/или желудочковой эндограммы, сопротивления (импеданса)
- 4545 и полярности электродов. Устанавливаются базовые параметры стимуляции: режимы
- 4546 (AAI(R), VVI(R), DDD(R) или другие применительно к конкретной клинической
- 4547 ситуации.
- 4548 • Частота базового и максимального ритма электрокардиостимуляции,
- 4549 длительность детектируемой и стимулированной АВ-задержки, чувствительность
- 4550 по предсердному и/или желудочковому электродам. Данные тестов и параметры
- 4551 первичного программирования заносятся в протокол операции. Повторное
- 4552 программирование ЭКС*** осуществляется перед выпиской пациента из стационара
- 4553 (при необходимости раньше) специалистами кабинета программирования ЭКС***.
- 4554 • Проводится подробное информирование пациента об имплантированном ему
- 4555 устройстве, характере его работы, правилах безопасности.
- 4556 • На руки необходимо выдать заполненный паспорт ЭКС***.
- 4557 • Назначается срок повторного осмотра.
- 4558 Через 3–4 месяца после имплантации ЭКС*** пациент должен быть осмотрен
- 4559 в кабинете программирования.

4560 • Во время посещения проводится регистрация ЭКГ в 12 отведениях и контроль
4561 всех параметров кардиостимулятора по протоколу.

4562 Период интенсивного наблюдения пациента:

4563 • По достижении времени рекомендуемой замены ЭКС***.

4564 • В течение 3-х месяцев данного периода должна быть выполнена реимплантация
4565 ЭКС***.

4566 • При невозможности быстрой замены ЭКС*** осмотр осуществляется не реже
4567 чем 1 раз в месяц — проводится оценка эффективности стимуляции.

4568 • При достижении периода экстренной замены батареи заменить ЭКС***
4569 немедленно.

4570 **Протокол программирования ЭКС:**

4571 • Клиническая оценка состояния пациента (жалобы, субъективная оценка пациентом
4572 самочувствия, качества жизни, переносимости физических нагрузок; наличие таких
4573 симптомов, как обмороки, слабость, одышка, отеки, головокружения и т.д.).
4574 Сравнение клинической картины в динамике относительно предыдущего визита.

4575 • Оценка данных диагностических исследований, проведенных в период после
4576 предыдущего визита (ЭКГ, холтеровское мониторирование, нагрузочные тесты,
4577 эхокардиография, рентгенография, данные программирования ИЭУ, выполненного
4578 в других медицинских учреждениях, и т.д.):

4579 1. Регистрация поверхностной ЭКГ (оценка эффективности стимуляции/детекции
4580 и нарушения работы ЭКС***).

4581 2. Оценка клинического состояния пациента на момент осмотра и сравнение
4582 со статусом до имплантации (уточнение субъективного состояния и предъявляемых
4583 жалоб, толерантность к физическим нагрузкам).

4584 3. Внешний осмотр ложа ЭКС*** (состояние кожных покровов в области
4585 ЭКС***, исключение синдрома вертуна).

4586 • Регистрация эндограммы с имплантированных электродов, аннотированной
4587 эндограммы или ЭКГ (маркер-канала) при наличии подобных функций в ЭКС.

4588 4. Оценка сопротивления электродов.

4589 5. Оценка порогов стимуляции по активным электродам.

4590 6. Оценка порога чувствительности по электродам.

4591 7. Проба с отключением ЭКС или временным переводом на минимальную частоту
4592 электростимуляции 30 имп/мин для оценки времени восстановления спонтанного ритма,

4593 его вида, устойчивости и частоты, наличия желудочковых аритмий, симптоматики и
4594 степени зависимости пациента от ЭКС.

4595 8. Проведение магнитного теста, прогнозирование времени истощения батареи,
4596 определение сроков замены ЭКС***.

4597 9. Программирование основных параметров кардиостимуляции:

- 4598 • режим стимуляции (VVI(R), DDI(R), DDD® и др.
- 4599 • базовая частота стимуляции;
- 4600 • максимальная частота стимуляции;
- 4601 • длительность детектируемой и стимулированной предсердно-желудочковых
4602 задержек;
- 4603 • функция автозахвата (autocapture);
- 4604 • полярность электродов;
- 4605 • амплитуда импульса, длительность импульса и порог чувствительности для
4606 предсердного и/или желудочкового электрода.

4607 10. Программирование расширенных параметров кардиостимуляции (для DDI(R),
4608 DDD(R)):

- 4609 • активация алгоритма «поиск собственного проведения»;
- 4610 • активация алгоритма «поиск положительного/отрицательного гистерезиса»;
- 4611 • активация алгоритма автоматического переключения режима стимуляции;
- 4612 • включение желудочкового периода безопасности;
- 4613 • включение алгоритмов предупреждения и купирования пейсмекерной
4614 тахикардии (PVC options, PMT options).

4615 11. Программирование функции частотной адаптации (в зависимости
4616 от доступности в ЭКС; по показаниям):

- 4617 • частотно-адаптивная предсердно-желудочковая задержка (rateresponsive AV/PV
4618 delay);
- 4619 • активация сенсора.

4620 12. Оценка стабильности контакта электродов с миокардом и корпусом ЭКС***
4621 (респираторный тест, изменение положения тела, надавливание на область корпуса
4622 ЭКС*** и др.).

4623 13. Диагностика и устранение нарушений работы ЭКС*** (низкая/высокая
4624 чувствительность, низкий/высокий порог стимуляции, миопотенциальное

4625 ингибирование, перекрестная детекция (crosstalk, far-field), ЭКС***— опосредованные
4626 тахикардии, стимуляция скелетных мышц и диафрагмы и др.).

- 4627 • Оценка эффективности проводимой медикаментозной терапии, при
4628 необходимости — ее коррекция.
- 4629 • Оценка сопутствующих аритмий и при необходимости — определение показаний
4630 к возможному оперативному лечению.
- 4631 • При необходимости — экстренная госпитализация в палату интенсивной терапии,
4632 рекомендации о плановой госпитализации в кардиологический стационар или
4633 консультациях соответствующих специалистов.
- 4634 • Введение результатов обследования и программирования ЭКС в компьютерную
4635 базу данных.
- 4636 • Подробное информирование пациента и родственников о медицинском состоянии
4637 его организма, работе имплантированной системы, произведенных изменениях
4638 программируемых параметров и терапии, правилах поведения.

4639 14. Выдача справки о результатах визита, проведенных обследований
4640 и диагностических тестов, программированных параметрах работы.
4641

4642 **Приложение В. Информация для пациента**

4643 **ЧТО ТАКОЕ БРАДИКАРДИЯ?**

4644 Брадикардия — это состояние, при котором сердце бьется слишком медленно.
4645 Здоровое сердце бьется с частотой 60–100 ударов в минуту, перекачивая приблизительно
4646 284 л крови каждый час. При брадикардии сердце бьется с частотой менее 60 ударов
4647 в минуту. При такой скорости сердце не может перекачивать достаточное количество
4648 обогащенной кислородом крови в организме при обычной деятельности или физических
4649 нагрузках. В результате вы можете испытывать головокружение, усталость, одышку или
4650 приступы потери сознания.

4651 **ЧТО ВЫЗЫВАЕТ БРАДИКАРДИЮ?**

4652 Брадикардия может развиваться по целому ряду причин. К наиболее частым
4653 относятся:

- 4654 - наследственная болезнь сердца (состояние, с которым вы родились);
- 4655 - определенные заболевания или прием некоторых лекарственных препаратов;
- 4656 - естественный процесс старения;
- 4657 - рубцы на сердце после сердечного приступа;
- 4658 - синдром слабости синусового узла также называемый дисфункцией синусового
4659 узла (нарушение работы естественного кардиостимулятора);
- 4660 - блокада сердца (нерегулярность или блокирование прохождения электрического
4661 импульса из верхней камеры сердца в нижнюю).

4662 **СИМПТОМЫ БРАДИКАРДИИ**

4663 Когда ваше сердце бьется слишком медленно, вы можете испытывать различные
4664 симптомы:

- 4665 - головокружение или обморочное состояние,
- 4666 - хроническую слабость,
- 4667 - одышку.

4668 Эти симптомы помогут вашему врачу оценить степень тяжести вашего состояния
4669 и определить подходящее лечение.

4670 **ДИАГНОСТИКА БРАДИКАРДИИ**

4671 Только врач может диагностировать брадикардию и степень ее тяжести. Чтобы
4672 исключить или подтвердить диагноз брадикардия, могут потребоваться определенные
4673 тесты, в зависимости от предполагаемого нарушения сердечного ритма. К ним
4674 относятся:

- 4675 - электрокардиограмма (ЭКГ),

- 4676 - нагрузочный ЭКГ-тест (измеряет сердечный ритм во время физических
- 4677 упражнений),
- 4678 - холтеровское или суточное мониторирование,
- 4679 - наружный петлевой регистратор,
- 4680 - имплантируемый кардиомонитор,
- 4681 - пассивная ортостатическая проба,
- 4682 - электрофизиологическое исследование.

4683 ЛЕЧЕНИЕ БРАДИКАРДИИ

4684 Лечение брадикардии зависит от ее причины. Брадикардия может быть вызвана
4685 недостаточностью функции щитовидной железы (гипотиреоз), электролитным
4686 дисбалансом или лекарственными препаратами, принимаемыми для лечения
4687 определенных состояний. Замена данных препаратов на аналоги или коррекция дозы
4688 могут восстановить нормальное сердцебиение. Если лекарственная терапия не помогает
4689 или замедленное сердцебиение вызвано повреждением электрической системы сердца,
4690 вам может быть показана установка или имплантация кардиостимулятора.

4691 ЧТО ТАКОЕ КАРДИОСТИМУЛЯТОР?

4692 Когда говорят о традиционном кардиостимуляторе, обычно имеют в виду систему
4693 кардиостимуляции, состоящую из кардиостимулятора и электродов.
4694 Кардиостимулятор — это небольшое устройство, имплантируемое подкожно, как
4695 правило, в подключичной области. Данное устройство помогает регулировать
4696 неравномерное, прерывистое или замедленное сердцебиение. Электроды — это тонкие,
4697 мягкие, изолированные провода диаметром около 2 мм. Электроды передают
4698 электрический импульс от кардиостимулятора к сердцу и возвращают информацию
4699 о естественной активности сердца обратно в кардиостимулятор.

4700 КАК РАБОТАЕТ КАРДИОСТИМУЛЯТОР?

4701 Кардиостимулятор разработан как аналог естественного кардиостимулятора —
4702 синусового узла. У кардиостимулятора есть две основные задачи: стимуляция
4703 и контроль.

4704 **СТИМУЛЯЦИЯ:** Кардиостимулятор передает электрический импульс в сердце
4705 через электрод, когда собственный ритм сердца замедлен или прерывается.
4706 Электрический импульс стимулирует сердцебиение.

4707 **КОНТРОЛЬ:** Кардиостимулятор также «чувствует» (контролирует) естественную
4708 электрическую активность сердца. Когда кардиостимулятор регистрирует нормальный
4709 сердечный ритм, он не отправляет стимулирующий сигнал.

4710 ИМПЛАНТАЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО КАРДИОСТИМУЛЯТОРА

4711 Процедура имплантации кардиостимулятора не требует операции на открытом
4712 сердце, и большинство пациентов отправляются домой в течение 24 часов. Перед
4713 хирургической операцией вам будет назначен лекарственный препарат, обладающий
4714 снотворным и успокаивающим действием. Как правило, процедура проводится под
4715 местной анестезией.

4716 СТАНДАРТНЫЕ ЭТАПЫ ИМПЛАНТАЦИИ КАРДИОСТИМУЛЯТОРА:

4717 В верхней части грудной клетки под ключицей делают небольшой надрез длиной
4718 приблизительно 5–10 см. Один или два электрода проводят через вену к сердцу,
4719 электроды подключают к кардиостимулятору. Программируют настройки
4720 кардиостимулятора, проводят проверку кардиостимулятора, чтобы убедиться в его
4721 правильной работе, кардиостимулятор устанавливают подкожно, после чего зашивают
4722 надрез.

4723 ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ЛЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ

4724 Последующее наблюдение позволит проверить работу кардиостимулятора. В ходе
4725 проверки врач может:

- 4726 - проконтролировать состояние батареи кардиостимулятора;
- 4727 - проверить электроды, чтобы определить их взаимодействие
4728 с кардиостимулятором и сердцем;
- 4729 - проверить настройки кардиостимулятора, чтобы убедиться, что они
4730 соответствуют вашим потребностям,
- 4731 - скорректировать настройки кардиостимулятора помимо контроля во время очного
4732 визита к врачу,

4733 Ваша клиника может осуществлять удаленный контроль работы
4734 кардиостимулятора. Удаленный контроль может заменить некоторые (но не все) визиты
4735 к врачу. Вашему доктору может потребоваться провести физический осмотр или
4736 корректировку настроек кардиостимулятора или лекарственной терапии.

4737 ЕСЛИ СИСТЕМА ОСНАЩЕНА УДАЛЕННЫМ КОНТРОЛЕМ

4738 Система позволяет отправлять информацию, хранящуюся в имплантируемом
4739 кардиостимуляторе, в клинику согласно инструкциям врача при помощи монитора
4740 пациента с мобильным интернетом или через ваш смартфон. Затем информация с вашего
4741 кардиостимулятора передается на безопасный интернет-сайт, где ваша клиника получает
4742 к ней доступ для проверки информации о состоянии сердца и работе кардиостимулятора.
4743 Система предоставляет вашему врачу ту же информацию с кардиостимулятора, что он

4744 может получить во время визита в клинику. Обсудите с врачом оптимальные варианты
4745 лечения при вашем состоянии.

4746 ПОКАЗАНИЯ К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБРАЩЕНИЮ К ВРАЧУ

4747 1. Возобновление жалоб, в том числе появление головокружений,
4748 предобморочных состояний, потерь сознания.

4749 2. Появление неэффективной стимуляции, по данным ЭКГ.

4750 3. Стимуляция мышц плечевого пояса, диафрагмы.

4751 4. Травма области расположения кардиостимулятора (удар, падение).

4752 5. Перед проведением и после проведения медицинских процедур, которые
4753 могут оказать влияние на работу ЭКС.

4754 6. Электротравма.

4755 7. Внешние изменения кожных покровов (покраснение, цианоз, истончение
4756 кожи над аппаратом), болезненные ощущения, отделяемое в области шва или ложа ЭКС.

4757 ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

4758 МОГУ ЛИ Я ПОЛЬЗОВАТЬСЯ МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ?

4759 Да. Во время разговора по мобильному телефону держите антенну телефона
4760 на расстоянии не менее 16 см от кардиостимулятора и держите телефон у уха
4761 с противоположной стороны от кардиостимулятора. Мы также рекомендуем не класть
4762 мобильный телефон в карман рядом с кардиостимулятором.

4763 БЕЗОПАСНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ?

4764 Да. Бытовая техника преимущественно безопасна для использования при
4765 надлежащем обслуживании и в хорошем рабочем состоянии. Это относится
4766 к микроволновым печам, крупной бытовой технике, одеялам с электрообогревом
4767 и электрогрелкам.

4768 ВЛИЯЮТ ЛИ НА МОЕ УСТРОЙСТВО МАГНИТЫ?

4769 Предметы, содержащие магниты, включая продукцию для магнитотерапии,
4770 стереоколонки и ручные массажеры, могут оказывать временное воздействие на работу
4771 кардиостимулятора. Поэтому рекомендуется держать предметы, содержащие магниты,
4772 на расстоянии не менее 16 см от имплантируемого кардиостимулятора.
4773 Мы не рекомендуем использовать магнитные матрасы и подушки, поскольку при
4774 их использовании трудно обеспечить расстояние 16 см от прибора.

4775 СМОГУ ЛИ Я ПУТЕШЕСТВОВАТЬ?

4776 Учитывая короткую продолжительность досмотра, маловероятно, что детекторы
4777 металла (ворота и переносные детекторы), а также сканеры тела (именуемые сканерами

4778 миллиметрового диапазона и 3D-сканерами), которые имеются в аэропортах, судах и
4779 тюрьмах, повлияют на работу кардиостимулятора. Детектор металла может
4780 отреагировать на металлический корпус вашего кардиостимулятора. Для минимизации
4781 риска временного воздействия на кардиостимулятор в ходе досмотра не прикасайтесь
4782 к металлическим поверхностям оборудования. Не останавливайтесь и не задерживайтесь
4783 в воротах, просто пройдите через ворота обычным шагом. При использовании
4784 переносного детектора попросите оператора не держать его в области
4785 кардиостимулятора и не проводить им рядом с кардиостимулятором. Возможно,
4786 в качестве альтернативы вас попросят пройти ручной метод досмотра. Если вас
4787 беспокоят методы досмотра, покажите идентификационную карточку
4788 кардиостимулятора и попросите осуществить альтернативный досмотр, после чего
4789 следуйте указаниям персонала.

4790 СМОГУ ЛИ Я ЗАНИМАТЬСЯ СПОРТОМ? СМОГУ ЛИ Я ЗАНИМАТЬСЯ
4791 ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ?

4792 Вы сможете вернуться к обычной деятельности, если она не превышает текущую
4793 физическую нагрузку.

4794 ЖИЗНЬ С КАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ

4795 Многие люди с кардиостимулятором продолжают обычную повседневную
4796 деятельность после восстановления от процедуры имплантации. Врач может попросить
4797 вас избегать определенных ситуаций. Обсудите с врачом вашу активность и образ
4798 жизни, чтобы разработать оптимальный для вас план.