

Коплавикс® – это удобство приёма* для большей приверженности пациентов к ДАТТ¹⁻³



- ✓ Фиксированная комбинация может способствовать улучшению приверженности и обеспечить **длительность ДАТТ** в соответствии с современными рекомендациями¹⁻³
- ✓ **Возможность повышения** приверженности по сравнению с отдельным приемом АСК и клопидогрела³
- ✓ Фармакокинетика желудочно-растворимой формы АСК** может обеспечить **меньший риск** побочных явлений со стороны ЖКТ⁴⁻⁶

* За счет снижения количества таблеток

** По сравнению с кишечнорастворимой формой

Внесены изменения в инструкцию препарата Коплавикс® – была добавлена информация о двух рандомизированных, инициированных исследователем, клинических исследованиях TOPIC⁷ и TROPICAL-ACS⁸. В обоих исследованиях изучался переход с терапии мощным ингибитором рецепторов P2Y₁₂ на клопидогрел в сочетании с АСК. Дата обновления: 05.06.2019 г.⁵

КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА КОПЛАВИКС®.

МЕЖДУНАРОДНОЕ НЕПАТЕНТОВАННОЕ НАЗВАНИЕ. Ацетилсалициловая кислота + клопидогрел.
ДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА. клопидогрела гидросульфат в форме II – 97,875 мг (в пересчете на клопидогрел – 75 мг), ацетилсалициловая кислота – 100 мг; Фармакотерапевтическая группа: антиагрегантное средство.

Код АТХ: В01АС30. ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА. Таблетки, покрытые пленочной оболочкой.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. Комбинированный препарат показан для применения у пациентов, которые уже получают одновременно клопидогрел и ацетилсалициловую кислоту. Вторичная профилактика атеротромботических осложнений. У взрослых пациентов с острым коронарным синдромом:
- без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия или инфаркт миокарда без зубца Q), включая пациентов, которым было проведено стентирование при чрескожном коронарном вмешательстве;
- с подъемом сегмента ST (острый инфаркт миокарда) при медикаментозном лечении и возможности проведения тромболизиса. Профилактика атеротромботических и тромбоэмболических осложнений у взрослых пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП), имеющим, как минимум, один фактор риска развития сосудистых осложнений, которые не могут принимать АВК или в случае неприятия пациентом лечения АВК), показан прием клопидогрела в комбинации с АСК.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. Повышенная чувствительность к любому из вспомогательных веществ препарата; тяжелая печеночная недостаточность (более 9 баллов по шкале Чайлд-Пью); тяжелая почечная недостаточность (клиренс креатинина менее 30 мл/мин) - из-за содержания в составе препарата ацетилсалициловой кислоты [АСК]); острое кровотечение; бронхиальная астма, индуцируемая приемом салицилатов и других нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП); синдром бронхиальной астмы, ринита и рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух, гиперчувствительность к НПВП; мастоцитоз; редкие наследственные состояния: непереносимость галактозы; непереносимость лактозы вследствие дефицита лактазы; синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы; беременность и период грудного вскармливания; детский возраст до 18 лет.

С ОСТОРОЖНОСТЬЮ. При умеренной печеночной недостаточности (7-9 баллов по шкале Чайлд-Пью); при почечной недостаточности легкой и средней степени тяжести (клиренс креатинина 60-30 мл/мин); при травмах, хирургических вмешательствах, включая инвазивные кардиологические процедуры или хирургические вмешательства; при заболеваниях, при которых имеется предрасположенность к развитию кровотечений, особенно внутриглазных или желудочно-кишечных; при недавно перенесенном преходящем нарушении мозгового кровообращения или ишемическом инсульте; при бронхиальной астме и аллергии в анамнезе; при указаниях анамнеза на аллергические и гематологические реакции на другие тиаенопиридины (такие как тиклопидин, прасугрел). (см. полную инструкцию по применению)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ. Коплавикс® следует принимать 1 раз в сутки вне зависимости от приема пищи. ОКС: прием Коплавикс® начинают после однократной нагрузочной дозы клопидогрела в комбинации с АСК в виде отдельных препаратов, а именно — клопидогрел в дозе 300 мг и АСК в дозах 75–325 мг в сутки. ФП: Коплавикс® следует принимать 1 раз в сутки, после начала лечения клопидогрелом 75 мг и АСК 100 мг в виде отдельных препаратов.

ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ. Кровотечения и кровоизлияния; желудочно-кишечные кровотечения, диспепсия, абдоминальные боли, диарея. Для ознакомления с побочными эффектами, возникающими нечасто, редко и очень редко ознакомьтесь с официальной инструкцией по медицинскому применению лекарственного препарата.

ФОРМА ВЫПУСКА. По 7 таблеток в ПА/Ал/ПВХ/алюминиевый блистер. По 4 блистера вместе с инструкцией по применению в картонную пачку. По 10 таблеток в ПА/Ал/ПВХ/алюминиевый блистер. По 10 блистеров вместе с инструкцией по применению в картонную пачку.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР. ЛП-000163, дата последнего изменения инструкции – 05.06.2019

С подробной информацией о препарате ознакомьтесь в официальной инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата Коплавикс®

АСК – ацетилсалициловая кислота

ДАТТ – двойная антитромбоцитарная терапия

ЖКТ – желудочно-кишечного тракта

ССЫЛКИ:

1. Агеев Ф.Т. и соавт. Журнал Сердечная Недостаточность. Том 12, No 4 (66), 2011;238-243.
2. Явелов И.С. Трудный пациент No 7, Том 13, 2015;40-52.
3. Deharo P. et al. International Journal of Cardiology 172 (2014) e1 – e2.
4. Sagar K. et al. J Pharm Biomed Anal. 1999 Nov; 21 (2): 383-92
5. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Коплавикс®. Регистрационный номер: ЛП 000163; дата обновления: 05.06.2019.
6. Вёрткин А.Л. и соавт. РМЖ Кардиология, 2009; 17 (9); 570-575.
7. Cuisset T et al. TOPIC. Eur. Heart J 2017; 38(41):3070-3078
8. Sibbing D et al. TROPICAL ACS. Lancet 2017 Aug; 390:1747-57

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ.

Дата архивации: 23.01.20
SARU.CLO.19.12.2714