



Единственный ПОАК, который приводил к снижению рисков по трем показателям у пациентов с НФП^{1*}



↓ 21%

ИНСУЛЬТ / СИСТЕМНАЯ ЭМБОЛИЯ



↓ 31%

БОЛЬШОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ



↓ 11%

ОБЩАЯ СМЕРТНОСТЬ



«Исследование ARISTOTLE – одно из 12 жизнеспасающих исследований, оказавших наиболее значимое влияние на клиническую практику за последние 19 лет»²

Д-р Дж. Дрезен, главный редактор «Медицинского журнала Новой Англии»

ARISTOTLE

10 ЛЕТ ЗАЩИЩАЕМ ПАЦИЕНТОВ С НФП

Эликвис® (апиксабан) – ОАК №1 в мире

по количеству дней назначенного лечения пациентам** по показаниям НФП и ВТЭ***

Краткая инструкция по медицинскому применению препарата ЭЛИКВИС®. Торговое название: Эликвис®. МНН: апиксабан. Лекарственная форма: таблетки, покрытые пленочной оболочкой. Состав: одна таблетка содержит 2,5 мг или 5 мг апиксабана. Показания к применению: профилактика венозной тромбоземболии у пациентов после планового эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава, профилактика инсульта и системной тромбоземболии у взрослых пациентов с неклапанной фибрillationю предсердий, имеющих один или несколько факторов риска (таких как инсульт или транзиторная ишемическая атака в анамнезе, возраст 75 лет и старше, артериальная гипертензия, сахарный диабет, сопровождающиеся симптомами хронической сердечной недостаточности (функциональный класс II и выше по классификации NYHA). Исключения составляют пациенты с тяжелым и умеренно выраженным митральным стенозом или искусственными клапанами сердца, лечение тромбоза глубоких вен (ТГ), тромбоземболии легочной артерии (ТЛА), а также профилактика рецидивов ТГ и ТЛА. Противопоказания: повышенная чувствительность к апиксабану или любому другому компоненту препарата. Активно клинически значимое кровотечение. Заболевания печени, сопровождающиеся нарушениями в системе свертывания крови и клинически значимым риском развития кровотечений. Болезни или состояния, характеризующиеся значимым риском кровотечения: существующие в настоящее время или недавнее обострение язвенной болезни желудочно-кишечного тракта; наличие злокачественного новообразования на высоком риске кровотечения; недавнее повреждение головного или спинного мозга; недавно перенесенное оперативное вмешательство на спинном или спинномозговом уровне; артериовенозная мальформация; анергизма сосудов или выраженные внутриглазные или внутриморозные изменения сосудов. Нарушение функции почек с клиренсом креатинина менее 15 мл/мин, а также применение у пациентов, находящихся на диализе. Возраст до 18 лет (даные о применении препарата отсутствуют). Беременность (даные о применении препарата отсутствуют). Период грудного вскармливания (даные о применении препарата отсутствуют). Одновременное применение с дробями другими антикоагулянтными препаратами, включая нефракционированный гепарин (НФГ), низкомолекулярные гепарины (НМГ) (энокапарин, дафлекапарин и др.), производные гепарина (фondапаринекс и др.), пероральные антикоагулянты (варфарин, ривароксабан, дабигатран и др.), за исключением тех ситуаций, когда пациент переведится на терапию с апиксабаном, или если нефракционированный гепарин назначается в дозах, необходимых для поддержания проходимости центрального венозного или артериального катетера. Врожденный дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Тубочное действие: частыми нежелательными реакциями были кровотечения различным локализаций (носовые, желудочно-кишечные, ректальное, кровотечение из десен, гематурия, кровоизлияния в ткани глазного яблока), кровоподтек, носовое кровотечение и гематома, анемия, закрытая травма, тошнота. Перенес всех побочных эффектов представлен в полной версии инструкции по медицинскому применению. Способ применения и дозы: препарата Эликвис® принимают внутрь, независимо от приема пищи. Для пациентов, которые не могут проглотить таблетку целиком, ее можно измельчить и развести в воде, водной дистилляте, яблочном соке или поре и немедленно принять внутрь. В качестве альтернативы таблетку можно измельчить и развести в воде или 5% водном растворе дистиллята и немедленно ввести полученную суспензию через назогастральный зонд. Лекарственное вещество в измельченных таблетках сохраняет стабильность в воде, водной дистилляте, яблочном соке или поре до 4 ч. У пациентов с фибрillationю предсердий по 5 мг два раза в сутки. У пациентов с фибрillationю предсердий дозу препарата снижают до 2,5 мг два раза в сутки при наличии сочетания двух или более из следующих характеристик: возраст 80 лет и старше, масса тела 50 кг и менее или концентрация креатинина в плазме крови $\geq 1,5$ мг/дл (133 мкмоль/л). У пациентов с нарушением функции почек тяжелой степени (с клиренсом креатинина 15–29 мл/мин) и фибрillationю предсердий следует применять дозу апиксабана 2,5 мг два раза в сутки. Не принимавшие ранее антикоагулянты пациентам с фибрillationю предсердий, которым требуется проведение кардиоверсии, для достижения антикоагуляции возможено назначение по крайней мере 5 доз препарата по 5 мг 2 раза в сутки (2,5 мг в сутки, если пациент подходит под критерии снижения дозы) перед проведением процедуры. Если проведение кардиоверсии требуется до назначения 5 доз препарата Эликвис, возможно применение нагрузочной дозы апиксабана 10 мг по крайней мере за 2 часа до проведения процедуры с последующим приемом 5 мг 2 раза в сутки (2,5 мг в сутки, если пациент подходит под критерии снижения дозы). У пациентов с фибрillationю предсердий нет необходимости прекращать терапию препаратором Эликвис® перед катетерной абляцией. У пациентов после планового эндопротезирования тазобедренного или коленного сустава: 2,5 мг 2 раза в сутки (первый прием через 12–24 ч после оперативного вмешательства). У пациентов, перенесших эндопротезирование тазобедренного сустава, рекомендуемая длительность терапии составляет от 52 до 58 дней, коленного сустава – от 10 до 14 дней. Лечение тромбоза глубоких вен, тромбоземболии легочной артерии (ТЛА): по 10 мг два раза в сутки в течение 7 дней, затем 5 мг 2 раза в сутки. Продолжительность лечения определяется индивидуально с учетом соотношения ожидаемой пользы и риска возникновения клинически значимых кровотечений. Профилактика рецидивов тромбоза глубоких вен, тромбоземболии легочной артерии (ТЛА): по 2,5 мг два раза в сутки после как минимум 6 месяцев лечения тромбоза глубоких вен или ТЛА. Отпускается по рецепту врача. Срок годности: 3 года. Регистрационное удостоверение: ЛП-0022007, ЛЛ-001475. Подробная информация содержится в Инструкции по медицинскому применению лекарственного препарата, перед применением необходимо ознакомиться с полным текстом Инструкции по применению препарата Эликвис®.

* По сравнению с вафарином³. ** Дни назначенного лечения рассчитаны на основе данных аналитической платформы IQVIA MIDAS по реализации препаратов за 6 месяцев, III квартал 2020 года. Стандартные единицы рассчитаны по рекомендованной суточной дозе ПОАК. Апиксабан 2 раза в сутки, дабигатран 1 раз в сутки, ривароксабан 1 раз в сутки. Дни назначенного лечения АВК основаны на стандартных единицах на основе данных медицинского аудита IQVIA и соответствующих кодов ВОЗ МКБ-10⁴.

1. Granger C.B. et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. *J. Am. Med. Assoc.* 2011 Sep 15;305(11):981–992. 2. Special Publication from New England Journal of Medicine. Edward L. Pratt Research Library. URL: <https://prattlibrary.chcmc.org/content/special-publication-new-england-journal-medicine> [дата обращения: 22.12.2020]. 3. IQVIA MIDAS Sales Data Q320 Sales In/Sell-Out data. 4. IQVIA MIDAS Summary and Detailed Medical Data Q320. 5. NOAC recommended administration within 24-hour period [apixaban BID, dabigatran BID, edoxaban QD, rivaroxaban QD]. ОАК – оральный антикоагулянт. НФП – неклапанная фибрillationю предсердий. ВТЭ – венозная тромбоземболия. ПОАК – прямой оральный антикоагулянт. АВК – антиагонист витамина K.



Служба Медицинской Информации: MedInfo.Russia.Pfizercom
Доступ к информации о рецептурных препаратах Pfizer
на интернет-сайте www.pfizermedinfo.ru



ООО «Пфайзер Инновации»
Россия, 123112, Москва, Пресненская наб., д. 10, БЦ «Башня на Набережной» (блок С)
Тел.: +7 495 287 5000; факс: +7 495 287 5300
www.pfizer.com
PP-ELI-RUS-1214 04.03.2021