

# Конкор®


## 5 мг №90

для непрерывной  
терапии в течение  
3-х месяцев

Мы заботимся о наших пациентах  
и понимаем, насколько важна  
приверженность терапии  
для достижения целевых цифр  
артериального давления.




**MERCK**



новая  
экономичная  
упаковка!

ВСЕГО  
172₽  
В МЕСЯЦ!\*



\* расчет на 5 мг/день,  
источник цены: <https://apteka.ru/product/konkor-0005-n90-tabl-pplenobloch-5f3e7e7c91fe7f0001059844/>,  
дата обращения 07.06.2021

## Сокращенная инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Конкор®\*

**Конкор® (бисопролол). Регистрационное удостоверение: П N012963/01.**

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА: бета1-адреноблокатор селективный.**

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА И ДОЗИРОВКА: таблетки покрытые пленочной оболочкой, 5 мг и 10 мг.**

**ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:** артериальная гипертензия; ишемическая болезнь сердца: стабильная стенокардия; хроническая сердечная недостаточность.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** повышенная чувствительность к бисопрололу или к любому из вспомогательных веществ (см. раздел «Состав»), острая сердечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, требующая проведения инотропной терапии, кардиогенный шок, атриовентрикулярная (AV) блокада II и III степени, без электрокардиостимулятора, синдром слабости синусового узла, синоатриальная блокада, выраженная брадикардия (ЧСС менее 60 уд./мин), выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД менее 100 мм рт.ст.), тяжелые формы бронхиальной астмы, выраженные нарушения периферического артериального кровообращения или синдром Рейно, феохромоцитомы (без одновременного применения  $\alpha$ -адреноблокаторов), метаболический ацидоз, возраст до 18 лет (недостаточно данных по эффективности и безопасности у данной возрастной группы).

**СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ\*:** Один раз в сутки утром с небольшим количеством жидкости, независимо от времени приема пищи. Не разжевывать; не растирать в порошок.

**Артериальная гипертензия и стабильная стенокардия** Режим приема и дозу подбирает врач каждому пациенту индивидуально.

Обычно начальная доза составляет 5 мг 1 раз в день. При необходимости дозу можно увеличить до 10 мг 1 раз в сутки. Максимально рекомендованная доза составляет 20 мг 1 раз в день.

**Хроническая сердечная недостаточность** Рекомендуемая начальная доза составляет 1,25 мг 1 раз в день. В зависимости от индивидуальной переносимости дозу следует постепенно повышать до 2,5 мг, 3,75 мг, 5 мг, 7,5 мг и 10 мг 1 раз в день. Максимально рекомендованная доза при лечении ХСН составляет 10 мг препарата Конкор® 1 раз в день.

**ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ\*:** *Со стороны сердца* — очень часто: брадикардия (у пациентов с ХСН); часто – усугубление симптомов течения ХСН. *Со стороны сосудов:* ощущение похолодания или онемения в конечностях, выраженное снижение АД, особенно у пациентов с ХСН. *Со стороны пищеварительной системы* — часто: тошнота, рвота, диарея, запор. *Со стороны желудочно-ки-*

*шечного тракта* — часто: тошнота, рвота, диарея, запор. *Общие нарушения* — часто: астения (у пациентов с ХСН), повышенная утомляемость\*.

*Центральная нервная система* — часто: головокружение\*, головная боль\*.

*Общие расстройства и нарушения в месте введения* – часто: астения (у пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией).

\* У пациентов с артериальной гипертензией или стенокардией особенно часто данные симптомы появляются в начале курса лечения. Обычно эти явления носят легкий характер и проходят, как правило, в течение 1-2 недель после начала лечения. Перечень всех побочных эффектов представлен в инструкции по медицинскому применению.

**ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ\*:** Не прерывайте лечение препаратом Конкор® резко и не меняйте рекомендованную дозу без предварительной консультации с врачом, так как это может привести к временному ухудшению деятельности сердца. Лечение не следует прерывать внезапно, особенно у пациентов с ИБС. Если прекращение лечения необходимо, то дозу следует снижать постепенно. На начальных этапах лечения препаратом Конкор® пациенты нуждаются в постоянном наблюдении.

Препарат следует применять с осторожностью в следующих случаях: тяжелые формы ХОБЛ и неотяжелые формы бронхиальной астмы; сахарный диабет со значительными колебаниями концентрации глюкозы в крови: симптомы выраженного снижения концентрации глюкозы (гипогликемии) такие как тахикардия, сердцебиение или повышенная потливость могут маскироваться, строгая диета, проведение десенсибилизирующей терапии, AV блокада I степени, стенокардия Принцметала, нарушения периферического артериального кровообращения легкой и умеренной степени (в начале терапии может возникнуть усиление симптомов), псориаз (в т.ч. в анамнезе).

Условия хранения: хранить при температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК:** по рецепту. **СРОК ГОДНОСТИ:** 5 лет  
Претензии потребителей и информация о нежелательных явлениях следует направлять по адресу:

ООО «Мерк», 115054, Москва, ул. Валовая, д. 35, Тел.: +7 495 937 33 04; факс: +7 495 937 33 05, e-mail: safety@merck.ru.

\*Полная информация по препарату содержится в инструкции по медицинскому применению. Данная версия инструкции по медицинскому применению действительна с 28 августа 2020 Соответствует CCDS 12.0